

سازه ۲۱۸۲/۲۱۸۵
تاریخ ۳۰/۴/۱۹۸۷
سوست

بسمه تعالیٰ

جمهوری اسلامی ایران

معاونت بهداشت

معاهون محترم بهدایتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

سلام و احترام

با توجه به وقوع چند مورد مرگ مادر به دنبال زایمان خود بخود در منزل و همچنین انجام سقط غیر اینمن، دو نکته مهم زید را برای جلب توجه همکاران محترم به اطلاع می رسانند:

نکته اول: هر مادری که زایمانش در منزل یا بین راه توسط فرد دوره ندیده یا خوبخود و بدون حضور فرد کمک کننده به زایمان انجام شده، اعم از اینکه نتیجه زایمان، تولد نوزاد زنده یا مرده (مرده زایی) است، به منظور اطمینان از باقی نماندن هفت، در اولین زمان ملاقات پس از زایمان، مادر برای انجام سونوگرافی ارجاع شود.

نکته دوم: چنانچه در مادری علائمی مانند درد شکم با یا بدون تب، ضعف و بی حالی، فشار خون پایین و لکه بینی مشاهده شد، از او در مورد داشتن سقط غیر اینم سوال شود و در صورت پاسخ مثبت مادر، احتمال وقوع عوارض سقط غیر اینم که مهمترین آن خونریزی داخلی ناشی از سوراخ شدن رحم و عفونت است را در نظر گرفته و مادر به متخصص زنان و یا بیمارستان ارجاع فوری شود.

خواهشمند است مراتب فوق به اطلاع همکاران ارایه دهنده خدمات در سطوح محیطی اعم از بهورزان، ماماها، کا، کزان، بیداشتی، و نیشکان، و سانده شود.

دکتر مریم خوشیده
رئیس اداره سلامت مادران
وقت، سلامت حمایت، خانواده و مدارس