




مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع) بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

بسمه تعالی

چست تیوب گذاری



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع)

دفتر آموزش سلامت

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

کد: ۲-۳

✓ به توصیه های پزشک توجه کنید و در وضعیت مناسب نیمه نشسته با نظر پزشک قرار بگیرید.

✓ ابتدا بخیه ها کشیده می شود. پس از آن با دستور پزشک نفس عمیق کشیده و نفس خود را تا زمان خروج لوله از سینه نگه دارید.

✓ پس از خروج لوله، ناحیه محکم به صورت فشاری پانسمان می شود.

✓ پانسمان محل را تا معاینه مجدد باز نکنید.

✓ خروج هر نوع مایع چرکی و خیس شدن پانسمان و سختی در نفس کشیدن را گزارش کنید.

منابع:

۱. جانیس ال، هینکل، کری اچ. چپویر ۲۰۱۴. پرستاری داخلی جراحی بیماری های کبد و مجاری صفراوی (برونر و سودارث)، ترجمه: ناهیددهقان نیروی، ن. احمدعلی اسدی نوقایی، معصومه موسیپور، م. ویرایش سیزدهم. تهران، انتشارت جامعه نگر و سالمی.

۲. Consult Nursing.

✓ به طور معمول سطح مایع موجود در مسیر لوله با هر نفس بالا و پایین می رود که نشان دهنده کار کردن لوله سینه ای می باشد.

✓ هنگامی که بیدار هستید ۷-۸ بار در ساعت سرفه کنید و نفس های عمیق انجام دهید. این کار به خروج ترشحات کمک فراوانی می کند.

✓ زمانی که وضعیت تنفسی شما بهتر شد و خروج ترشحات و هوا کاهش یافت با صلاح دید پزشک لوله خارج خواهد شد.

چست تیوب چگونه خارج می شود؟

✓ خروج چست تیوب فقط چند ثانیه زمان می برد.

✓ در صورت لزوم برای شما مسکن تجویز می شود.

لوله سینه ای چیست؟

لوله سینه ای یا چست تیوپ یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر است که جهت تخلیه ترشحات در فضای بین ریه ها و قفسه سینه که به آن جنب می گوئیم، گذاشته می شود و به مخزن ترشحات (چست باتل) متصل می شود.

چرا از چست تیوپ استفاده می شود؟

در حالت معمول مقدار کمی مایع در این فضا وجود دارد. این مایع به حرکت ریه ها بدون سایش در حین تنفس کمک می کند. اما ورود کمی از هوا، خون، چرک و... ناشی از آسیب و یا عمل جراحی به فضای جنب می تواند از اتساع کامل ریه ها جلوگیری نماید و روی هم خوابیدن ریه ها می تواند منجر به ایست تنفسی بشود بنابراین قرار دادن لوله سینه ای با تخلیه ترشحات و هوا باعث راحتی تنفس می شود.

چست تیوپ چگونه داخل قفسه سینه گذاشته می شود؟

اصولا در اتاق عمل با استفاده از بی حسی موضعی گذاشته می شود و جهت تخلیه ترشحات به مخزن ترشحات (چست باتل) وصل می شود و محل پس از بخیه محکم پانسمان می شود.

مرددجوی گرامی جهت کمک به فرایند درمانی خود به توصیه های زیر توجه کنید:

✓ آرامش خود را حین گذاشتن لوله حفظ کنید.

✓ از حرکت ناگهانی و سرفه حین گذاشتن لوله بپرهیزید.

✓ ممکن است به پهلو بخوابید یا در وضعیت خاصی با توضیحات پزشک قرار بگیرید.

✓ در صورت نیاز بعد گذاشتن لوله برای شما مسکن و آنتی بیوتیک تجویز خواهد شد.

✓ جهت بررسی محل قرار گیری قبل و بعد از گذاشتن لوله، عکس از قفسه سینه گرفته میشود.

✓ هنگام استراحت مراقب گرفتگی و خم شدن لوله باشید و بر روی آن دراز نکشید.

✓ در صورت مشاهده هر گونه نشت هوا یا ترشحات از لوله به خارج از مخزن ترشحات (چست باتل)، به پرستار خود اطلاع دهید.

✓ در صورت مشاهده حباب های هوا در مخزن ترشحات (چست باتل) به پرستار اطلاع دهید.

✓ در صورت جدا شدن ناگهانی لوله از مخزن ترشحات، بلافاصله لوله را با دست تا کنید و ببینید تا پرستار با گیره مخصوص لوله را ببندد.

✓ در هنگام انتقال و جابجایی در صورت صلاح دید پرستار، لوله کلمپ (بسته) می شود در صورتی که مخزن ترشحات دسته دارد جهت جابجایی از آن استفاده کنید در غیر این صورت در نایلون مخصوص گذاشته و حمل شود.

توجه کنید که مخزن ترشحات باید همیشه پایینتر از سطح لوله سینه ای باشد.