




بسمه تعالی

بیرون زدگی دیسک کمر



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع)

تهیه کننده:

فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت

زمستان سال 1399

- قرار گرفتن در وضعیت نشسته یا ایستاده باید همراه با حرکاتی آرام و طی مدت زمان طولانی صورت پذیرد.
- فعالیت ها را به تدریج و در حد تحمل تا زمان بهبودی کامل باید از انجام فعالیت هایی که موجب کشیدگی و خمیدگی ستون فقرات می شود مثل رانندگی با اتومبیل اجتناب کرد.
- به مدت 2 تا 3 ماه پس از عمل جراحی، از انجام کارهای سنگین خودداری نماید.
- استفاده از توالت فرنگی تا 6 ماه بعد از عمل جراحی

- وقتی بیمار به پهلو خوابیده است، باید از خم کردن بیش از حد زانو پرهیز شود.
- باید بیمار را تشویق کرد تا جهت برطرف نمودن فشار از یک پهلو به پهلو دیگری بچرخد
- البته قبل از آن به وی اطمینان خاطر داده شود که جابه جا شدن به هیچ عنوان منجر به بروز آسیب دیدگی نمی شود
- وقتی بیمار برای برگرداندن آماده شد، تخت در وضعیت کاملاً صاف قرار گرفته و بالشتی بین پاها گذاشته می شود
- کل بدن بیمار همزمان برگردانده می شود (همچون یک کنده درخت) بدون آن که کمر پیچ و تاب بخورد
- برای پایین آمدن از تخت بیمار ابتدا باید به یک پهلو برگردد، سپس با فشار دادن کف دست ها بر تخت، در وضعیت نشسته قرار گیرد. در همین زمان پرستار یا یکی از اعضای خانواده، پاهای بیمار را از روی تخت پایین می آورند.

بیرون زدگی دیسک کمر

دیسک بین مهره ای، یک صفحه غضروفی است که بین تنه مهره ها فاصله ایجاد می کند. اختلال در دیسک بین مهره ای ممکن است به صورت پرولاپس، فتق یا پارگی دیسک در اثر تروما و تصادف باشد.

علامه:

درد در ناحیه پایین کمر همراه با درجات متفاوتی از اختلالات حسی و حرکتی.

درد با انجام فعالیت هایی که سبب افزایش فشار مایع درون نخاعی می گردند مانند خم شدن، بلند کردن و فشارها و کشش های ناشی از سرفه و عطسه، تشدید شده و معمولاً با استراحت کردن در بستر برطرف می شود.

روش های تشخیصی

گرفتن تاریخچه ای از بیمار و اطلاعات مربوط به وضعیت بدنی او

روش های تصویربرداری نظیر MRI، CT

درمان:

- کاهش وزن
- فیزیوتراپی
- ورزش های توصیه شده توسط فیزیوتراپ ها
- می توانند عضلات پشت را تقویت کرده و درد را کاهش دهند.
- در صورت عدم بهبودی درمان جراحی

مراقبت های قبل از عمل:

- هر نوع درد و اسپاسم عضلانی نیز باید ثبت شود تا مبنایی برای مقایسه پس از عمل جراحی به وجود آید.
- ارزیابی حرکات اندام های انتهایی و عملکرد روده و مثانه
- قبل از عمل بیمار را تشویق می کنند تا نفس های عمیق بکشد، سرفه کند و به انجام ورزش های عضلانی در حالت ثابت و بدون حرکت بپردازد
- آموزش که برای چرخاندن و برگرداندن بدن به وی داده می شود، یعنی برای سهولت در امر تغییر وضعیت پس از عمل، به بیمار آموزش داده می شود تا کل بدن خود را (همانند کنده درخت) یکباره حرکت دهد.

بررسی بیمار پس از عمل جراحی:

- بررسی احتمال احتباس ادراری نیز که آن هم علامت دیگری دال بر وخامت وضعیت عصبی در بیمار است
- رنگ و دمای پاها و حس انگشتان پا نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
- ناحیه زخم نیز از نظر تشکیل هماتوم معاینه گردد چون آسیب دیدگی عروق یکی از عوارض جراحی دیسک است

تغییر وضعیت بدن بیمار:

برای تغییر دادن وضعیت بدن بیمار، بالشتی زیر سر وی قرار داده و زانو اندکی بالا قرار می گیرد، چون خمیدگی جزئی زانو سبب شل شدن عضلات پشت می گردد.