




بخش سوختگی بیمارستان
امام علی (ع)



تمیه و تنظیم : احمد باور
سرپرستار بخش سوختگی

بمفلسی که در دست دارید حاوی اطلاعات
ضروری در خصوص بیماری فعلی شما و
چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد.

قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم با آرزوی بهبودی و سلامتی روز افزون



خراسان شمالی : بجنورد . خیابان شهریار بیمارستان امام
علی (ع)

بخش سوختگی

تماس : 05832297010

داخلی 1125

۹. از استعمال سیگار خودداری شود .

۱۰. پانسمان محل فلپ به روش استریل تعویض شود . ۴۸ ساعت بعد
از عمل پانسمان باز شده و حمام کنید و با سرم شستشو ناحیه فلپ
شسته شده و مجدداً پانسمان شود .

۱۱. (وضعیت) به صورت نیمه نشسته و یک بالش زیر زانوهای
می باشد .

۱۲. از دستکاری و خاراندن فلپ خودداری نمائید .

۱۳. فیزیوتراپی تنفسی و سایر اندامهای بدن را جهت جلوگیری
از مشکلات حرکتی ، تنفسی و برقراری گردش خون بطور منظم
با نظر پزشک انجام دهید .

جهت انجام فرایض دینی موارد ذیل رعایت گردد :

وضو و غسل جبیره : پارچه ای تمیز روی عضو پانسمان شده
قرار داده وضو و غسل را به ترتیب انجام دهید .



فلپ شکمی :

فلپ به معنی بافتی است که به منظور ترمیم و یا بستن زخم استفاده می شود. به طوری که پس از برداشتن بافت یا انتقال آن به محل جدید همه و یا بخشی از خون رسانی منشاء آن حفظ شود. قسمت متصلی که از طریق آن عروق خونی وارد و خارج می شوند پایه فلپ نامیده می شود.



مراقبت های قبل از عمل جراحی فلپ شکمی

۱. علت انجام و نحوه ی انجام فلپ شکمی توسط پرستار و پزشک توضیح داده شده و رضایت کتبی جهت انجام فلپ از شما گرفته می شود.
۲. زمان کافی به بیمار جهت تصمیم گیری نهایی داده می شود.
۳. آزمایشات خون و ادرار و فتوگرافی و تعیین گروه خونی قبل از عمل انجام می شود.
۴. شب قبل از عمل حمام کرده و موهای شکم و قفسه سینه را بتراشید.

۵. به مدت ۸ ساعت قبل از عمل ناشتا خواهید بود.

۶. قبل از عمل دندان مصنوعی، لوازم زینتی، انگشتر و... را خارج نمایید.

۷. در صورتیکه آسپرین یا داروهای رقیق کننده خون مصرف می کنید قبل از عمل به اطلاع پزشک برسانید. در بیمارانی که داروهای ضد فشار خون، ضد آسم، ضد تشنج، ضد نارسایی قلبی مصرف می کنند باید داروها را همانگونه که پزشک معالج دستور داده مصرف نمایند و این داروها را با نظر پزشک حداقل دو ساعت قبل از عمل با کمی آب خالص (یک قاشق) میل نمایند.



آموزش هایی که لازم است به بیمار داده شود:

فلپ قطعه ای از بافت است که یک انتهای آن در محل خود متصل باقی مانده و انتهای دیگر به محل گیرنده متصل می شود. نکته ی مهم عملکرد سرخرگ ها و سیاهرگ هایی است که خونرسانی به فلپ را انجام می دهند. مشکل عمده در فلپ ها نکروز (سیاه شدن) پایه آن به دلیل نارسایی گردش خون است. مهمترین عارضه بعد از فلپ، عفونت محل فلپ می باشد.

مراقبت های بعد از عمل جراحی :

۱. توصیه می شود که محل عمل کمی بالا نگه داشته شود تا ادم محل عمل کاهش یابد.
۲. محل عمل را طوری قرار دهید که کمترین فشار به بخیه ها وارد شود.
۳. مایعات کافی و رژیم پر پروتئین مصرف نمایند.
۴. در صورت خون ریزی غیر طبیعی اطلاع داده شود.
۵. از مسکن ها برای کاهش درد استفاده شود.
۶. عفونت یک عارضه بعد از عمل می باشد که در صورت تب، بوی بد پانسمان، درد و ادم محل فوراً اطلاع داده شود.
۷. به بیمار آموزش داده می شود که دست ۲ الی ۳ هفته داخل شکم می ماند.
۸. علائمی از قبیل سردی، رنگ پریدگی، هماتوم (تجمع خون و عفونت) به پزشک اطلاع داده شود.
- رنگ و دمای فلپ باید طبیعی و هم رنگ و دما با پوست نواحی سالم مجاور باشد در غیر این صورت به پزشک مراجعه نمایید. (رنگ پریدگی و پر خونی).

