




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) شهرستان بجنورد

راهنمای انجام

برونکوسکوپی



تهیه و تنظیم :

لاله زار حسین زاده

(کارشناس مسئول سلامت همگانی)

پاییز ۱۳۹۵

منبع : کتاب برونر

سودارت بیماریهای تنفسی

۲۰۱۴

سایت آموزش به بیمار www.nkums.ac.ir

بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ۸ - ۳۲۲۲۸۱۱۱ - ۰۵۸

در صورت نیاز نمونه حاصل از شستشوی ریه جمع آوری و توسط همراه بیمار به آزمایشگاه ارسال می گردد .

لازم به ذکر است اگر بیمار از داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین ، وارفارین استفاده می کند بهتر است ۷۲ ساعت قبل این داروها قطع گردد و چنانچه بعد از برونکوسکوپی احساس درد در گلو یا کمی تب داشته باشید جای نگرانی نیست و بزودی بر طرف می گردد و بعد از ۱-۳ ساعت شما می توانید از غذای نرم و سپس معمولی استفاده نماید .

برای انجام برونکوسکوپی :

روی یک تخت دراز می کشید برای وارد کردن لوله باریک برونکوسکوپ، یک بی حس کننده در دهانتان اسپری می گردد و برای کنترل سلامتی در حین کار یک حس گر به انگشتان وصل می گردد تا ضربان قلب و اکسیژن بدن نمایش داده شود . برای راحتی کار در حین برونکوسکوپی ممکن است یک داروی شل کننده به بیمار تزریق شود تا اقدامات برونکوسکوپی راحت انجام گردد .

۳

بهتر است قبل از انجام برونکوسکوپ به پزشک و پرستار مربوطه اطلاع دهید .



۲

مشاهده عینی برونش ها و جمع آوری نمونه برای آزمایش می باشد . که توسط یک برونکوسکوپ انجام می شود .

قبل از انجام برونکوسکوپی :

• حداقل ۶ ساعت قبل از انجام ناشتا باشید .

• در صورت استفاده از داروهای قلبی ، فشار خون و یا ضد تشنج ، چند ساعت قبل از انجام برونکوسکوپ با کمی آب میل نماید .

• ضمناً اگر بیمار سابقه ابتلا به مشکلات قلبی و یا عروقی مثل سکته قلبی و مغزی با تشنج دارد

۱