

گاز گرفتگی توسط حیوان یا انسان



مراقبت از حیوانات خانگی یا قرار گرفتن در معرض حمله، خطر گاز گرفتگی سگ و گربه را افزایش می دهد به همین علت دانستن اقدامات اولیه و مهم در این شرایط برای هوکسی الزامی است.

حوالدی همچون گاز گرفتگی سگ و گربه شاید شایع نباشد اما جدیت و خطر آن میزان حساسیت در کسب آگاهی را افزایش می دهد. شما باید بدانید که بعد از چنگ زدگی و گاز گرفتگی توسط حیوانات مثل سگ و گربه چه اقداماتی باید انجام دهید تا جان خود را نجات داده و از ابتلاء هاری و... جلوگیری کنید. متأسفانه زمانی که سگی شما را گاز یا چنگ می گیرد و جایی از بدنتان دچار بریدگی می شود، احتمال ابتلاء هاری بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین باید سعی کنید خودتان را مصون نگه دارید و بلافاصله پس از گاز گرفتگی به مرکز درمانی یا بیمارستان مراجعه کنید تا اقدامات درمانی را برای شما انجام دهند. بعد از انجام اقدامات درمانی، پزشک شما را ترجیح خواهد کرد و نکاتی را به شما توصیه می کند که باید به آنها بخاطر بسپارید.

پس از ترجیح تا زمان بهبودی به نکات زیر توجه کنید:

+ بخیه کردن برای زخم هایی به کار می رود که وسیع بوده یا لبه های آن از هم دور باشند یا کناره های زخم نامنظم و ناهموار یا دچار له شدگی و تخریب پوست باشند و یا زخم آن قدر عمیق بوده که کل ضخامت پوست را در بر گرفته باشد یا احتمال آسودگی و عفونت آن کم باشد ، که تشخیص آن تنها با پزشک خواهد بود و در غیر این صورت زخم نیاز به بخیه نخواهد داشت ، در این مورد به تصمیم پزشک اعتماد کنید و نگران نباشید .

+ زخم هایی که احتمال بروز عفونت در آنها وجود دارد اغلب در ابتدا بخیه نشده و بعضی از آنها چند روز بعد که احتمال بروز عفونت کاهش یابد بخیه زده می شود .

در صورتی که زخم شما در ابتدا بخیه نشده است . لازم است طبق توصیه‌ی پزشک حتما در زمان معین جهت بخیه کردن آن مراجعه کنید .

بخیه‌ها را تا ۲۴ ساعت کاملا خشک نگاه دارید بخیه‌های غیر قابل جذب را پس از ۲۴ ساعت می‌توانید به آرامی با آب گرم و صابون بشوئید . اما به هیچ وجه آنها به مدت طولانی در آب غوطه ور نکنید (مثلا در وان حمام ، استحمام و ...) چون تماس زیاد با آب باعث کاهش سرعت بهبود زخم و افزایش احتمال عفونت می‌شود .

بخیه‌ها را بلافاصله با ملایمت خشک کنید . برای این کار از یک پارچه‌ی نخی سبک و کاملا تمیز که فقط به این کار اختصاص داده اید یا گاز استریل استفاده کنید و به هیچ وجه از پنبه یا دستمال کاغذی استفاده نکنید . دقت کنید که برای خشک کردن نباید پارچه را روی زخم به سختی بکشید و فقط از حرکات ضربه‌ای ملایم استفاده کنید .

پس از شستشو می‌توانید روی زخم را با یک لایه‌ی نازک پماد آنتی بیوتیک مانند تراسیکلین یا موپریسین (در صورت تجویز یا توصیه‌ی پزشک هنگام ترجیح) پوشانید . برای این کار از گوش پاک کن استفاده کنید .

زخم‌های پوستی اغلب با نخ‌های غیر قابل جذب بخیه می‌شوند . زمان دقیق کشیدن بخیه‌ها را پزشک هنگام ترجیح به شما خواهد گفت ، بخیه‌های صورت معمولاً ۶-۴ روز و بخیه‌های پوست سر و اندامها ۱۴-۱۰ روز بعد کشیده می‌شوند .

در صورتی که زخم شما پانسمان شده است حتما تا زمانی که پزشک به شما هنگام ترجیح توصیه کرده است زخم را پوشیده نگاه دارید ، در این صورت حداقل ۴۸ ساعت پانسمان را به شکل اولیه حفظ کرده و سپس بعد از هر بار شستشوی زخم آن را با یک پانسمان سبک پوشانید .

توجه کنید که همه زخم‌ها نیاز به پانسمان ندارند و ممکن است زخم شما (بخصوص زخم‌های پوست سر و صورت) پس از شستشو و حتی بخیه زدن بدون پانسمان رها شود . در این صورت شخصاً اقدام به پوشاندن زخم با پانسمان‌های سنگین نکنید .

در صورتی که زخم شما بخیه نشده است ، زخم را روزانه طبق دستور شستشو داده (با سرم نمکی مخصوص شستشو) و اگر هنگام ترجیح زخم پانسمان شده است ، پانسمان آن را تعویض کنید . (مطابق روش ذکر شده در آخر این راهنما)

به هیچ وجه از الکل ، بتادین ، آب اکسیژنه محلولهای ضد عفونی کننده ، کرم‌های آرایشی با نرم کننده ، روغن‌های معطر یا پمادهای کورتونی بر روی زخم استفاده نکنید . این مواد باعث تحریک پوست و عفونت و تاخیر در زخم خواهند شد .

- در روزهای اول ممکن است احساس درد و سوزش خفیف در محل زخم داشته باشد که برای رفع آن می توانید از استامینوفن استفاده کنید. ترکیبات حاوی آسپرین ممکن است باعث بروز خونریزی شود.
- در صورتی که هنگام ترخیص برای شما آنتی بیوتیک تجویز شده است، تنها همان دارو را در زمان معین مصرف کرده و دوره‌ی درمان را حتماً کامل کنید.
- از مصرف ترکیبات مختلف تزریقی یا خوارکی کورتون دار به طور خودسرانه و بدون دستور پزشک جدا خودداری کنید.
- برای کاهش تورم می توانید اندام خود را (هنگام خوابیدن یا نشستن) بالاتر از سطح بدن قرار دهید (یک یا دو عدد بالش را در زیر اندام خود به شکلی قرار دهید که دست یا پای شما بر روی آن تکیه کرده و در ارتفاع بالاتر از قلب قرار بگیرد) این کار به خصوص در ۲۴ ساعت اول موثر خواهد بود.
- از انجام فعالیتهای جسمی یا ورزش‌های سنگین که باعث فشار یا ضربه به محل زخم می‌شود در طول ۱-۲ هفته آینده خودداری کنید. اگر به این محل ضربه‌ای وارد شود ممکن است باعث آسیب بخیه‌ها یا باز شدن دوباره‌ی زخم گردد.
- خارش خفیف زخم در روزهای ابتدائی طبیعی است. در این موارد از خاراندن زخم خودداری کنید و فقط پوست را ماساژ دهید.
- ترشح خفیف به صورت مایع زرد کمرنگ، رقیق و آبکی در روزهای اول از زخم طبیعی است.
پس از باز کردن پانسمان و کشیدن بخیه‌ها تا زمان ترمیم کامل پوست محل زخم، باید آن را از نور خورشید، محافظت کنید. می توانید از ضدآفتاب یا کلاه و لباس پوشیده استفاده کنید.
- در بخشی از انواع بوریدگی‌ها و زخم‌ها معمولاً آتل گیری انجام می‌شود چرا که بی‌حرکتی باعث محافظت از زخم، کاهش فشار وارد بر آن و تسريع روند بهبود می‌شود، در صورتی که برای شما آتل گیری انجام شده است آن را تا زمان کشیدن بخیه‌ها و ترمیم اولیه‌ی زخم حفظ کرده و از باز کردن مداوم خودداری کنید.

آتل را نزدیک به منابع حرارتی (شعله ، بخاری ، نور مستقیم آفتاب) قرار ندهید چون باعث تغییر شکل آتل شده و اثر گذاری مطلوب آن نیز از بین می رود . هم چنین از وارد کردن ضربه های سخت و سنگین که احتمالاً باعث شکستن / توک خوردن / سوراخ شدن / تغییر شکل آتل می شود .

آتل خود را تمیز نکه دارید و از ورود هر گونه مواد زاید و آلودگی به داخل آن خودداری کنید و هنگام غذا خوردن روی آن را پوشانید .

در صورتی که در اورژانس از اندام شما که دچار زخم شده عکس بوداری انجام شده است ، آن را تا زمان بهبود کامل نزد خود نگاه دارید چون در صورت بروز عوارضی مانند عفوفت جهت مقایسه به آن نیاز خواهد شد

وجود این زخم محدودیت غذایی برای شما ایجاد نمی کند اما توصیه می شود تا زمان ترمیم زخم از میوه ها ، سبزیجات و آبمیوه های سرشار از ویتامین ث مانند مرکبات ، لیمو ترش ، گوجه فرنگی ، توت فرنگی ، آب لیمو و آب پرتقال بیشتر استفاده کنید . ویتامین ث باعث تسريع روند ترمیم زخم و بهبودی می شود . هم چنین می توانید از قرص ها یا مکمل های حاوی ویتامین ث روزانه یک نوبت استفاده کنید (طبق دستور پزشک معالج)

اگر به حیوانی به شما حمله کرده است دستری دارید ، حیوان را در مکان اینمی حداقل به مدت ۱۰ روز حبس و نگاهداری کرده و بروز هر گونه علایم بیماری و ناخوشی یا هر رفتار غیر طبیعی در او را به دامپزشک یا مرکز بهداشتی گزارش دهید .



هاری یک بیماری عفونی بسیار کمیاب می باشد که بر روی مغز و اعصاب بدن اثر می گذارد و میکروب آن فقط از طریق بزاق حیوانی که خودش هم بیمار باشد، منتقل می شود و احتمال ابتلا به آن معمولاً پایین است . جهت پیشگیری از بروز هاری واکسنی وجوددارد که لازم است هر ۳-۵ نوبت پس از گاز گرفتگی توسط حیوان مشکوک تزریق شود .

۴ اگر توسط فرد آشنایی که قطعاً به بیماری های واگیر دار (مثل هپاتیت یا ایدز) مبتلا بوده یا اعتیاد به مواد مخدر در او وجود دارد دچار گازگرفتگی شده اید حتماً وضعیت او را به پزشک اطلاع دهید تا در صورت نیاز واکسن های لازم مثل هپاتیت به شما تزریق گردد ، توصیه می شود در صورت امکان (دسترسی به آن فرد و موافقت وی) خود او نیز به پزشک مراجعه کند .



۴ اگر توسط فردی که از سابقه ای ابتلای او به بیماریهای مختلف یا وجود اعتیاد در او اطلاع ندارید دچار گازگرفتگی شده اید حتماً وضعیت را به پزشک اطلاع دهید و در صورت امکان (دسترسی به آن فرد و موافقت وی) خود او نیز جهت بورسی به پزشک مراجعه نماید .

۴ اگر احتمالاً باردار هستید (حتی اگر هنوز مطمئن نیستید) و دچار آسیب (پنجه زدن) توسط گربه شده اید حتماً به پزشک اطلاع دهید .



در صورت امکان روزانه ۲ نوبت با قب کیر دمای بدن خود را اندازه بگیرید.

روزانه زخم خود را از نظر بروز علائم زیر بررسی کنید :

تورم و قرمزی اطراف محل زخم

احساس درد شدید هنگام لمس کردن زخم یا اطراف آن

وضعیت ترشحات

خونریزی

خطوط قرمز رنگ و برجسته در اطراف زخم

تورم و سختی حرکات مفاصل اندام



واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی

برگرفته از دستورالعمل یکپارچه تشخیص از اورژانس ((دیتا))

با آرزوی سلامتی

آدرس وب سایت بیمارستان :

nkums.ac.ir/category/1541