



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی

بیمارستان پورسینا شهرستان مانه و سملقان

زنبور گزیدگی



گزیدگی زنبورهای زرد، سرخ و عسل معمولاً دردناک است و می تواند خطرناک باشد و واکنشهای آлерژیک نیز ایجاد کند . زنبورهای عسل بدنی زرد یا سیاه و سفید و کرکی دارند در حالی که زنبورهای وحشی خرمایی یا قرمز رنگ هستند و بدنشان فاقد کرک بوده و کمی باریکتر است. زنبورهای وحشی می توانند چند بار انسان را بگزند، در حالیکه زنبورهای عسل هنگام نیش زدن، نیش خود را در پوست به جای می گذارند. زنبور عسل پس از نیش زدن خواهد مرد، زیرا بر اثر نیش زدن، نیش و ضمایم آن که جزیی از بدن طریف این حشره است از بدن او جدا می شود. بنابراین نیش زدن برای او نوعی خودکشی است و او بی جهت دست به خودکشی نخواهد زد، مگر زمانی که انتقام گرفتن را بر بقا ترجیح دهد.

زنبور گزیدگی یکی از شایع ترین انواع گزش های حشرات است که اغلب با احساس درد و سوزش و ناراحتی همراه می باشد .

زهر زنبور پس از گزش وارد بدن شده و علائم زیر معمولاً پس از زنبور گزیدگی بروز می کند :

- درد محل گزش
- تورم و قرمزی
- خارش و سوزش
- احساس ضعف و خستگی
- تب خفیف



قطر برجستگی در محل گزش در اکثر موارد کمتر از ۵ سانتی متر بوده و در طول ۲۴ ساعت برطرف می شود اما در افراد ممکن است ضایعه بزرگ تر باشد . بروز حساسیت بسیار شدید (مثل تنگی نفس یا قرمزی و خارش کل بدن) نسبت به زنبور تنها در افراد بسیار کمی دیده می شود .



پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنید :

▪ خنک کردن ضایعه باعث کاهش احساس خارش می شود ، می توانید از دوش آب سرد ، کمپرس سرد یا کیسه ی یخ در طول ۲۴ ساعت اول استفاده کنید . (کیسه یخ را در یک پوشش پارچه ای پیچیده و به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست قرار دهید ، از تماس مستقیم یخ با پوست جلوگیری نمایید ، این کار را می توانید با فاصله ۱ ساعت تکرار کنید)



▪ برای کاهش تورم می توانید اندام خود را هنگام خوابیدن یا نشستن بالاتر از سطح بدن قرار دهید (یک یا دو عدد بالش را در زیر اندام خود به شکلی قرار دهید که دست یا پای شما بر روی آن تکیه کرده و در ارتفاع بالاتر از قلب قرار بگیرد) این کار به خصوص در ۲۴ ساعت اول موثر خواهد بود .

▪ اگر سابقه ی حساسیت شدید به نیش زنبور یا سایر حشرات یا سابقه ابتلا به آسم ، حساسیت های تنفسی یا پوستی و کهیر در شما یا اعضای خانواده تان وجوددارد حتماً به پزشک اطلاع دهید .

▪ از ایجاد فشار شدید بر روی ضایعه یا بستن محکم اندام بالاتر از محل گزش خودداری کنید .
▪ در صورتی که هنگام ترخیص داروی خاصی برای شما تجویز شده است فقط همان دارو را طبق دستور مصرف کنید .



▪ برای کاهش درد و ناراحتی می توانید از داروهای ضد درد معمولی مثل استامینوفن ، بروفن ، ناپروکسین یا ژلوفن استفاده کنید .

برای بهبود علایم می توانید از داروهای آنتی هیستامین مختلف مثل پرومتوازین ، هیدروکسی زین لوراتادین دیفن هیدرامین (حداکثر سه بار در روز) استفاده نمایید . ترجیحا طبق نظر پزشک معالج

توجه نمایید مصرف داروهای آنتی هیستامین در اغلب موارد باعث ایجاد خواب آلودگی شدید می شود ، بنابراین پس از مصرف آنها از انجام فعالیتهای مهم که نیاز به تمرکز ذهنی دارند (بخصوص رانندگی) کاملا پرهیز کنید .

درمان زنبور گزیدگی در اغلب موارد نیاز به مصرف آنتی بیوتیک خوارکی ندارند . بنابراین از مصرف خودسرانه‌ی داروها جدا خودداری کنید .

از مصرف ترکیبات مختلف تزریفی یا خوارکی کورتون دار (مثل دگزامتاون ، بتامتاون ، هیدروکورتیزون ، پردنیزولون) به طور خودسرانه و بدون دستور پزشک کاملا خودداری نمایید . از ترکیبات گیاهی ناشناخته (موضعی یا خوارکی) به هیچ عنوان استفاده نکنید .

درصورتی که برای بیماری خاصی داروهای دیگری را به طور دائم مصرف می کنید (مثل انواع کورتونها یا آسپرین) حتما به پزشک خود اطلاع دهید ، اما به هیچ وجه به طور خودسرانه مصرف دارو را تغییر نداده یا قطع نکنید .

از خاراندن ضایعات خودداری کنید ، خارش آنها باعث زخمی شدن و بروز عفونت شدید پوستی می شود .

ناخن‌های خود را کاملا کوتاه نگاه دارید تا در صورت خاراندن ناخواسته‌ی ضایعات به خصوص در خواب پوست شما دچار زخم و عفونت نشود .

برای کاهش احساس خارش شدید می توانید از پمادهایی مثل کالامین ، کالاندولا یا کورتون‌های خفیف (هیدروکورتیزون) بر روی پوست استفاده کنید .



از الکل یا بتادین یا آب اکسیژنه بر روی ضایعات استفاده نکنید .

- زنبور گزیدگی نیاز به پانسمان و پوشیده شدن با باند و گاز استریل ندارد .
- گرما در اغلب موارد باعث تشدید قرمزی و التهاب ضایعات و بیشتر شدن احساس خارش آنها می شود . بنابراین باید از گرم شدن آنها (مثل تماس با آب گرم ، بخار آب داغ ، فعالیت در هوای گرم) پرهیز شود .
- تابش مستقیم آفتاب بر روی ضایعه را کاملا محدود کنید .
- لباس های نخی و پوشیده با آستین و پاچه های بلند بر تن کنید تا تماس ضایعه با مواد مختلف باعث تحریک آنها نشود .
- تماس خود با گل های و گیاهان (مثلا حضور در باغ و پارک یا گل فروشی) را تا حد امکان محدود کنید .
- به طور مرتب استحمام کرده و پوست را کاملا تمیز نگاه دارید تا از بروز عفونت های ثانویه پیش گیری شود .
- از صابون ها یا مواد شوینده ی معطر برای استحمام و شستن لباس ها استفاده نکنید و از تماس طولانی مدت ضایعات با کف و مواد شوینده جلوگیری نموده و بلا فاصله پس از شستشو محل گزش را خشک نمائید .
- از اصلاح و تراشیدن موهای ناحیه گزش تا زمان بھبودی پرهیز کنید .
- از تماس نزدیک با حیوانات ، پرنده ها و فضولات آنها دوری کنید .
- از تماس خاک و گرد و غبار با پوست محل گزش جلوگیری نمائید .
- از استعمال انواع کرم ها و لوسيون ها ی آرایشي مختلف بر روی ضایعه خودداری کنید .
- صرف هر گونه مواد بهداشتی ، آرایشي ، شوینده و انواع عطر و اسپری (بویژه با بوی تند و شدید) را تا حد امکان کاهش دهید .
- تا زمان بھبودی کامل از مواد شیمیایی یا بهداشتی غیر ضروری مانند رنگ مو استفاده نکنید .
- از شنا کردن در استخرهای عمومی خودداری کنید .
- تا حد امکان از استعمال سیگار و قلیان و تماس با انواع دود خودداری نمایید .
- از انجام فعالیتهای سنگین جسمانی و خستگی شدید ، بویژه در هوای گرم خودداری کرده ، استراحت کافی داشته باشید و مایعات کافی بنوشید .
- اگر سابقه حساسیت شدید نسبت به نیش زنبور یا سایر حشرات (مثل تنگی نفس یا قرمزی و خارش کل بدن) در شما وجود داشته باشد و نیز در محیط کار یا زندگیتان احتمال بروز گزش مجدد وجوددارد توصیه می شود . جهت بررسی های تکمیلی و درمان های حساسیت زدایی به متخصص آرژی و سیستم ایمنی مراجعه کنید .

در صورت بروز هر یک از علایم زیر مجددا به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید:




- عدم بهبوطی علایم پس از ۲۴ ساعت
- تشدید تورم ضایعه و گسترش یا دردناکی شدید آن
- خارش بسیار شدید ضایعه با وجود مصرف داروها
- بروز تاول یا زخمی شدن ضایعات
- تشدید قرمزی و گرمی ضایعه
- ترشح چرکی و بدبو از محل گزش
- بروز کهیر یا ضایعات پوستی در سراسر بدن
- احساس خارش در سراسر بدن
- تنگی نفس ، سختی تنفس یا تنفس صدادار (خس خس سینه)
- سرفه یا گرفتگی گلو
- اختلال و سختی بلع
- بیرون ریختن بzac (آب دهان) از دهان
- تورم زبان ، حلق ، گلو و لب ها
- تورم اطراف چشم ها ، صورت یا دست و پا ها
- هر گونه خونریزی
- تب و لرز
- سردرد و سرگیجه
- رنگ پریدگی یا تعريق شدید
- درد یا سنگینی قفسه ی سینه یا تپش قلب
- اسهال ، تهوع و استفراغ یا درد شکم
- درد و سفتی یا تورم مفاصل (زانو و انگشتان و ...)

- ضعف و بی حالی یا خواب آلودگی شدید
- بروز عوارض ناشی از مصرف داروها به خصوص خواب آلودگی شدید

اگر در آینده مجدداً دچار زنبور گزیدگی شدید:



- آرام باشید و خونسردی خود را حفظ کنید.
- سریعاً از آن محل دور شده ، به محیط ایمنی بروید .
- از حرکت و فعالیت زیاد و شدید خودداری کنید .
- آرام و عمیق نفس بکشید .
- سریعاً باقی مانده ی نیش زنبور را از محل گرش خارج کنید (این کار را می توانید با استفاده از یک جسم نوک تیز و تمیز یا فشار دادن دو طرف ضایعه انجام دهید)




▪ محل گزش را با آب و صابون بشویید . دقت کنید استفاده از آب بسیار سرد ممکن است باعث تشدید درد و سوزش شود . با استفاده از یک دستمال پارچه ای تمیز محل را خشک کنید. از ساییدن و مالش شدید ضایعه خودداری نمایید .

▪ مقدار کمی پماد کالامین ، کالاندولا یا هیدروکورتیزون بر روی ضایعه بماليد .
▪ تا زمان بهبودی به توصیه های بالا کاملا عمل نمایید .

در موارد زیر حتما به پزشک یا مرکزاوردانس مراجعه کنید :

- ❖ اگر محل گزش در سر ، صورت گردن ، داخل دهان یا بینی و چشم ها است .
- ❖ اگر دچار گزش در چندین نقطه ای مختلف و متعدد شده ايد .
- ❖ اگر هر یک از علایم بالا در شما بروز کرده است .
- ❖ اگر سابقه ای حساسیت شدید به نیش زنبور یا سایر حشرات را دارید .
- ❖ اگر سابقه ابتلا به آسم ، حساسیت های تنفسی یا پوستی و کهیر در شما وجود دارد .
- ❖ اگر از آخرین زمانی که واکسن تزریق کرده اید بیش از ۱۰ سال می گذرد .



واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی

برگرفته از دستورالعمل یکپارچه ترجیح از اورژانس ((دیتا))

با آرزوی سلامتی

آدرس وب سایت بیمارستان :

nkums.ac.ir/category/1541