



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی خراسان شمالی

بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم

دارند و یا فرم تزریقی دارو را مصرف میکنند اتفاق می افتد، عفونت التهاب و تورم پانکراس،


ترومبوسیتوپنی و زردبینی

عوارضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشک دارند: تاری دید، درد قفسه سینه،

گیجی، اسهال، سردرد، افزایش حساسیت پوستی به آفتاب، حساسیتهای موضعی، بی اشتهایی،

عصبانیت، افت فشارخون وضعیتی، زود انزالی، درد و گرفتگی معده

فوروزماید



تهیه و تنظیم :

واحد آموزش سلامت ۱۴۰۲



قرص فوروزماید Furosemide از داروهای ادرارآور است که به منظور درمان کم ادراری ناشی از نارسایی کلیوی و همچنین درمان پرفشاری خون، کاهش وزن، ادم ریه حاد، آسیت و... تجویز میشود.

موارد منع مصرف:

حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به دارو، آنوری(کاهش ادرار)، اغمای کبدی یا تخلیه الکتروولت های بدن، ازیمی، اولیگوری یا زمانی که نارسایی پیشرونده کلیه در حین درمان اتفاق بیفتد.

توصیه های خود مراقبتی به بیمار:

□ مصرف قرص فوروزماید را میتوان با شیر یا غذا میل نمود. ولی ممکن است میزان جذب آن با غذا کمی کاهش یابد .

□ هرگونه سابقه حساسیت دارویی یا غذایی که داشته اید به اطلاع پزشک برسانید .

□ در صورتیکه سابقه ابتلا به بیماریهای قلبی، کبدی، کلیوی، دیابت، نقرس، مشکلات پروستات یا دفع ادرار و اختلالات خونی دارید پزشک را مطلع کنید

□ پس از مصرف فوروزماید ممکن است تا ۶ ساعت پرادراری شما ادامه یابد .

□ اگر مبتلا به دیابت هستید، جهت تست قند خون با پزشک مشورت کنید زیرا این دارو ممکن است در میزان قند خون تاثیر بگذارد .

□ در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر این که تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد. در این صورت، مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر گردد .

□ حتی در صورت احساس بهبودی باید مصرف دارو را ادامه دهید .

□ بهتر است در دوران شیردهی این دارو را مصرف نکنید .

□ در صورت احساس صدا در گوش، دل پیچه شدید، گلو درد و تب پزشک را مطلع کنید .

□ توصیه میشود طی درمان با فوروسماید از قرار گرفتن غیرضروری در برابر نور آفتاب پرهیز کنید .

□ در صورتیکه در دوران بارداری به سر میبرید درباره مصرف یا عدم مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت کنید .

□ طی مصرف این دارو نمک کمتر و غذاهای حاوی پتاسیم مثل موز مصرف کنید.

□ از بیدار شدن سریع از رختخواب، یا تغییر وضعیت سریع نشستن یا دراز کشیدن، اجتناب کنید چون ممکن است دچار سرگیجه شوید. به آرامی و محکم حرکت کنید تا از افتادن شما جلوگیری شود.

□ بهتر است ۴ ساعت مانده به ساعت خواب داروی فوروزماید مصرف نشود.

عوارض دارویی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود.

اگرچه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا

داروساز مشورت نمایید :

عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارند: واکنشهای آلرژیک راش پوستی، وجود خون در

ادرار، در فرم تزریقی برهم خوردن تعادل الکترولیتها، خونریزی دستگاه گوارش در صورت

مصرف فرم زریقی، نقرس، اختلالات کبدی، لوکوپنیا، کاهش گرانولوسیت خون

گلوبولهای سفید خون (آگرانولوسیتها)، سمیت شنوایی در بیمارانی که مشکلات کلیوی

