

اداره سلامت نوزادان

دفتر سلامت جمیعت، خاکواده و مدارس


وزارت بهداشت


# بسته خدمتی احیاء نوزاد

چاپ اول

سال ۱۳۸۹







# پسته خدمتی احیای نوزادان


*Neonatal Resuscitation Program  
(NRP)*

اداره سلامت نوزادان

دفتر جمعیت، خانواده و مدارس


معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۳۸۹ بهار




اداره سلامت نوزادان  
دفتر سلامت خانواده و جمعیت  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ




مولفین:

کارشناس ارشد مامایی و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	فروزان اکرمی
متخصص اطفال و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	دکتر امیر عباس بشارتی
متخصص اطفال و رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت	دکتر سید حامد برکاتی
فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد	دکتر حسن بسکابادی
متخصص اطفال و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	دکتر عباس حبیب‌الهی
فوق تخصص نوزادان و رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	دکتر محمد حیدرزاده
کارشناس ارشد مامایی و کارشناس اداره سلامت نوزادان	حاجیه جعفری پردستی
فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز	دکتر عبدالله جنت دوست
کارشناس مامایی و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	نسرین رشیدی جزئی
متخصص اطفال و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	دکتر محمد رضا زرکش
متخصص پزشکی اجتماعی	دکتر فرنوش داودی
متخصص اطفال و مدیر کل دفتر جمعیت، خانواده و مدارس	دکتر محمد اسماعیل مطلق
کارشناس ارشد مامایی و کارشناس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	روشنک وکیلیان

**کسایر همکاران:**

فاطمه دستفان	کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مجید محمدی زاده	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آقای دکتر مسعود روضاتی	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خانم زهرا جوانمردی	کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خانم دکتر بهاره بهمن بیجاری	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
خانم شهره فروذ نیا	کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
خانم معصومه پوزشی	کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خانم معصومه صمدی	کارشناس پرستاری، بیمارستان الزهراء تبریز
خانم شهلا بزاریان	کارشناس مامایی، بیمارستان الزهراء تبریز
آقای دکتر احمد پور	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی بابل
آقای دکتر حق شناس	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی بابل
خانم طبیبه سلمانیان	کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
خانم دکتر بتول تیموری	متخصص زنان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خانم پروین پودینه	کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
آقای دکتر مجید کلانی	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم جمیل السادات صدرایی	کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر آزیتا کریمی	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم صغیری شری زاد	کارشناس مامایی، بیمارستان الزهراء تبریز
خانم شهرزاد والافر	کارشناس مامایی، اداره سلامت مادران وزارت بهداشت
خانم لاله زارع زاده	کارشناس مامایی، بیمارستان شهید اکبرآبادی
آقای دکتر شاهین نریمان	فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر نخعی	متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خانم دکتر سهیلا خزائی	فوق تخصص عفونی کودکان، اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت
خانم لیلا هادی پور	کارشناس ارشد مامایی، اداره سلامت مادران وزارت بهداشت

صفحه	فهرست:
۸	پیشگفتار
۱۰	مقدمه
۱۳	فصل اول: راهنمای بالینی احیاء نوزاد
۴۳	فصل دوم: مدیریت منابع انسانی
۴۷	فصل سوم: مدیریت منابع مالی، تجهیزات وسایل و داروها
۵۵	فصل چهارم: آموزش و پژوهش
۷۳	فصل پنجم: ساز و کار اجرائی
۸۷	فصل ششم: پایش . ارزشیابی
۱۱۵	منابع
۱۱۸	صمائمه:



## پیشگفتار:

بسته خدمتی احیاء نوزاد که پیش روی شماست ۲ هدف مهم را دنبال می کند:

۱. حضور شخصی که مسئولیت اولیه او نوزاد بوده و توانایی شروع احیاء را داشته باشد. البته خود این شخص یا شخص دیگری که مهارت‌های لازم برای اجرای یک احیاء کامل را داشته باشد باید در دسترس باشد.

۲. فراهم کردن یک برنامه آموزشی مناسب برای ارتقاء دانش و مهارت ارائه دهنده احیاء نوزاد به گونه ای که برای تمامی زایشگاه‌ها و بخش‌های مراقبت نوزادان قابل دسترس باشد.

هدف از تنظیم این بسته خدمتی تعیین چهارچوب کاری و ارایه راهکارهای اجرایی برای احیای نوزادان به همراه منابع، مستندات، سیاست‌ها و پیشنهادهایی است که در سطح ملی برای اجرای موفق فرایند احیای نوزادان مورد نیاز می باشد. در این بسته، ملزومات اجرای فرایند احیای نوزاد، با توجه به شرایط اختصاصی سیستم بهداشتی کشور، به تفکیک و تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و اقداماتی که باید برای تحقق استانداردهای فرایند احیا صورت بگیرند، همراه با مسؤول انجام هر اقدام، ویژگی‌ها، نیازمندی‌ها (اعم از منابع و اطلاعات) و معیارهای پایش و ارزشیابی آن را تعیین شده است.

این مجموعه مشتمل بر شش فصل است:

فصل اول: راهنمای بالینی نوزاد است که برای فهم اصول اولیه احیا نوزاد وایجاد یک چارچوب اساسی برای انجام اقداماتی که به اصلاح و بهبود روند طبیعی حیات نوزاد می‌انجامد پرداخته است

فصل دوم: راجع به مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی مورد نیاز برای انجام عملیات احیای موفقیت آمیز بحث می‌کند و استانداردهای مدنظر در بعد نیروی انسانی را مطرح می‌نماید.

فصل سوم: به این مطلب مهم که چگونه عملیات احیا نوزاد از نظر منابع مالی تجهیزات و امکانات مورد نیاز، داروها و... پشتیبانی خواهد شد می‌پردازد. مباحث بیان شده در این فصل نقش مهمی در استانداردهای فرایندی پشتیبان و فرایندی خدمت که همان عملیات صحیح احیا نوزادان است به عهده دارد.


فصل چهارم: به دلیل ضرورت به روز رسانی آگاهی و مهارت کلیه افراد درگیر در احیا نوزاد و نیاز به استمرار برنامه‌های آموزشی نظری و عملی همچنین جایگاه ویژه پژوهش و تحقیقات مرتبط با احیا نوزاد به آموزش و پژوهش توجه شده است.

فصل پنجم: سازوکار اجرایی و روش‌های پیاده سازی برنامه را در سطح دانشگاهی و مراکز درمانی کشور با هدف استانداردهای سازی عملیات احیا را توضیح می‌دهد.

فصل ششم: شیوه پایش و کنترل فعالیت‌های اجرایی در راستای پیاده سازی برنامه و چگونگی اطمینان از تحقق اهداف از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد.

امید است این مجموعه گامی در جهت استقرار موثر و استمرار مناسب در برنامه احیا نوزادان کشور باشد. و وسیله‌ای برای تضمین حیات نوزادان که حق مسلم آنها می‌باشد محسوب گردد. نظرات و پیشنهادات اجرایی شما عزیزان مارا در ارائه کاملتر و جامع‌تر این مجموعه کمک خواهد نمود.

دکتر محمد حیدرزاده  
رئیس اداره سلامت نوزادان  
دفتر سلامت جمعیت، خانوار و مدارس



یکی از شاخص های توسعه یافته‌گی در هر کشور میزان مرگ و میر نوزادان است. در کشور ما با اجرای برنامه های مختلف در توسعه سلامت عمومی و سلامت کودکان تفاوت های چشم گیری در سلامت کودکان حاصل شده است. کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال یکی از اهداف مهم توسعه هزاره می باشد و از آنجایی که مرگ نوزادان درصد زیادی از مرگ کودکان زیر ۵ سال را به خود اختصاص داده است بدون توجه به سلامت نوزادان، کاهش مرگ و میر این گروه میسر نخواهد بود.

عملیات احیایی می تواند راهگشا باشد که براساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد . با توجه به تفاوت اساسی عملیات نوزادان با احیای بزرگسالان استاندارد سازی عملیات احیا نوزادان در سطح مرکز بهداشتی و درمانی کشور ضروری است، بر عملیات احیا نوزاد، فرایند های مختلفی تاثیر می گذارند بنابراین برای انجام یک احیا موفقیت آمیز و صحیح بایستی احیا کنندگان اعم از ماماها پرستاران، پزشکان از نظر آگاهی و مهارت مناسب باشند، احیا کنندگان مناسب با استفاده از منابع، اعم از تجهیزات و ابزارها و وسائل و با به کاگری اطلاعات جدید دقیق قادر خواهند بود، اجزا عملیات احیا را به درستی انجام داده و مستندات دقیقی از آن به ثبت بررسانند. با امید آنکه مدرجات این مجموعه بتواند در تحقق آرمان عملیات صحیح و به موقع احیا نوزاد در سطح مراکز درمانی موثر باشد و سبب تداوم حیات توانم با سلامت کامل جسم و ذهن نوزادان گردد. و احیا کنندگان پایه و پیشرفت اعم از ماماها، پرستارها، پزشکان عمومی و متخصص و کارشناسان محترم برنامه های نوزادان و تیم های اجرایی برنامه احیا نوزادان در سطح دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها بتوانند نهایت بهره را برای احیا نوزادان ببرند. به امید موفقیت روزافزون کلیه دست اندکاران سلامت نوزادان کشور.

**دکتر سید حسن امامی رضوی**  
**معاون درمان**


**دکتر علیرضا مصادقی نیا**  
**معاون بهداشت**



# فصل اول

راہنمایی پالینی احیاء

نوزاد



## آماده شدن برای عملیات احیاء

آماده شدن برای عملیات احیاء به اندازه خود آن اهمیت داشته و تاثیر زیادی بر سرانجام نوزاد دارد. آماده شدن شامل فرآخوانی افراد دیگر برای عملیات احیاء پیشرفتی (در صورت نیاز)، آماده کردن اتاق زایمان یا اتاق عمل و وسائل و تجهیزات مورد نیاز است. این فرایند توسط مامای مسئول نوزاد در اتاق زایمان انجام می شود. مسئول نوزاد در زایمان طبیعی ماما و در زایمان به روش سزارین، در صورت عدم امکان حضور ماما، پرستار یا تکنیسین بیهوشی است. مسئول نوزاد موظف است اتاق زایمان را برای عملیات احیاء مناسب با میزان خطر نوزاد در حال زایمان، فراهم کرده و بعد از تولد نوزاد احیاء را شروع کند. همان طور که در آلگوریتم ۱-۱ مشاهده می کنید بر اساس سن حاملگی و شرایط جنین در حال زایمان، آماده شدن برای عملیات احیاء به سه دسته تقسیم بندی می شود:

### (۱) آماده شدن برای عملیات احیاء حاملگی بدون خطر:

- درجه حرارت اتاق زایمان کترل و توصیه می شود همواره در حد ۲۸-۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم گردد. گرم کننده تابشی نیم ساعت قبل از انجام زایمان روش نمایید.
- حواله های مخصوص خشک کردن نوزاد حداقل نیم ساعت قبل از زایمان (حداقل دو عدد) زیر گرم کننده تابشی گرم شده باشد.
- وسائل تهويه با فشار مثبت دردسترس قرار گرفته و امتحان شده و از اتصال اکسیژن به آنها اطمینان حاصل گردد:
- ماسک مناسب با ابعاد صورت نوزاد استفاده شود.
- بگ با حجم ۷۵۰-۴۰ سی سی و غیره (مراجعةه به جدول ۳-۱)
- پوار و دستگاه ساکشن آماده و کترل شود و کاتترهای ساکشن به شماره های مختلف روی تخت احیاء نوزاد آماده باشد.

### (۲) آماده کردن برای عملیات احیاء حاملگی پرخطر با سن حاملگی بالاتر از ۲۸ هفته:

- آماده کردن تمام موارد ذکر شده در احیاء حاملگی کم خطر از ۱۵ دقیقه قبل از زایمان پزشک واجد گواهی احیاء پیشرفتی نوزاد (فوق تخصص نوزادان یا متخصص اطفال دوره دیده، یا جانشین های وی - ارجاع به فصل ۲) فرآخوانده شده و در محل زایمان حضور داشته باشد.
- آماده شدن وسائل و تجهیزات اضافی مورد نیاز برای احیاء نوزاد نارس در صورتی که نوزاد سن حاملگی کمتر از ۳۲ هفته دارد (مراجعةه به جدول ۳-۱).

### (۳) انکوباتور پرتابل روش و درجه حرارت و تهويه آن، حداقل نیم ساعت قبل از تولد نوزاد کترل شود.


- ### (۴) آماده کردن برای عملیات احیاء پیشرفتی با سن حاملگی کمتر از ۲۸ هفته:
- آماده شدن تمام موارد ذکر شده در احیاء حاملگی کم خطر و پرخطر با سن حاملگی بالاتر از ۲۸ هفته قبل از زایمان پزشک فوق تخصص نوزادان / یا پزشک متخصص اطفال دارای گواهی احیاء پیشرفتی نوزاد به همراه یک پرستار بخش مراقبت ویژه نوزادان، به اتاق زایمان فرآخوانده شوند.
  - بالشتک های گرم کننده در دسترس و در هنگام انتقال نوزاد نارس در انکوباتور قابل حمل قرار گیرد.
  - پوشش پلاستیکی برای حفظ رطوبت بدن نوزاد نیم ساعت قبل از زایمان آماده شده و محل خروج سر نوزاد از کیسه پلاستیکی باز و مشخص شود.

- بالشتک حرارتی شیمیایی داخل انکوباتور قرار گیرد تا به محض گذاشتن نوزاد جهت انتقال حرارت لازم را تامین نماید.
- دستگاه پالس اکسی متر وپرور آن آماده ودر دسترس باشد.
- دستگاه تی پیس احیاء در کنار تخت احیاء نوزاد آماده باشد.
- از قبل منبع اکسیژن (در نوزادان نارس کمتر از ۳۲ هفته شامل منبع هوا و بلندر) و سایر تجهیزات مورد نیازآماده و در کنار تخت احیاء وجود داشته باشد.

### جدول ۱: عوامل خطر بارداری و زایمان که نیاز به عملیات احیاء نوزاد را پیش بینی می کند

عوامل قبل از زایمان	
چند قلویی	دیابت مادر
عدم تناسب اندازه و سن جنین	هیپرتانسیون دوران بارداری یا مزمون آنمی یا ایزوایمونیزاسیون
درمان دارویی ( مثلاً کربنات لیتیوم، منیزیوم، داروهای بلوك کننده آدرنرژیک )	سابقه مرگ قبلی جنین یا نوزاد پلی هیدرآمینوس
استفاده از مواد مخدر توسط مادر	اولیگووهیدرآمینوس
ناهنجاری های مادرزادی جنینی	هیدروپس جنین
کاهش فعالیت جنین	دیسترس جنینی
پارگی زودرس پردهها	سن کمتر از ۱۶ یا بالاتر از ۳۵
نازایی	
عوامل حین زایمان	
برادیکاردی طول کشیده جنین	سزارین اورژانس
اشکال غیر عادی ضربان قلب جنین	زایمان به کمک فورسپس یا واکیوم
تنانی رحم	زایمان بریج یا سایر حالت های غیر عادی
تجویز داروهای مخدر به مادر در طی ۴ ساعت قبل از زایمان	زایمان زودرس
مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم	زایمان تسريع یافته
پرولاپس بند ناف	کوریوآمنیونیت
جفت سر راهی	پارگی طولانی مدت پردهها (بیش از ۱۸ ساعت قبل از زایمان)
جدا شدن زودرس جفت	زایمان طول کشیده (بیش از ۱۸ ساعت)
خونریزی قابل توجه حین زایمان	طولانی شدن مرحله دوم زایمان (بیش از ۲ ساعت)
ماکروزوومی	

## آلگوریتم ۱-۱: آمادگی برای احیاء




## عملیات احیاء

همان طور که در آلگوریتم ۱-۲ مشاهده می کنید عملیات احیاء با ارزیابی اولیه، نوزاد شروع شده و بر اساس شرایط نوزاد پیشرفت می کند. عملیات احیاء پایه شامل گامهای نخستین احیا، تهییه با فشار مثبت و فشردن قفسه سینه است. مت加وز از ۹۰ درصد از نوزادان نیازمند عملیات احیاء با انجام احیاء پایه بهبود پیدا کرده و نیاز به اقدامات پیشرفتی آن ندارند. احیاء پیشرفتی شامل احیاء پایه بعلاوه لوله گذاری نای، تجویز پی نفرین و در صورت نیاز مایع حجم دهنده است.

بر اساس تحلیل داده های مرگ نوزاد در سراسر کشور در سال ۱۳۸۸ مت加وز از ۵۴ درصد از موارد مرگ نوزاد در گروه سنی با سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته قرار دارند. این در حالی است که این گروه از نوزادان فقط ۵٪ از کل متولدین زنده را شامل می شوند. از این رو راهنمای بالینی احیاء نوزادان نارس به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

## آلگویتم ۲-۱: عملیات احیاء



## ارزیابی اولیه:

برای اجرای صحیح فرایند احیا، لازم است تا مطالب این بخش و بخش های بعدی (که همگی ذیل عنوان اجرای عملیات احیا طبقه بندی شده اند) به ترتیب و با رعایت تمام اجزا پیاده شوند. مبنای مطالب یاد شده "برنامه احیای نوزادان - NRP" می باشد. به عنوان نخستین اقدام لازم است تا نوزادان نیازمند احیا شناسایی شوند.

### شناسایی نوزاد نیازمند احیا

- تمامی نوزادان متولد شده باید بلافارصله بعد از تولد از نظر موارد زیر مورد ارزیابی قرار گیرند.
  - ١. نوزاد ترم است/ نیست (قبل از زایمان مشخص شود)
  - ٢. مایع آمنیوتیک شفاف بوده/ نبوده و به مکونیوم آعشه نیست/ است (قبل از زایمان مشخص شود)
  - ٣. تنفس نوزاد طبیعی است/ نیست
    - گریه نوزاد قوی است/ نیست
    - حرکات قفسه سینه نوزاد قرینه و فعال است/ نیست .
    - الگوی تنفس **gaspings** است/ نیست
  - ٤. وضعیت تون عضلانی خوب است/ نیست
    - اندام ها در وضعیت فلکسیون است/ نیست
    - نوزاد فعال است/ نیست
- نوزاد ترم، با مایع آمنیوتیک شفاف، تنفس طبیعی و تون عضلانی خوب، تحت "مراقبت های معمول<sup>۱</sup>" برای نوزادان تازه متولد شده قرار می گیرد.
- در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نشود، "عملیات احیا" آغاز شده و نوزاد وارد مرحله گام های نخستین و تامین راه هوایی می شود.

<sup>۱</sup> برای توضیحات بیشتر در زمینه "مراقبت های معمول" به بسته خدمتی نوزاد سالم مراجعه کنید.

## گام های نخستین و تامین راه هوایی

نوزادانی که نیازمند احیا تشخیص داده می شوند از ابتدای نیازمند اقداماتی نظیر فشردن قفسه سینه یا تجویز دارو نیستند. مجموعه ای از اقدامات ساده که از آنها به عنوان "گام های نخستین احیا" یاد می شود به همراه تامین راه هوایی مناسب، منجر به پایدار شدن شرایط بسیاری از نوزادان می شود.

### تامین گرمای مناسب

- دمای اتاق زایمان را در محدوده 25–28 سانتیگراد نگهدارید.
- نوزاد را زیر گرم کننده تابشی که نیم ساعت قبل از تولد نوزاد روشن شده است، قرار دهید.
- در مورد نوزادان نارس زیر ۳۲ هفته به راهنمای بالینی احیاء نوزاد نارس مراجعه شود.

### تمیز کردن راه هوایی

- در نوزاد با مایع آمنیوتیک غیر آغشته به مکونیوم، ابتدای دهان و سپس بینی را بوسیله پوآر، از ترشحات تمیز کنید.
- در نوزاد با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و سرحال<sup>۱</sup> با استفاده ازا پوآر یا کاتتر بزرگ (سوند ساکشن شماره ۱۴–۱۲ دارای سوراخ در انتهای<sup>۲</sup>) نخست دهان و سپس بینی را از ترشحات تمیز کنید.
- در نوزاد با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و بدحال ابتدای دهان و حلق را با کاتتر ساکشن شماره ۱۴–۱۲ ساکشن کرده و سپس لوله گذاری و ساکشن مستقیم تراشه را انجام دهید (مراجعه به لوله گذاری).

### قرار دادن نوزاد در وضعیت مناسب

- گردن را در وضعیت اکستانسیون مناسب (وضعیت بو کشیدن<sup>۳</sup>) قرار دهید.
- از فلکسیون یا هیپر اکستانسیون گردن نوزاد اجتناب کنید.
- نوزاد را در وضعیت ترندلنبرگ (وارونه) قرار ندهید.

### خشک کردن نوزاد

- حداقل ۲ حolle یا پتوی جاذب را پیش از تولد نوزاد (معمولباً با قرار دادن در زیر گرم کننده تابشی) گرم کرده و در دسترس قرار دهید.
- سر و بدن نوزاد را کاملاً خشک کنید.
- حolle / پتو خیس را از نوزاد جدا کرده، وی را با حolle / پتو خشک مجدداً بپوشانید.
- به حفظ وضعیت مناسب در طول مدت خشک کردن توجه کنید.
- نوزادان با سن بارداری کمتر از ۲۸ هفته را نباید با حolle خشک کنید بلکه با قرار دادن آنها در کیسه پلاستیکی از جنس پلی اتیلن از دفع مایعات آنها جلو گیری نمایید. (مراجعه به راهنمای بالینی احیاء نوزاد نارس)

\*<sup>۱</sup> نوزاد vigorous (سرحال) به این صورت تعریف می شود: تلاش تنفسی قوی، تون عضلانی خوب، و  $HR > 100 \text{ bpm}$ . روش اندازه گیری تعداد ضربان قلب در انتهای این درس شرح داده خواهد شد.

<sup>۲</sup> End hole

<sup>۳</sup> Sniffing

## تحریک کردن نوزاد

- در مواردی که خشک یا ساکشن کردن تحریک تنفسی کافی ایجاد نکرده، از ضربه زدن ملایم به کف پا، ماساژ ملایم پشت یا اندام ها استفاده کنید.
- از وارد کردن ضربات شدید، تکان دادن نوزاد، فشردن قفسه سینه، فشردن ران ها برروی شکم، گشاد کردن اسفنکتر مقعد و کمپرس گرم یا سرد اجتناب کنید.
- در صورت عدم ایجاد پاسخ تنفسی پس از یک یا دو بار تحریک، با تشخیص آپنه ثانویه تحریک را متوقف کرده و نوزاد را برای تهويه با فشار مثبت آماده کنید.

**قراردادن مجدد نوزاد در وضعیت مناسب**

### ارزیابی وضعیت نوزاد پس از مراقبت های اولیه

- حرکات قفسه سینه، تعداد و عمق نفس ها را بررسی کنید. تنفس **gaspings** را معادل آپنه در نظر بگیرید.
- تعداد ضربان قلب نوزاد را در پایه بند ناف به مدت ۶ ثانیه بشمارید و در ۱۰ ضرب کنید. در صورتی که ضربان قلب در پایه ناف قابل لمس نباشد، با گوشی پزشکی قفسه سینه را گوش دهید.
- رنگ لب و بدن نوزاد و وجود سیانوز مرکزی را ارزیابی کنید. آکروسیانوز فاقد اهمیت بالینی است.

### تصمیم گیری برای ادامه عملیات احیاء

- نوزادی را که تنفس منظم و موثر داشته و ضربان قلب وی بیش از ۱۰۰ ضربه در دقیقه است، رنگ لب و بدن او صورتی است و سیانوز مرکزی ندارد، تحت نظر قرار دهید.
- به نوزادی که تنفس منظم و ضربان قلب طبیعی (بیشتر از ۱۰۰) دارد اما سیانوز مرکزی دارد، اکسیژن آزاد تجویز نمایید.
- به نوزادی که تنفس کارآمد ندارد یا ضربان قلب وی کمتر از ۱۰۰ می باشد تهويه با فشار مثبت تجویز کنید.

### زمان

برای نوزادانی که وارد مرحله "گام های نخستین" شده اند، لازم است تا کلیه اقدامات ذکر شده، به ترتیب و حداکثر ظرف مدت ۳۰ ثانیه انجام گیرد.

### تهويه با فشار مثبت:

برقراری تنفس کارآمد عمدتا شامل اکسیژن رسانی و تهويه با فشار مثبت است. این مرحله را می توان یک نقطه عطف در عملیات احیای نوزادان در نظر گرفت. همین موضوع توضیح مناسبی برای لزوم اجرای دقیق استانداردهای این مرحله می باشد.

### اکسیژن درمانی

- در نوزادی که تنفس منظم و ضربان قلب طبیعی (بیشتر از ۱۰۰) دارد اما سیانوتیک است تجویز اکسیژن آزاد را مدد نظر داشته باشید.

- در تمامی نوزادان، تجویز اکسیژن با غلظت کمتر از ۱۰۰ درصد توصیه می شود ولی در نوزادان با سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته به علت عوارض قابل توجه اکسیژن تجویز اکسیژن با درصد کمتر از ۱۰۰ درصد ضروری است (راهنمای بالینی احیاء نوزاد نارس).
- مقدار اکسیژن تجویز شده حداقل ۵ لیتر در دقیقه و حداقل ۱۰ لیتر در دقیقه باشد.
- اکسیژن آزاد را با کمک بگ بیهوشی، ماسک، فنجانی کردن دست به دور لوله اکسیژن یا دستگاه تی پیس تجویز کنید. با توجه به عدم اطمینان از تحويل اکسیژن به نوزاد در بگ های خود متسع شونده به جز هنگام فشرده شدن، توصیه می شود برای اکسیژن رسانی از آن استفاده نشود.
- برای دوره کوتاه مصرف اکسیژن در عملیات احیا، نیاز به گرم و مرتبط کردن اکسیژن نمی باشد. در صورت نیاز به مصرف طولانی مدت اکسیژن، ABG و پالس اکسیمتری انجام دهید، اکسیژن را مرتبط کرده و غلظت آن را توسط دستگاه مخلوط کننده اکسیژن و هوای (بلندر) تعدیل کنید.
- در صورت بر طرف شدن سیانوز اکسیژن را به تدریج قطع کنید. در صورت برطرف نشدن سیانوز در پی تجویز موثر جریان آزاد اکسیژن، تهویه با فشار مثبت انجام دهید.

#### تهویه با فشار مثبت

- در صورتی که تا کنون به تنهایی مسؤولیت احیای نوزاد را بر عهده داشتید، حداقل یک نیروی کمکی یا دو نفر (در مواردی که حدس زده می شود که نیاز به عملیات پیشرفته تری مانند فشردن قفسه سینه و لوله گذاری نای مورد نیاز باشد) را فرا بخوانید تا یک نفر مسؤول ونتیلاسیون و دیگری مسؤول ادامه گام های نخستین احیاء باشد.
- نوزاد را در وضعیت مناسب (بوکشیدن) قرار داده و به عنوان فرد احیا کننده در کنار نوزاد یا بالای سر نوزاد قرار گیرید، به نحوی که حرکات قفسه سینه نوزاد قابل مشاهده باشد.
- ماسک را به صورتی بر روی صورت نوزاد قرار دهید که دهان و بینی نوزاد کاملا در زیر ماسک قرار بگیرد. برای کم شدن احتمال نشتی توصیه می شود ابتدا قاعده ماسک بر روی چانه قرار گرفته سپس ماسک را بر روی دهان و بینی هدایت کنید.
- توصیه می شود تهویه با فشار مثبت با هوای اتاق شروع شود. در صورت عدم بھبودی قابل قبول تا ۹۰ ثانیه پس از تولد، اکسیژن با غلظت بالاتر تا ۱۰۰ درصد، مورد استفاده قرار گیرد. بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که تأمین تهویه مؤثر باید هدف اصلی باشد.
- برای نوزاد تهویه مناسب تعداد تنفس را بین ۴۰-۶۰ بار در دقیقه تنظیم کنید. در صورت بھبود وضعیت نوزاد، تعداد تنفس کمکی به تدریج کاسته شود.
- برای برقراری فشار مناسب در حین تهویه، در طی تهویه با فشار مثبت به حرکت قفسه سینه توجه کنید. در صورت عدم وجود حرکت قفسه سینه به وضعیت قرار گرفتن مناسب ماسک و نشتی آن و نیز به وجود انسداد در راه هوایی توجه کنید در صورت عدم بھبودی تنفس نوزاد، مقدار فشار افزایش دهید. در صورت عدم وجود حرکات قفسه سینه با اقدامات ذکر شده لوله گذاری را انجام بدهید. در صورت بھبود وضعیت نوزاد، فشار به تدریج کاسته شود.
- در صورتی که تهویه با فشار مثبت برای بیش از چند دقیقه ادامه می یابد، باید لوله دهانی معدی تعییه شود. برای این منظور از لوله تغذیه با اندازه ۸ و سرنگ ۲۰ سی سی استفاده کنید. طول مناسب لوله با توجه به مجموع فاصله بین پل

بینی تا لاله گوشی و از لاله گوش تا نقطه مابین زایده گزینه قویید تعیین می شود. بعد از راندن لوله به معده از راه دهان، محتويات آن را آسپیره کرده و انتهای آن را به گونه نوزاد فیکس کنید. انتهای لوله با اتصال به محفظه سرنگ بدون پیستون باز نگه داشته شود.

### تصمیم گیری برای ادامه عملیات احیاء

- نوزاد با ضربان قلب بیشتر از ۱۰۰، با رنگ صورتی و بدون سیانوز مرکزی، فعال، با اندام ها در وضعیت فلکسیون، که صدای تنفسی وی توسط گوشی قابل سمع بوده و حرکات قفسه سینه فعال داشته باشد، نیاز به ادامه تهویه با فشار مثبت ندارد. لذا تجویز تهویه با فشار مثبت را قطع و تجویز جریان آزاد اکسیژن را ادامه دهید.
- در صورتی که تعداد ضربان قلب نوزاد بین ۶۰-۱۰۰ ضربه در دقیقه بود، تهویه با فشار مثبت را ادامه دهید.
- در نوزاد با ضربان قلب کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه، فشردن قفسه سینه را آغاز کنید.

### فشردن قفسه سینه

انتظار می رود که اغلب نوزادان با اقدامات اوایله و یا تهویه با فشار مثبت شرایط پایداری پیدا کنند. اما به هر حال در صدی از موارد به اقدامات پیشرفته تری مانند فشردن قفسه سینه نیاز دارند. به مواردی که باید در زمینه فشردن قفسه سینه به آن توجه کرد در زیر اشاره شده است:

- نوزادی که علیرغم دریافت تهویه با فشار مثبت موثر به مدت ۳۰ ثانیه، ضربان قلبی کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه دارد، کاندید فشردن قفسه سینه است.
- در این مرحله حداقل به ۳ نفر برای ادامه احیاء نیاز است. یک نفر مسئول ارزیابی نوزاد و ادامه گام های نخستین احیاء، یک نفر مسؤول ونتیلاسیون و دیگری مسؤول فشردن قفسه سینه. در صورت نیاز به قرار دادن کاتتر ورید نافی باید فرد چهارم نیز فراخوانده شود. لذا رهبر تیم باید بر اساس ارزیابی خود از وضعیت نوزاد، تعداد افرادی را که مورد نیاز است ارزیابی کرده و اقدام به فراخوانی آنها کند.
- اگر تا کنون لوله گذاری نای انجام نشده است توصیه می شود لوله گذاری صورت گیرد. این عمل احتمال موفقیت در احیاء را افزایش می دهد. البته در صورت عدم حضور فردی که در این امر مهارت دارد بهتر است وی را فراخوانده و فشردن قفسه سینه و تهویه با فشار مثبت توسط ماسک را به صورت هماهنگ شروع کنید.

### روش فشردن قفسه سینه:

- در روشن شست، دو انگشت شست برای فشردن جناغ بکار می رود در حالی که هر دو دست دور قفسه سینه حلقه زده و انگشتان نیز ستون فقرات را نگه می دارند.
- در روشن دو انگشتی که نوک انگشت میانی و انگشت اشاره یا حلقه یک دست برای فشردن جناغ بکار می رود، در حالی که از دست دیگر برای ثابت نگه داشتن پشت نوزاد استفاده می شود (مگر این که نوزاد بر روی یک سطح سفت قرار گیرد).
- قفسه سینه نوزاد را به صورت عمودی فشار دهید، به نحوی که در هر بار فشرده شدن، قفسه سینه به اندازه یک سوم قطر قدمای خلفی فرو برسد و از اعمال فشار اضافی که منجر به پارگی کبد یا شکستگی دنده ها می گردد، اجتناب شود.

- تهويه ريوی همزمان: به ازاي هر ۳ بار فشار قفسه سينه، يك بار تنفس دهيد، به نحوی که در طول يك دقیقه، جمما ۹۰ بار قفسه سينه فشرده شده و ۳۰ بار تنفس داده شود.
- تصميم گيری برای ادامه عملیات احیا
  - بعد از ۳۰ ثانية فشردن قفسه سينه همراه با تهويه با فشار مثبت، ماساژ را متوقف کرده و ضربان قلب را در قاعده بند ناف بشماريد. در صورت عدم لمس ضربان در قاعده بند ناف، تهويه را به مدت ۶ ثانية متوقف کرده و ضربان را بوسیله سمع با گوشی بشماريد.
  - در صورت کفايت حرکات قفسه سينه، اکسیژن، عمق فشار و هماهنگی فشردن قفسه سينه با تهويه با فشار مثبت، برای نوزاد با ضربان قلب کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه، درمان دارویی را شروع کنيد. در صورتی که تا به اکنون لوله گذاري نای صورت نگرفته است توصيه می شود تا فراهم شدن مقدمات تجویز اپی نفرین (کاتتر گذاري بند نافی) نوزاد را لوله گذاري داخل نای کرده و به مدت ۳۰ ثانية تهويه با فشار مثبت هماهنگ با فشردن قفسه سينه تجویز کنيد.
  - در نوزاد با ضربان قلب ۱۰۰-۶۰ فشردن قفسه سينه متوقف شده و تهويه با فشار مثبت با سرعت ۴۰-۶۰ ضربان در دقیقه ادامه می یابد.
  - در نوزاد با ضربان قلب بیشتر از ۱۰۰، تهويه با فشار مثبت را متوقف کرده و نوزاد را برای مراقبت های بعدی به بخش مراقبت های ویژه نوزادان منتقل کنيد.

### درمان دارویی

اگرچه شرایط اغلب نوزادان با اقدامات اولیه پایدار می شود، و عمدہ گروه باقیمانده به اقداماتی نظیر تهويه با فشار مثبت پاسخ می دهند ولی درصدی وارد مرحله فشردن قفسه سينه شده و عده ای نیز نهايیتا نیاز به تجویز دارو دارند. هرچند تعداد اين نوزادان در مقایسه با کل نوزادانی که نیازمند احیا هستند زياد نیست اما آشنایی با اصول صحيح دارو درمانی و بکارگیری آن در موقع لازم، ضروري است.

- نوزادی که در پی ۳۰ ثانية تهويه با فشار مثبت و متعاقب آن ۳۰ ثانية تهويه با فشار مثبت همزمان با فشردن قفسه سينه، ضربان قلبی کمتر از ۶۰ بار در دقیقه دارد کاندید استفاده از دارو است.
- پیش از تجویز دارو از کفايت مراحل قبلی احیا شامل تهويه با فشار مثبت، فشردن قفسه سينه و نیز اکسیژن کمکی اطمینان حاصل شود.
- فرد دیگری را به غير از افرادي که به ارائه گامهای نخستین احياء، تهويه با فشار مثبت و فشردن قفسه سينه مشغولند فرا بخوانيد.

### تجویز اپی نفرین از طریق ورید نافی:

- در شرایط استریل بند ناف را به کمک تیغ جراحی در زیر گیره بند ناف و حدود ۲-۱ سانتیمتر بالاتر از سطح پوست ببرید

- کاتتر را داخل ورید نافی قرار دهید. از آن جا که امتداد ورید به طرف بالا و به سوی قلب است، جهتی که شما کاتتر را قرار می دهید باید به طرف بالا باشد. کاتتر را ۲ تا ۴ سانتی متر (در نوزادان نارس کمتر) داخل کنید تا جایی که وقتی سه راهی بین کاتتر و سرنگ را باز کرده، سرنگ را به آرامی آسپیره کردید، خون به آزادی در کاتتر جریان یابد.
- دوز مناسب اپی نفرین (mL/kg / ۱۰۰۰ - ۰/۱) یا افزاینده حجم را تزریق کنید و به دنبال آن، برای راندن دارو از داخل کاتتر به بدن نوزاد، ۰/۵ تا ۱ میلی لیتر نرمال سالین به کاتتر تزریق کنید. وقتی نوزاد کاملاً احیاء شد، کاتتر را در محل خود بخیه زده یا آن را خارج سازید. برای پیشگیری از خونریزی از محل قطع ناف، گره شل ابتدایی را محکم و پانسمان فشاری کنید. در صورت از بین رفتن شرایط استریل، باید از جلوتر فرستادن کاتتر پرهیز کرد.
- تعییه ورید نافی باید توسط فردی به غیر از افرادی که به تهویه و فشردن قفسه صدری مشغولند صورت گیرد.

#### تجویز اپی نفرین از طریق لوله نای:

- در مواردی که دسترسی به ورید نافی با تاخیر مواجه می شود، از تجویز داخل تراشه اپی نفرین استفاده کنید.
- از محلول با غلظت ۱:۱۰۰۰۰ به میزان ۰-۳ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن نوزادجهت تجویز داخل نای استفاده کنید.
- دارو را با سرعت به داخل لوله تراشه بربیزید . و پس از آن چند تنفس کمکی با فشار مثبت اعمال نمایید.
- تصمیم گیری برای ادامه عملیات احیا
- ۳۰ ثانیه پس از تجویز اپی نفرین، ضربان قلب باید بیش از ۶۰ ضربه در دقیقه باشد. در غیر این صورت، تختست از کفایت تهویه با فشار مثبت، فشردن قفسه سینه، اکسیژن کمکی و صحبت تجویز دارو اطمینان حاصل کنید. احتمال هیپوولمی را بررسی کرده و درصورت لزوم درمان کنید.
- در صورت عدم افزایش ضربان، ضمن ادامه تهویه با فشار مثبت و فشردن قفسه سینه، هر ۳-۵ دقیقه دوز اپی نفرین را صرفا از راه وریدی، تکرار کنید.

#### درمان هیپوولمی:

- نوزادان رنگ پریده که به احیا پاسخ نمی دهند یا موارد همراه با احتمال از دست دادن خون مانند دکولمان، جفت یا عروق سرراهی، خونریزی از بند ناف، خونریزی از جنین به مادر و... معمولاً دچار هیپوولمی بوده و باید درمان شوند.
- داروی انتخابی، نرمال سالین است که به مقدار ۱۰ سی سی به ازای هر کیلوگرم از وزن نوزاد، از طریق ورید نافی، و طرف ۱۰-۵ دقیقه تجویز می شود.
- در صورت عدم پاسخ، ۱۰ سی سی از محلول نرمال سالین را برای بار دوم (و ندرتا بار سوم) تجویز کنید.
- از محلول رینگر لاتکتات نیز می توان به جای نرمال سالین استفاده کرد.
- در موارد آنمی شدید می توان از گلbul قرمز متراکم با گروه O منفی استفاده کرد.
- تصمیم گیری برای ادامه عملیات احیاء
- نوزادی را که ضربان قلب وی به بیش از ۶۰ ضربه در دقیقه رسید، برای مراقبت های بعدی به بخش مراقبت های ویژه نوزادان انتقال دهید.

- در نوزادی که تهويه با فشار مثبت موجب ونتیلاسیون ریه ها نمی شود، انسداد مکانیکی راه های هوایی و اختلال عملکرد ریه را بررسی کنید.
  - در نوزادی که علیرغم تهويه با فشار مثبت سیانو تیک یا برادی کارد است احتمال بیماری های مادرزادی قلب را بررسی کنید.
  - در نوزادی که تنفس خودبخودی را شروع نمی کند، آسیب های مغزی، اسیدوز شدید، بیماری های عصبی - عضلانی مادرزادی و خواب آلدگی<sup>۵</sup> به علت داروهای دریافت شده توسط مادر را بررسی کنید.
  - در نوزادی که پس از ۱۰ دقیقه احیای صحیح همچنان دچار آسیستول است، عملیات احیا را متوقف کنید.
- ساير ملاحظات:**
- داروهایی نظیر نالوكسان، بی كربنات، دوپامین، كلسيم و آتروپين در فاز حاد احیای نوزادان استفاده نمی شوند.
  - در صورت لزوم تجویز بی كربنات سدیم (بر اساس تجزیه گازهای خون شریانی)، این ماده را انحصارا از طریق وریدی تزریق کرده و به علت اثر سوزانندگی شدید، هرگز از راه داخل تراشه تجویز نکنید.
  - تزریق داروها از راه درون استخوانی در عملیات احیا در اتاق زایمان کاربردی ندارد و عمدتا در موارد احیا خارج از اتاق زایمان استفاده می شود.
  - اگر برای درمان هیپوگلیسمی در نوزاد نارس، به محلول قندی وریدی نیاز دارید، در آغاز درمان، از محلول های با غلظت بیش از حدود ۱۰٪ استفاده نکنید.

## لوله گذاري

اگرچه برای لوله گذاری زمان معینی در فرایند احیا وجود ندارد، ولی ممکن است در هر مرحله ای انجام آن ضرورت یابد. از این رو آشنایی با اصول لوله گذاری و نکات علمی و عملی مرتبط با آن یکی از اجزای انفکاک ناپذیر آمادگی برای عملیات احیاست. در زیر مهمترین نکاتی که باید در مورد لوله گذاری طی احیای نوزادان مدینظر قرار گیرند، فهرست شده اند.

**اندیکاسیون های لوله گذاری**

- برای لوله گذاری زمان معینی وجود ندارد، بلکه ممکن است در مراحل مختلف احیا لازم شود.
- در برقراری راه هوایی در مواردی که مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم است و نوزاد سرحال نیست در مواقعی که تهويه با فشار مثبت به بهبود شرایط بیمار نمی انجامد.
- در مواردی که فشردن قفسه سینه اندیکاسیون دارد، لوله گذاری توصیه می شود.
- در مواردی که تجویز داروها اندیکاسیون دارد، لوله گذاری توصیه می شود.
- در مواردی که نوزاد متولد شده به شدت نارس است، به دلیل عدم کفايت تنفسی و نیاز به سورفاكتانت، لوله گذاری توصیه می شود.
- در مواردی که نوزاد مشکوک به هرنی دیافراگم است، لوله گذاری توصیه می شود.

<sup>۵</sup>-sedation

### روش لوله گذاری برای تهویه:

۱. با دست راست خود سر نوزاد را نگاه دارید. ممکن است یک فرد دوم در نگهداشتن سر نوزاد در وضعیت «بو کشیدن» به شما کمک کند. در طی عملیات باید جریان آزاد اکسیژن به نوزاد برسد.
۲. تیغه لارنگوسکوب را در طرف راست زبان به طرف داخل با ملایمت هدایت کنید، زبان را به طرف چپ دهان هل دهید، تیغه را تا حدی که نوک آن در والیکولا قرار گیرد درست بعد از قاعده زبان پیش ببرید
۳. تیغه را به مقدار اندکی بالا بکشید، با این کار برای مشاهده کردن حلق، زبان را کنار می‌زنید. هنگام بالا کشیدن تیغه، تمام طول تیغه را در مسیر دسته لارنگوسکوب به طرف بالا بکشید
۴. به نقاط کلیدی توجه کنید. اگر شما نوک تیغه را به درستی در والیکولا قرار داده باشید، شما باید اپیگلوت را در قسمت بالا مشاهده کنید، در حالی که گلوت در پایین آن باز می‌شود. شما باید همچنین تارهای صوتی را به صورت نوارهای عمودی در طرفین گلوت یا به صورت حرف «V» معکوس مشاهده کنید.
۵. لوله را در دست راست نگهدارید، در حالی که انحنای لوله افقی قرار گرفته است آن را از طرف راست دهان وارد سازید. این عمل مشاهده گلوت را مسدود نکرده و از محدود شدن میدان دید شما توسط لوله جلوگیری خواهد شد. در حالی که گلوت را مشاهده می‌کنید، هنگامی که تارهای صوتی از هم باز هستند، نوک لوله تراشه را تا حدی که راهنمای تار صوتی در سطح تارها قرار بگیرند، داخل برازند. هنگامی که تارهای صوتی بسته باشند، صبر کنید تا از هم جدا شوند. با نوک لوله تارهای بسته را لمس نکنید زیرا ممکن است باعث اسپاسم تارها شود. هرگز به تارهای بسته فشار وارد نسازید. در صورتی که تارها در ۲۰ ثانیه باز نشدنند، لوله گذاری را متوقف کرده و با بگ و ماسک نوزاد را تهویه کنید. بعد از آن که ضربان قلب و رنگ نوزاد بهبود یافت، دوباره لوله گذاری را از سر بگیرید. دقت کنید که لوله را فقط تا حدی داخل ببرید که راهنمای تار صوتی در سطح تارهای صوتی قرار گیرد. این عمل لوله را حدوداً در نیمه راه بین تارهای صوتی و کارینا قرار می‌دهد.
۶. لوله را با یک دست نگهدارید، و لارنگوسکوب را با دست دیگر خارج سازید. با دست راست که در مقابل صورت جا گرفته است، لوله را محکم در حد لب ها نگهدارید و یا با استفاده از یک انگشت لوله را در مقابل کام سخت ثابت کنید. از دست چپ برای خارج کردن دقیق لارنگوسکوب به شکلی که باعث خارج شدن لوله نشود استفاده کنید.
۷. در صورتیکه تلاش برای لوله گذاری بیش از ۲۰ ثانیه طول بکشد، عملیات را متوقف کنید، به نوزاد تهویه با فشار مثبت تجویز شده و سپس برای لوله گذاری مجدد تلاش کنید.

### روش لوله گذاری برای ساکشن مکونیوم:

۱. بعد از لوله گذاری دریچه کترل ساکشن را مسدود کنید تا مکنده بر لوله تراشه عمل ساکشن را انجام دهد و در حالی که به ساکشن ادامه می‌دهید، به تدریج لوله تراشه را خارج سازید.
۲. لوله گذاری و ساکشن کردن را، در صورت لزوم تا حدی که خروج مکونیوم به حداقل برسد یا ضربان قلب نوزاد در حدی کاهش یابد که تهویه با فشار مثبت را ایجاب کند، تکرار کنید. در هر صورت بیشتر از ۳ تا ۵ ثانیه ساکشن لوله

تراشه را طول ندهید (هم چنان که لوله را خارج می‌کنید). اگر مکونیوم خارج نشد، دوباره عملیات را تکرار نکنید، به احیاء پردازید. اگر با اولین ساکشن مکونیوم خارج شد، تعداد ضربان قلب نوزاد را ارزیابی کنید. اگر نوزاد برادیکارדי شدید ندارد، دوباره لوله گذاری و ساکشن را انجام بدهید. اگر تعداد ضربان قلب پایین است، شما ممکن است تصمیم بگیرید که بدون تکرار ساکشن، تهويه با فشار مثبت را آغاز کنید.

#### روش مطمئن شدن از محل لوله تراشه:

- مشاهده عبور لوله از بین طناب‌های صوتی، مشاهده حرکت قفسه سینه در حین اعمال تهويه با فشار مثبت و شنیدن صدای ریوی همگی نشانه‌های وجود لوله تراشه در نای هستند.
- اگر شما به لوله گذاری صحیح داخل تراشه شک دارید، آشکار ساز  $\text{CO}_2$  را به آن متصل کنید و به حضور  $\text{CO}_2$  در طی بازدم نوزاد دقت کنید. اگر بعد از چند بار تهويه با فشار مثبت  $\text{CO}_2$  مشاهده نشد، لوله را برداشته و دوباره تهويه با بگ و ماسک را از سر بگیريد.
- در صورت عدم دسترسی به آشکار ساز  $\text{CO}_2$  در صورت مشاهده موارد زیر می‌توانید مطمئن باشید که در لوله گذاری نای موفق بوده اید:
  - بهبودی در ضربان قلب و رنگ.
  - صدای ریوی قابل سمع در هر دوریه و عدم وجود یا کاهش آنها روی معده (تصویر ۵-۲۶) عدم اتساع معده در حین تهويه
  - وجود بخار آب در قسمت داخلی لوله در حین بازدم
  - حرکت متقارن قفسه سینه با هر تنفس

## احیاء نوزاد نارس با سن حاملگی کمتر از ۳۲ هفته:

**آماده کردن اتاق زایمان برای احیاء:**

- دمای اتاق زایمان باید بین ۲۵ الی ۲۸ تنظیم شده باشد.
- برای اطمینان از وجود محیطی گرم برای نوزاد گرم کننده تابشی باید نیم ساعت قبل از زایمان روشن شود.
- همان طور که در آلگوریتم شماره ۱-۱ اشاره شده است، قبل از تولد نوزاد تیم احیاء شامل افرادی با مهارت لازم در لوله گذاری نای و استفاده از دستگاه تیپیس احیاء نوزاد به اتاق زایمان فراخوانده شوند .
- در صورت وجود چند قلویی باید به تعداد قل ها تیم احیاء ورزیده برای شروع و ادامه یک احیاء پیشرفته در اتاق زایمان حاضر شوند.


**وسایل و تجهیزات اضافی مورد نیاز:**

در احیاء نوزادان نارس علاوه بر وسائل و تجهیزات مورد نیاز برای احیاء نوزادان ترم باید وسائل و تجهیزات زیر نیز در دسترس باشند:

- گرم کننده تابشی دارای سروو کترل ( خود تنظیم شونده ).
- تیپیس احیاء نوزاد
- یک کیسه پلاستیکی<sup>۱</sup> قابل بسته شدن از جنس پلی اتیلن
- یک بالشتک گرم کننده
- یک انکوباتور مخصوص انتقال
- یک منع هوای فشرده ( دیواری یا کپسول )
- مخلوط کننده اکسیژن ( اکسیژن بلندر ) با یک جریان سنج ( فلومتر ) قابل تنظیم تا ۲۰ لیتر در دقیقه .
- پالس اکسی متر

<sup>۱</sup> مخصوص ذخیره مواد غذایی

## آلگوریتم ۱-۴: احیاء نوزاد نارس با سن حاملگی کمتر از ۳۲ هفته



### انجام عملیات احیاء:

- در نوزادان با سن حاملگی کمتر از ۲۸ هفته بلا فاصله بعد از تولد و بعد قرار دادن نوزاد بر روی تخت مراقبتی باز (زیر گرم کننده تابشی) باید نوزاد را از گردن به پایین به داخل کیسه پلاستیکی قرار دهید. بعد از آنکه نوزاد به شکل مناسب احیاء شد، برای به حداقل رساندن تبخیر می‌توان انتهای قابل بسته شدن کیسه را بست. در نوزادان با سن حاملگی ۲۸ هفته و بیشتر بعد قرار دادن نوزاد بر روی تخت مراقبتی باز باید نوزاد خشک شود. (آلگوریتم ۱-۴)
- در صورتی که نوزاد تنفس خود به خودی و ضربان قلب بالاتر از ۱۰۰ ضربه در دقیقه دارد اما تنفس وی سخت به نظر می‌رسد یا سیانوتیک بوده یا درصد اشباع اکسیژن وی کم باشد، تجویز فشار مثبت مداوم راه هوایی (CPAP) توصیه می‌گردد.
- هم زمان با شروع گام‌های نخستین احیاء، پالس اکسی متر را به پا یا دست نوزاد وصل کنید. چگونگی وصل حس‌گر، به نوع آن بستگی دارد. به توصیه کارخانه سازنده توجه کنید.
- غلظت اکسیژن را توسط بلندر به گونه‌ای تنظیم کنید که غلظت اکسی هموگلوبین توسط پالس اکسی متر به صورت فزاینده، به تدریج به ۸۵٪ تا ۹۲٪ برسد. در چند دقیقه بدو تولد، در صورتی که تعداد ضربان قلب در حال افزایش، ریه در حال تهویه مناسب و درصد اشباع اکسیژن در حال افزایش باشد، درصد اشباع ۷۰٪ تا ۸۰٪ قابل قبول تلقی می‌گردد. اگر درصد اشباع کمتر از ۸۵٪ بوده و در حال افزایش نیست، باید غلظت اکسیژن را توسط بلندر افزایش بدهید (یا آن که در صورتی که حرکت قفسه سینه مناسب نیست، مقدار فشار مثبت را افزایش دهید). غلظت اکسیژن را در صورتی که درصد اشباع بیش از ۹۲٪ بود به تدریج کم کنید.
- تعداد ضربان قلب نمایش داده شده توسط پالس اکسی متر باید با تعداد ضربان‌های لمس شده در قاعده بند ناف یا شنیده شده توسط گوشی، هم خوان باشد.
- اگر نوزادی تنفس خود به خودی و ضربان قلب بیش از ۱۰۰ ضربه در دقیقه دارد، بهتر است که وی را بدون تهویه با فشار مثبت رها کرده، اجازه دهیم مرحله انتقال را در چند دقیقه نخست زندگی پشت سر بگذارد.
- اگر نوزاد دچار آپنه، ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ ضربه در دقیقه و یا سیانوز مداوم می‌باشد تهویه با فشار مثبت شروع گردد. فشار دمی اولیه ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر آب برای اکثر نوزادان نارس کافی است. اگر بهبودی قابل ملاحظه‌ای در ضربان قلب یا حرکت قفسه سینه صورت نگرفت مقادیر بیشتری مورد نیاز می‌باشد. در هر حال مواطن باشید که حرکت قفسه سینه نوزادان نارس بلا فاصله پس از تولد، بیش از حد لازم نباشد، زیرا ریه‌های آنها به آسانی آسیب می‌بینند.
- تجویز پیشگیرانه سورفکتانت را طبق دستورالعمل در نظر داشته باشید.
- پس از انجام عملیات احیاء، هنگام انتقال نوزاد به بخش مراقبت ویژه نوزادان، باید از یک انکوباتور از پیش گرم شده مخصوص انتقال استفاده شود تا در مسیر، دمای مناسب تأمین گردد. در طی انتقال کیسه پلاستیکی از نوزاد جدا نشود. انتقال توسط پرستار ماهر صورت گیرد.

**تجویز CPAP در اتاق زایمان:**

- فشار مثبت مداوم راه هوایی فقط توسط دستگاه تیپس احیاء نوزاد و بگ بیهوشی قابل تجویز است و نمی توان با بگ خود متسع شونده تجویز گردد.
- غلظت اکسیژن بین ۲۱٪ (هوای اتاق) تا ۱۰۰٪ بر اساس شرایط نوزاد، انتخاب شود. توصیه میشود ابتدا از غلظت اکسیژن ۳۰ تا ۴۰ درصد شروع کرده و در صورت نیاز مقدار آن افزایش یابد.
- به طور معمول، ۶ تا ۴ سانتی متر آب میزان مناسبی برای فشار CPAP است.

**تجویز CPAP توسط تیپس احیاء نوزاد:**

۱. اجزای دستگاه احیاء تیپس را طبق دستور کارخانه سازنده به هم وصل کنید.
۲. شبیه‌ساز ریه را به خروجی بیمار متصل کنید. شبیه‌ساز یک بالون قابل اتساع است که توسط سازنده دستگاه داده می‌شود.
۳. دستگاه را به منبع گاز متصل کنید. برای این منظور یک لوله از یک منبع اکسیژن ۱۰۰٪ یا یک مخلوط کننده بلندر که می‌تواند اکسیژن ۲۱ تا ۱۰۰ درصد را تأمین کند، به دستگاه احیاء تیپس وصل می‌شود.
۴. فشارها را در وضعیت‌های زیر تنظیم کنید:

- جریان سنج را برای تأمین میزان جریان گاز مورد نظر به دستگاه احیاء تیپس تنظیم کنید. (۵-۱۵ L/min)
- حداکثر فشار مدار را با بستن کلاهک PEEP با انگشت و تنظیم حداکثر فشار به یک میزان مورد نظر (۴۰ سانتی متر آب توصیه می‌شود)، تنظیم کنید
- حداکثر فشار دمی مورد نظر را با بستن کلاهک PEEP با انگشت و تنظیم دکمه کترل فشار دمی در حدود حداکثر فشار دمی دل خواه تنظیم کنید (مراجعه به درسنامه احیاء درس ۳).
- فشار مثبت انتهای بازدمی را با برداشتن انگشت از روی کلاهک PEEP و تنظیم آن در حد دلخواه تنظیم کنید. (۴-۶ سانتی متر آب توصیه می‌شود) (مراجعه به درسنامه احیاء درس ۸).
- شبیه‌ساز ریه را برداشته و آنرا به ماسک یا لوله تراشه (پس از لوله گذاری داخل تراشه) متصل کنید.
- بعد از آن که دستگاه به نوزاد وصل شد (توسط ماسک یا لوله تراشه)، سرعت تنفس در هر دقیقه را با مسدود کردن متناوب کلاهک PEEP کترل خواهید کرد.
- در صورتی که بخواهید حداکثر فشار دمی را تغییر دهید، باید بوسیله دکمه کترول فشار دمی این کار را انجام دهید. می‌توان این کار را در حین تهییه نوزاد انجام داد و نیاز به اتصال مجدد شبیه‌ساز ریه نیست.

**تجویز CPAP توسط بگ بیهوشی (وابسته به جریان):**

- بگ بیهوشی باید دارای دریچه کترول جریان و فشارسنج باشد.
- میزان جریان گاز باید روی ۵ تا ۱۰ لیتر در دقیقه تنظیم شود و در صورتی که بگ به اندازه کافی پر نشود ممکن است نیاز باشد که این مقدار افزایش داده شود.

- ماسک را روی صورت نوزاد کیپ کرده و با تنظیم جریان سنج (فلومتر) میزان ورود گاز به داخل بگ را تنظیم کنید.
- با تنظیم دریچه کنترل جریان و مشاهده فشار سنج میزان تولید CPAP در نوزاد را تنظیم نمایید.

### پیشگیری از آسیب مغزی:

- نوزاد را به آرامی جا به جا کنید. اگر چه همواره این نکته در درمان هر نوزادی، روشن و واضح به نظر می رسد، این جنبه از مراقبت به علت استرس عملیات احیاء، هنگامی که تمامی اعضاء گروه سعی دارند سریع و اشربخش وظیفه خود را انجام دهند، فراموش می شود.
- از قرار دادن نوزاد در وضعیت سر به پایین<sup>۷</sup> خودداری کنید. میز احیاء باید افقی باشد.
- از تجویز فشار مثبت یا CPAP اضافی خودداری کنید. لازم است فشار کافی برای افزایش ضربان قلب و تهویه مؤثر اعمال گردد. فشار دمی زیاد یا CPAP بالا می تواند سبب محدودیت بازگشت وریدی از سر یا ایجاد پنوموتوراکس شود که هر دو با افزایش خطر خونریزی داخل بطنی همراه است.
- برای تنظیم صحیح غلظت اکسیژن و میزان تهویه کمکی از یک پالس اکسی مترا و آنالیز گازهای خونی استفاده کنید. تغییرات سریع دی اکسید کربن منجر به تغییرات جریان خون مغزی می شود که می تواند خطر خونریزی را افزایش دهد.
- اگر افزاینده حجم لازم شد، آن را به سرعت تزریق نکنید. در عرض ۵ الی ۱۰ دقیقه تجویز شود.

### ملاحظات اخلاقی

در عملیات احیا نیز مانند هر فرایند دیگر، مجموعه ای از ملاحظات اخلاقی وجود دارد که رعایت آنها الزامی است. در این بخش توجه دست اندکاران احیای نوزادان را به نکات اخلاقی مرتبط با احیای نوزادان جلب می نماییم.

#### نوزادانی که قابل احیا نیستند

- در مواردی که بروز معلولیت های متوسط تا شدید عصبی تکاملی بین نوزادان زنده مانده بالاست، احتمال قطعی مرگ زودرس وجود داشته و موربیدیتی نوزادانی که به طور نادر زنده مانده اند غیر قابل قبول است، احیاء مورد ندارد. مهمترین نمونه های چنین شرایطی عبارتند از:
  - نوزادان با سن بارداری قطعی کم تر از ۲۳ هفته یا وزن تولد کم تر از ۴۰۰ گرم
  - آنسفالی
  - سندرم تریزومی تأثید شده ۱۳ یا تریزومی ۱۸
- در سن حاملگی ۲۳ تا ۲۴ هفتگی و در شرایطی با پیش آگهی غیر قطعی، جایی که میزان بقاء بینابینی بوده و احتمال موربیدیتی نسبتاً بالاست و مواردی که بار بیماری نوزاد بالا است، در صورت درخواست والدین مبنی بر اینکه برای نوزاد شان عملیات احیاء صورت نگیرد عملیات احیاء شروع نمی شود.

<sup>۷</sup> Trendelenburg

## برخورد با والدین

- در صورتی که لزوم احیا را پیش بینی می کنید، لازم است تا یک نفر از کسانی که مراقبت های بارداری را به عهده دارد و یک نفر از کسانی که پس از تولد از نوزاد مراقبت می کنند – پس از هماهنگی دیدگاه ها با یکدیگر – باید با والدین صحبت کنند.
- پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت نوزادانی که با سن بسیار کم بارداری یا ناهنجاری های مادرزادی متولد می شوند، شанс موفقیت آمیز بودن درمان، خطرات همراه با انجام درمان و عدم انجام درمان، افزایش طول عمر در صورت درمان موفقیت آمیز، درد و ناراحتی همراه با درمان، پیش بینی کیفیت زندگی نوزاد با و بدون درمان و نیز شرایط و امکانات بیمارستانی و منطقه ای خود را برای والدین شرح دهید.
- درباره محلی که احیاء در آن صورت می گیرد، افرادی که در احیاء شرکت می کنند و نیز ماهیت و کیفیت عملیات احیا برایشان توضیح دهید.
- به مادر و پدر (یا فرد حامی) زمانی بدھید تا در خلوت با یکدیگر مشورت کنند.
- پس از ملاقات با والدین، خلاصه ای از گفت و گوی خود را در پرونده مادر ثبت کنید.
- در مواردی که لزوم احیا پس از تولد مشخص می شود، شرایط نوزاد و فعالیت های خود را به اختصار برای مادر توضیح دهید. و پس از پایدار شدن نوزاد اطلاعات کاملتری را در اختیار وی بگذارید.
- در صورتی که عملیات احیا موفقیت آمیز نبوده یا مقرر می گردد که نوزاد احیا نشود، پیش از جدا کردن وسایل پزشکی، آلام هشدار دهنده آنها و مانیتورها را خاموش کنید. تمامی چسب ها، لوله ها، مانیتورها و تجهیزات پزشکی غیر لازم را از نوزاد جدا کرده، دهان و صورت او را به آرامی تمیز کنید. نوزاد را در یک ملافه تمیز بپیچید و نوزاد را نزد پدر و مادر بیاورید تا آنها وی را در آغوش بگیرند.
- اطلاعات مربوط به چگونگی تماس با پزشک معالج، متخصصان مرگ و - در صورت دسترسی - یک گروه حمایتی مرگ های پری ناتال را در اختیار والدین بگذارید.
- در ملاقات بعدی با ایشان نتایج کالبد شکافی (توپسی) را توضیح دهید و به سوالات ایشان در مورد دلایل مرگ نوزاد، مخاطرات بارداری بعدی و ...پاسخ داده و راهنماییشان کنید.

## ثبت عملیات احیا

برای ثبت عملیات احیای نوزادان، لازم است تا از برگه یکسانی در تمام واحدهای درمانی استفاده شود. این برگه حاوی مجموعه ای از اطلاعات ضروری درباره نوزاد، مادر، تاریخچه بارداری و عملیات احیاست. در این فصل نمونه ای از فرم مورد اشاره و توضیحاتی درباره نحوه تکمیل آن ارایه شده است. توجه داشته باشید که در صورت طراحی مجموعه فرم های جامعی که در هر زایمان برای مادر و نوزاد تکمیل می شوند، ممکن است فرم دیگری جایگزین این فرم شود. اما در هر شرایطی باید نکات زیر در مورد فرم ها رعایت شود:

- برای تمامی موارد احیا تکمیل شود.
- در تمامی مراکز درمانی با قالب یکسان در دسترس باشد.
- حاوی اطلاعات ضروری مورد اشاره در این فرم باشد.

### راهنمای تکمیل برگه ثبت عملیات احیای نوزادان

فرم مورد اشاره برای ثبت اطلاعات عملیات احیای نوزادان استفاده می شود. این فرم باید در پرونده هر مادری که زایمان می کند قرار داده شود و برای هر نوزاد یک فرم مجزا پر شود. این فرم از ۱۰ بخش تشکیل شده که نحوه تکمیل هریک از آنها به شرح زیر می باشد:

#### ۱- مشخصات عمومی نوزاد

در این قسمت مشخصات نوزاد در هر یک از مربع های مربوطه علامت زده می شود.  
سن حاملگی نوزاد بر اساس سونوگرافی سه ماه اول و در صورت عدم وجود LMP محاسبه شود.

#### ۲- عوامل خطر

لازم است تمام عوامل خطر یاد شده به کمک شرح حال مادر بررسی شوند. در صورتی که یک یا چند مورد از این عوامل گزارش شوند، لازم است تا در مربع مربوطه علامت گذاری شوند.

#### ۳- نمره آپگار

نمره آپگار نوزاد در دقایق ۱ تا ۲۰، به تفکیک، ثبت شوند. برای محاسبه نمره آپگار از راهنمای جدول استفاده شود. در صورت رسیدن عدد آپگار به ۷ ثبت آن متوقف شود.

#### ۴- شرح عملیات احیا

هر یک از مراحل عملیات احیا که برای نوزاد انجام شده در مربع مربوطه به زمان مربوطه علامت گذاری شود.

#### ۶- توضیحات

در صورتی که موضوع حائز اهمیت وجود دارد که در فرم حاضر به آن اشاره نشده، در این قسمت ثبت می شود.

#### ۷- اعضای تیم احیا

در صورتی که فقط فرد مسؤول نوزاد در عملیات شرکت کند، در پایان عملیات نام خود را درج کرده و محل مهر و امضای سرپرست را نیز شخصاً به نام خود تنظیم می کند.

در صورتیکه بیش از یک نفر در عملیات احیا شرکت کنند، مسؤول ثبت عملیات، نام فردی را که از ابتدا به عنوان مسؤول نوزاد در اتاق زایمان حضور داشته، در قسمت مربوطه یادداشت می کند و پس از ثبت نام تمام اعضای تیم برگه را به مهر و امضای سرپرست تیم می رساند.

- در تمام موارد زایمان، فرم مورد اشاره به صورت کامل تکمیل شود.

- در تمام موارد احیا یک نفر از اعضای تیم، مسؤول تنظیم فرم باشد.

## برگه ثبت عملیات احیای نوزادان

لفقاً این برگه را با خود کار آئین یا مساه پر کنید

عوامل خطر:	.....
<input type="checkbox"/> پر، اکلابیس	<input type="checkbox"/> نازدی
<input type="checkbox"/> چند قلویی	.....
<input type="checkbox"/> دکولمان	<input type="checkbox"/> پر ادیکاری
<input type="checkbox"/> زایمان طول کشیده	.....
<input type="checkbox"/> مادر دیابتیک	<input type="checkbox"/> آخشنده به مکونیوم
<input type="checkbox"/> برج	<input type="checkbox"/> مصر
<input type="checkbox"/> PROM	<input type="checkbox"/> صحیح
.....	<input type="checkbox"/> مولت
<input type="checkbox"/> بیماری مادر	<input type="checkbox"/> بیهم
<input type="checkbox"/> موارد دیگر	.....
.....	<input type="checkbox"/> مادر
.....	<input type="checkbox"/> مهله
.....	<input type="checkbox"/> مراقب
.....	<input type="checkbox"/> راکیم
.....	<input type="checkbox"/> آخشد به مکونیوم

نشانه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
رنگ	کربو نا بنگینیده	سرپرور نباشد	کربو نا بنگینیده	رنگ	.....	.....	.....
من ان لثاب	کشش از ۱۰۰ ملیلتر	کشش از ۱۰۰ ملیلتر	کشش از ۱۰۰ ملیلتر	من ان لثاب	.....	.....	.....
روکش ده نصر ده	گرد و روکش نمال	غصه جهود	غصه جهود	روکش ده نصر ده	.....	.....	.....
تون هدایتی	حرکت نمال	ملکسون هدایت	ملکسون هدایت	تون هدایتی	.....	.....	.....
غصه	گرس، گرس، من گرد	و بفرز نثاره	و بفرز نثاره	غصه	.....	.....	.....
اصح	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
غصه های احیاء	گامهای تحسین احیاء	<input type="checkbox"/>					
	تهیه یا لشان میث	<input type="checkbox"/>					
	N-CPAP	<input type="checkbox"/>					
	لیزه گذاری نای	<input type="checkbox"/>					
	دشون لشه سینه	<input type="checkbox"/>					

اعضاء	دارو	دلمات تجویز	از طریق	دلمات تجویز
۱.			<input type="checkbox"/> این فریبن	
۲.			<input type="checkbox"/> ایم مال سالین (ازاینده حجم)	
۳.			<input type="checkbox"/> یکریبات سدیم	
۴.				

حکم یا عدم شروع عملیات احیاء:	دستور بعد از عملیات احیاء	محل اضطرار مول احیاء:
<input type="checkbox"/> نیاز به عملیات اسیا نداشت. <input type="checkbox"/> وضعیت بیمار یادگار نداشت و عملیات اسیا خانمه باشد <input type="checkbox"/> عملیات اسیا تامولان بود و خانمه باشد <input type="checkbox"/> به هلت مغایرت فرایند نوزاد یا بزرگ، اسیا تعیام نشد	<input type="checkbox"/> اختلال تزویج مادر <input type="checkbox"/> تخت نظر <input type="checkbox"/> بستری در بخش مراجعت و بیرون نوزادان	

## مراقبت های بعد از احیاء

### مراقبتهای عادی:

- تقريباً "۹۰٪ نوزادان سالم، ترم و بدون عوامل خطر بوده و مایع آمنیوتیک آنها روشن است آنها بعد از تولد نیازی به جدا شدن از مادر ندارند. تنظیم حرارت با قرار دادن مستقیم نوزاد بر روی سینه مادر و پوشاندن وی با پارچه خشک فراهم می گردد. نوزاد با تماس مستقیم با بدن مادر گرم نگه داشته می شود. (مراجعه به بسته خدمتی نوزاد سالم)
- راه تنفسی فوکانی در صورت لزوم با تمیز کردن دهان و بینی نوزاد باز نگهداشته می شود پس از انجام گامهای نخستین تعديل شده احیا تنفس فعالیت و رنگ نوزاد تحت نظر گرفته می شود تا در صورت لزوم مداخلات بیشتر اعمال گردد.
  - محل نگه داری از نوزاد در کنار مادر و آغوش وی می باشد. تا ۲ ساعت اول بعد از تولد ارزیابی هر نیم ساعت انجام شود.
  - در صورتی که ضربان قلب کمتر از ۱۱۰ و یا بیشتر از ۱۶۰ ضربه بود و تعداد تنفس کمتر از ۴۰ یا بیشتر از ۶۰ بود و یا این که رنگ نوزاد سیانوپتیک و یا رنگ پریده بود پس از انجام اقدامات اولیه احیا جهت ارزیابی بیشتر به بخش مراقبت ویژه نوزادان انتقال یابد.

### مراقبت در تحت نظر:

نوزادانی که با عوامل خطر قبل، یا حین زایمان به دنیا می آیند، پوست و یا مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم دارند و یا تنفس آنها سرکوب شده و یا سیانوپتیک هستند به ارزیابی بیشتری نیاز خواهند داشت:

- این نوزادان نیاز به ارزیابی و اقدامات اولیه زیر یک گرم کننده تابشی و نیز گامهای نخستین احیا خواهند داشت.
- این نوزادان همچنان در معرض خطر هستند لذا نوزاد باید در ۶ الی ۲ ساعت پس از تولد (مرحله گذار<sup>۴</sup>) مورد ارزیابی مکرر بالینی قرار گیرد. نوزاد به هیچ عنوان نباید بدون مراقب رها شود:
- عالیم حیاتی نوزاد شامل درجه حرارت، تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب، درصد اشباع اکسیژن شریانی بسته به صورت مداوم به مدت ۴ ساعت اندازه گیری و ثبت شود.
- نمره تنفسی نوزاد هر ۳۰ دقیقه بر اساس جدول شماره ۴ ارزیابی شده و در پرونده بیمار ثبت شود.
- پزشک بر اساس نمره تنفسی و علائم حیاتی و ارزیابی نوزاد بر اساس جدول ۲ تصمیم می گیرد:
- اما بسته به میزان پایداری نوزاد باید والدین تشویق شده و به آنها اجازه داده شود تا نوزاد را ببینند و یا او را لمس کنند و در صورت امکان بغل کنند.
- نوزادانی که بدهال هستند یا عالیمی از به خطر افتادن دارند نبایستی از راه دهان به آنها چیزی داده نشود و بایستی یک راه وریدی برای آنها ایجاد شود


### مراقبت مداوم در بخش مراقبت ویژه نوزادان:


نوزادانی که به تهويه با بگ و ماسک و اقدامات پیشرفته احیا نیاز دارند در معرض وقوع عوارض بیشتری خواهند بود اين نوزادان باید در محیطی که ارزیابی و مونیتورینگ مداوم در دسترس باشد تحت مراقبت قرار گیرند ممکن است انتقال وی به یک واحد مراقبت ویژه نوزادان ضرورت یابد والدین باید اجازه دسترسی به نوزاد خود را در این واحد داشته باشند. مراقبتهای پس از احیا شامل تنظیم دمای بدن و کنترل آن هر ۳۰ دقیقه یکبار - مانیتورینگ عالیم حیاتی و پیش بینی عوارض

<sup>۴</sup> Transitional Zone

احیا است باید به بررسی مداوم اشیاع اکسیژن شریانی و ضربان قلب و فشار خون ادامه دهدید بررسی های ازمايشگاهی مانند هماتوکریت و قند خون باید انجام شود قند خون در نیم ساعت اول بايستی کنترل شود تجزیه گازهای خون نیز ممکن است لازم باشد با افزایش مدت و وسعت اقدامات احیا احتمال بروز عوارض بعد از ان نیز افزایش می یابد تعیین pH و خون بند ناف یا خون نوزاد بالا فاصله پس از احیا تا حدودی می تواند تحت فشار بودن نوزاد را تخمین بزند

## آلگوریتم ۱-۴: مراقبت از نوزاد بعد از عملیات احیاء






## برنامه مراقبت بحرانی از نوزاد در معرض خطر (ACoRN)

مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر (ACoRN) یک چارچوب بالین محور مبتنی بر اولویت است که بصورت پی در پی (سکانسی)، ارزیابی، پایش، ارزشیابی تشخیصی، مداخله ای و درمانی مستمر را برای نوزادان در معرض خطر یا بدحال، ادغام و یک پارچه سازی کرده است. ACoRN هم چنین برای ثبت بعدی نوزادانی که در زمان تولد احیا شده اند مناسب است.

این برنامه همچنین، ترکیبی از راهنمایی های مبتنی بر شواهد و نیز مبتنی بر اجماع است و سپاسگزار درایت بالینی کسانی است که این مطلب را سال های طولانی به ارایه دهنده خدمات سلامتی آموختند. این برنامه بینانی برای برنامه آموزشی فراهم می کند که به آموختن مفاهیم و مهارت های پایه ثبت و - در صورت لزوم - آمادگی برای انتقال به مراکز مجهرتر کمک می نماید. فرآیند ACoRN برای نوزادان نیازمند به کمک برای گذار از زندگی جنبی و نیز نوزادان بدحال یا در معرض خطر بدحالی در ساعت های اول یا روزهای اول پس از تولد کاربرد دارد.

# فصل دوم

## مدیریت نیروی انسانی



## تشکیل تیم احیا

در انجام مراحل مختلف یک فرایند افراد مختلفی می‌توانند دخیل باشند. برای اطمینان از اینکه فرایند مورد نظر به درستی انجام می‌شود، باید افراد مناسب از پیش آماده باشند. این افراد باید به درستی از وظیفه خود مطلع بوده و از مهارت کافی برای انجام آن برخوردار باشند. از این رو لازم است تا با در نظر داشتن ملاحظات زیر جهت تشکیل تیم احیا در مرکز خود اقدام کنید.

- در هر زایمان باید یک نفر مسؤول انحصاری نوزاد که گواهی احیای نوزاد داشته و قادر به ارزیابی اولیه و شروع عملیات احیا باشد، حضور داشته باشد. اگرچه ممکن است که در حال حاضر برقراری این استاندارد فوق در بسیاری از مراکز میسر نباشد، اما هدف نهایی دستیابی به این استاندارد است. لذا کمیته‌های کشوری، دانشگاهی و بیمارستانی احیای نوزاد باید به نحوی برنامه ریزی کنند تا طبق یک سلسله هدف گذاری مقطوعی پلکانی، استاندارد فوق حاصل شود.
- در هر زایمان باید یک نفر که تمامی مهارت‌های لازم را برای عملیات احیا (شامل لوله گذاری، کاتتریزاسیون و تجویز دارو) دارد، در دسترس باشد، به نحوی که بتواند بلا فاصله در اتاق زایمان حاضر شود. تعیین فرد آنکال در خارج از بیمارستان یا در محل دور از دسترس، قابل قبول نیست.
- در موارد پیش‌بینی تولد نوزاد نارس یا پر خطر حضور فردی که قادر به اجرای تمام مراحل احیاء است، پیش از تولد نوزاد، ضروری است.
- علاوه بر مسؤول انحصاری نوزاد، لازم است در هر شیفت کاری حداقل یک تیم احیا (مرکب از افرادی که واجد تمامی مهارت‌های لازم برای عملیات احیا هستند) در بیمارستان حضور داشته باشد.
- در بیمارستان‌هایی که تعداد زایمان‌ها زیاد است، تعداد تیم‌های احیا بر حسب نیاز افزایش می‌یابند.
- اسامی افراد دارای مهارت لازم برای عضویت در تیم احیا و برنامه کاری ایشان، در ابتدای هر ماه توسط مسؤول هر گروه به مدیر پرستاری بیمارستان اعلام می‌شود. مدیر پرستاری بیمارستان موظف است تا تیم احیا و نیز پرسنل مسؤول نوزادان را برای شیفت‌های مختلف تعیین کند و مراتب را به اطلاع ایشان برساند. لیست مربوط به هر ماه در تابلوی اعلانات بخش زایمان و نوزادان نصب می‌شود. به علاوه لیست مربوط به هر شیفت در اختیار سوپر وایزر بیمارستان و کمیته بیمارستانی احیا، قرار می‌گیرد.
- هر تیم حداقل شامل ۳ الی ۴ نفر است که از بین ایشان حداقل یک نفر باید دارای مهارت کافی کلیه مراحل احیا (از جمله لوله گذاری و تعییه کاتتر نافی) باشد.
- برای هر تیم یک سرپرست یا سرپرست گروه، تعیین می‌شود. سرپرست هر تیم فردی است که از نظر رتبه علمی و سطح مهارتی در موقعیت بالاتری قرار دارد.
- در زایمان‌های دو یا چند قلو باید برای هر نوزاد یک مسؤول یا تیم مستقل حضور داشته باشد.
- حضور اعضای تیم احیا در بالین نوزاد به صورت تجمعی است. به نحوی که در ابتدا فرد مسؤول نوزاد در اتاق زایمان حضور دارد و حسب مورد سایر افراد تیم حضور یافته یا فراخوانده می‌شوند. الگوریتم ۱-۱ نحوه شکل گیری یک تیم احیا را نشان می‌دهد.
- افراد شرکت کننده در عملیات احیا، باید دوره‌های آموزشی احیای نوزادان را گذرانده باشند. داشتن مدرک معتبر ارایه کننده یا مرتبی برای احراز ویژگی فوق کافی است.

## ■ تقسیم وظایف در تیم احیا

در هر مرکز درمانی با توجه به سطح ارایه خدمات، افراد مختلفی در سطوح مختلف تخصصی و مهارتی حضور دارند که می‌توانند اعضاً بالقوه تیم احیاء نوزادان باشند. برای جلوگیری از تداخل وظایف و مسؤولیت‌ها به نکات راهنمای این بخش توجه نمایید:

به طور کلی برای انجام هر فرایند دو مفهوم "مسؤول اصلی" و "جانشین" تعریف می‌شوند.

- **مسؤول اصلی:** فردی است که وظیفه اولیه وی اجرای فرایند مورد بحث می‌باشد. در میان افرادی که قابلیت اجرای یک فرایند را دارند اولویت انجام کار با فردی است که به عنوان مسؤول اصلی تعیین می‌شود.

- **جانشین:** فردی است که در نبود مسؤول اصلی، تا زمان حضور وی، مسؤولیت اجرای فرایند را به عهده می‌گیرد.

در تعیین مسؤول اصلی و جانشینان وی به نکات زیر دقت کنید:

- حضور متخصص یا دستیار رشته‌های اطفال، بیهوشی و زنان در تیم احیا، بر اساس سطح ارایه خدمات در بیمارستان‌های مختلف الزامی می‌باشد.

- در صورتی که بر اساس وضعیت بیمارستان، پزشک عمومی وظایف متخصص / دستیار اطفال را در بیمارستان به عهده داشته باشد، در تیم احیا نیز در جایگاه متخصص / دستیار اطفال قرار خواهد گرفت.<sup>۱</sup>

- در زایمان‌های عادی به ترتیب اولویت یک ماما به عنوان مسؤول اصلی، مامور ارزیابی نوزاد و اقدامات اولیه می‌باشد.

- در صورتی که ارزیابی‌های پیش از زایمان، احتمال تولد نوزاد پر خطری را مطرح کنند، حضور متخصص / دستیار اطفال یا پزشک عمومی مسؤول، به عنوان مسؤول اصلی فرایند، الزامی است. در سایر موارد افراد یاد شده (با توجه به سطح بندي بیمارستان) می‌توانند به عنوان جانشین باشند.

- لازم است نتیجه تمام موارد عملیات احیا با استفاده از فرم ثبت زایمان در بیمارستان (ضمیمه ۴) به اطلاع کمیته بیمارستانی احیای نوزادان رسانده شود.

- در موارد پیش بینی تولد نوزاد پر خطر (الگوریتم ۱-۱)، بر اساس سطح ارایه خدمات در بیمارستان، مراتب باید پیش از تولد نوزاد به فوق تخصص / دستیار فوق تخصصی نوزادان، متخصص اطفال / دستیار تخصصی دوره دیده اطفال اطلاع داده شود. تا قبل از زایمان در محل زایمان (اتاق زایمان یا اتاق عمل سازارین) حضور یابند.

- حضور فوق تخصص / دستیار فوق تخصصی نوزادان در مواردی که نیاز به تجویز سورفاکتانت می‌باشد، یا به علت بدحالی نوزاد به تیم فراخوانده می‌شوند، الزامی است.
- کارورزان پزشکی مسؤولیت مستقیم در تیم احیا ندارند.

- سرپرستی تیم در هر مرحله با فردی است که از سطح مهارتی در موقعیت بالاتری قرار دارد. لذا در صورت حضور پزشک، سرپرستی تیم به ترتیب با متخصصین، دستیاران و پزشک عمومی مسؤول است. در سایر موارد چنانکه در استاندارد ۳ آمد، پرسنل ماما بر پرسنل پرسنل مقدم می‌باشند.

<sup>۱</sup> از این به بعد از این فرد به عنوان پزشک عمومی مسؤول یاد می‌شود

- در بین پزشکان، فوق تخصصی یا دستیار فوق تخصصی نوزادان، سپس متخصصین کودکان، متخصصین بیهوشی، متخصصان زنان و مامایی و سپس دستیاران تخصصی رشته های کودکان، بیهوشی و زنان و مامایی به ترتیب در اولویت سرپرستی تیم قرار دارند.

جدول ۲-۱-۱ مسوول اصلی و جانشینان اجزای مختلف فرایند احیا را معرفی می نماید.

نوع فعالیت	ارایه دهنده
ارزیابی اولیه	مسوول اصلی در شرایط عادی
	مسوول اصلی در شرایط پرخطر
	جانشین ۱
	جانشین ۲
تامین گرمای مناسب	مسوول اصلی
	جانشین ۱
	جانشین ۲
	مسوول اصلی
	جانشین ۱
	جانشین ۲
	مسوول اصلی
	جانشین ۱
	جانشین ۲
	مسوول اصلی
وضعیت دادن به نوزاد	نوزاد عادی
	نوزاد مکونیومی
	که نیاز به لوله گذاری و ساکشن دارد
	خشک کردن
	وضعیت دادن مجدد
	تحریک تنفسی

ماما، پرستار	مسؤول اصلی		بُوقاری تنفس کارآمد
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	جانشین ۱	تجویز جریان آزاد اکسیژن	
متخصص/ دستیار بیهوشی یا متخصص/ دستیار زنان	جانشین ۲		
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	مسؤول اصلی		
ماما، پرستار	جانشین ۱	تهویه با فشار مثبت	
متخصص/ دستیار بیهوشی یا متخصص/ دستیار زنان	جانشین ۲		
ماما، پرستار	مسؤول اصلی		
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	جانشین ۱	تعییه لوله دهانی - معدی	
متخصص/ دستیار بیهوشی یا متخصص/ دستیار زنان	جانشین ۲		
ماما، پرستار	مسؤول اصلی		فسردن قفسه سینه
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	جانشین ۱ فشردن قفسه سینه		
متخصص/ دستیار بیهوشی یا متخصص/ دستیار زنان	جانشین ۲ فشردن قفسه سینه		
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	مسؤول اصلی تهویه با فشار مثبت همزمان		
ماما، پرستار	جانشین ۱ تهویه با فشار مثبت همزمان		
تخصص/ دستیار بیهوشی یا متخصص/ دستیار زنان	جانشین ۲ تهویه با فشار مثبت همزمان		
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	مسؤول اصلی		بُوقاری دارو
متخصص/ دستیار بیهوشی یا متخصص/ دستیار زنان	جانشین ۱	تعییه راه وریدی مناسب	
ماما، پرستار	جانشین ۲		
ماما، پرستار	مسؤول اصلی		
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	جانشین ۱	تزریق دارو	
متخصص/ دستیار بیهوشی	جانشین ۲		
متخصص/ دستیار زنان			
متخصص/ دستیار اطفال، پزشک عمومی مسؤول	مسؤول اصلی		لوله کاری
متخصص/ دستیار بیهوشی / تکنسین بیهوشی یا متخصص/ دستیار زنان	جانشین ۱		
ماما، پرستار	جانشین ۲		

## بررسی وضعیت موجود

برای اجرای عملیات احیا، به مجموعه‌ای از احیا کنندگان نیاز است که در ادامه از ایشان به عنوان اعضای تیم احیا یاد می‌شود. قبل از آنکه تیم احیا تشکیل شود، باید شما می‌ای از وضعیت موجود در مرکز بدست آورده و چند اصل مهم را به عنوان اقدامات کلان مد نظر قرار دهید. الگوریتم زیر راهنمای شما در این زمینه می‌باشد.

### بررسی وضعیت مرکز از نظر تعداد پرسنل مورد نیاز برای احیا به نسبت تعداد زایمان‌ها در سال

تعداد پرسنل فعلی کافی نیست

تعداد پرسنل فعلی کافی است

با همان تعداد پرسنل موجود تیم احیا را تشکیل نماید.

وضعیت نیروها را از نظر آموزشی معین کنید

در طواستان تامین نیروی جدید را به واحد‌های ذوب‌پوش تسلیم کنید

وضعیت آموزشی نیروها با استانداردها مطابق است

وضعیت آموزشی نیروها با استانداردها مطابق نیست

وضعیت آموزشی نیروها با استانداردها مطابق نیست


مراتب را تامین پرسنل مورد نیاز پیگیری کنید

برای حفظ وضعیت موجود از طریق برنامه ریزی جهت دوره‌های بازآموزی و ارتقا مهارت اقدام کنید

جهت شرکت پرسنل در برنامه‌های آموزشی و بازآموزی، برنامه ریزی و اقدام کنید

برای حفظ وضعیت موجود از طریق برنامه ریزی جهت دوره‌های بازآموزی و ارتقا مهارت اقدام کنید

- تیم‌های احیا را تشکیل نماید
- در ایندا از شرایط و امکانات موجود تبعیت کنید
- ملی یک سلسله اهداف ملطفی پلکانی، استانداردهای منوط به احیا کنندگان را محقق کنید



# فصل سوم

## مدیریت منابع مالی، تجارت، وسایل و دارو

## منابع مالی، تجهیزات، وسایل و داروها

در مدیریت منابع مالی، تجهیزات، وسایل و داروهای مورد نیاز برای فرایند احیا به اصول کلی زیر توجه کنید. برای شناسایی فرایند های منتهی به عملکرد مورد انتظار، از دیاگرام های این بخش کمک بگیرید.

- تجهیزات مورد نیاز در مرکز خود، را با توجه به سطح ارایه خدمات و جدول وسایل، تجهیزات و داروها شناسایی و تکمیل کنید (الگوریتم ۱).
- تلاش کنید تا در بودجه مرکز، اعتبار مالی کافی را در ردیفی جداگانه، برای تامین یا جایگزینی وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای احیای نوزادان اختصاص داده شود.(الگوریتم ۲)
- مطابق کتاب ارزش گذاری خدمات پزشکی تعریفه های مربوط به احیائ نوزاد بدحال مطابق جدول زیر تعریف شده است:

جدول ۳-۱: تعریفه های احیاء نوزاد در اتاق زایمان (کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت - سال ۱۳۸۸)

کد	شرح	واحد
۹۹۴۳۶	حضور در اتاق زایمان (در صورت درخواست پزشک زایمان دهنده) و پایدار کردن اولیه نوزاد	۱,۵۵
۹۹۴۴۰	احیا نوزاد: دادن تنفس با فشار ثابت و/یا ماساژ قلبی با فشار روی قفسه سینه در صورت نارسایی حاد تنفسی و/یا قلبی، در اتاق زایمان	۳,۰۵
۳۱۵۰۰	لوله گذاری داخل تراشه بطور اورژانس	۲,۳۳
۳۶۵۱۰	گذاشتن کاتتر در ورید نافی برای تشخیص یا درمان، نوزاد	۳,۳۰

- در صورتی که امکانات مرکز شما اجازه می دهد که در زمینه تشویق کارکنان، فراتر از دستورالعمل های کشوری / منطقه ای عمل کنید، از امکانات خود بهره بگیرید.

الگوریتم ۱ . بررسی وضعیت مرکز از نظر تعداد و سالم بودن تجهیزات مورد نیاز

## بررسی وضعیت مرکز از نظر تعداد و سالم بودن تجهیزات مورد نیاز

استانداردهای تجهیزات و لوازم برقرار نیست

استانداردهای تجهیزات و لوازم برقرار است

وسایل نیاز به تعمیر دارند

لوازم و تجهیزات باید خریداری شوند/ از انبار تحويل گرفته شوند

جهت حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات موجود، برنامه ریزی و اقدام کنید.

- تجهیزات فوق را جهت تعمیر ارسال نمایید

- لیست لوازم و تجهیزات مورد نیاز را به واحد ذیربط تسلیم کنید.(\*\*)(\*)

- مراحل تعمیر و بازرگاندن وسایل به بخش را پیگیری نمایید

- مراحل خرید و تحويل وسایل مذکور را به بخش پیگیری کنید

جهت حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات برنامه ریزی و اقدام کنید

جهت حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات برنامه ریزی و اقدام کنید

\* در تنظیم لیست لوازم و تجهیزات، از دستورالعمل هاو راهنمایی که توسط کمیته کشوری احیاء نوزادان ارایه شده و در آن استانداردها و سایر اطلاعات ضروری در مورد لوازم و تجهیزات آورده شده است، پیروی کنید.

\*\*) در مراکز سطح سوم، تمام وسایلی که در لیست لوازم و تجهیزات برای تمام مراکز، با عنوان اجباری مشخص شده اند، از بودجه جاری بیمارستان تامین می شود.

الگوریتم ۲: برآورد بودجه مورد نیاز برای تامین وسایل و تجهیزات

## برآورد بودجه مورد نیاز برای تامین وسایل و تجهیزات

تعیین سهمی که باید از اعتبارات  
بیمارستان تامین شود

تعیین سهمی که باید از محل اعتبارات  
کمیته های دانشگاهی تامین شود

تعیین سهمی که باید از محل اعتبارات  
جاری بیمارستان تامین شود.

اعلام مراتب به کمیته دانشگاهی

تخصیص اعتبار توسط واحد مالی  
بیمارستان/شبکه

تامین و تخصیص اعتبار توسط کمیته  
دانشگاهی/شبکه

درخواست خرید

درخواست خرید

تامین اعتبار توسط واحد مالی  
بیمارستان/شبکه

تامین اعتبار توسط واحد های  
بیمارستان /شبکه

ناظارت بر خرید و تحويل وسایل و  
تجهیزات

ناظارت بر خرید و تحويل وسایل و  
تجهیزات

جدول زیر وسایل مصرفی، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای عملیات احیا از هر کدام نشان می دهد.

جدول ۱-۳. وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای عملیات احیا

وسایل عمومی		الف
در هر اتاق زایمان به تعداد کافی	دستکش استریل و لاتکس، ماسک و دیگر وسایل حفاظتی کارکنان	۱
نسبت به تخت های زایمان ۳ به ۱ یا هر اتاق زایمان یک عدد	تخت احیاء (تخت مراقبت باز نوزاد یا ست احیاء) درای سروکترل	۲
۱ عدد در هر اتاق زایمان	ساعت (دارای عقربه ثانیه شمار) یا کرنومتر	۳
۲ به ۱ نوزاد	ملحفه گرم	۴
۱ عدد در هر ترالی	گوشی پزشکی کودکان	۵
۱ حلقه از هر کدام در هر ترالی	نوارچسب ۱,۲ یا ۳,۴ اینچی	۶
۱ عدد از هر کدام در هر ترالی	راه هوایی دهانی - حلقی در اندازه های ۰، ۰۰، ۰۰۰	۷
۱۰ عدد از هر کدام از هر کدام	سرنگ های ۱، ۳، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سی سی	۸
۲ عدد در هر بخش زایمان*	پالس اکسیمتر و پروب مربوطه	
۲ عدد در هر بخش زایمان*	مخلوط کننده اکسیژن و هوا	
۲ عدد در هر بخش زایمان*	منبع هوای فشرده	
۵ عدد در هر ترالی*	کیسه پلاستیکی قابل بسته شدن (سایز چهار و نیم لیتر)	
۱ عدد در هر بخش زایمان*	پد های گرم کننده شیمیایی	۱۶
۱ عدد در هر بیمارستان*	انکوپاتور قابل حمل	۱۷
وسایل ساکشن		ب
۱:۱ نوزاد	پوآر	۱
از هر کدام ۱۰ عدد	کاتتر های ساکشن به شماره های ۱۲، ۱۰، ۸۰، ۶، ۵ و ۱۴	۲
۳ عدد	کشنده مکو نیوم و لوله آن	۳
از هر کدام ۱۰ عدد	لوله تغذیه به شماره ۸ و سرنگ ۲۰ میلی لیتر	۴
۱ عدد در هر اتاق زایمان (ویژه نوزاد)	دستگاه ساکشن	۵

جدول ۱-۳. وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای عملیات احیا (ادامه)

وسایل بگ و ماسک

ج


۱	وسیله تهويه با فشار مثبت که قادر به رساندن اکسیژن ۹۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.	بگ خود متسع شونده یا بگ وابسته به جريان و/یا بگ بیهوشی: ۲ عدد در هر ترالى دستگاه تی پیس: ۲ عدد در هر بیمارستان دارای بخش مراقبت ویژه نوزادان*
۲	ماسک های صورت با اندازه های نوزاد ترم و نارس (اناتومیک بالشتک دار)	۳ عدد از هر کدام در هر ترالى
۳	منبع دیواری یا کپسول اکسیژن: ۱ عدد برای هر گرم کننده تابشی ثابت	منبع اکسیژن با جريان سنج و لوله های مربوطه
<b>وسائل لوله گذاری</b>		
۱	لارنگوسکوپ با تیغه های ۰ و ۰ و ۱ همراه با لامپ و باطری اضافی	۱ عدد در هر ترالى
۲	لوله های تراشه با قطر داخلی ۳,۵، ۲,۵ و ۴ میلی متر	از هر کدام ۱۰ عدد در هر ترالى
۳	استیلت (اختیاری)	۱ عدد در هر ترالى
۴	قیچی	۱ عدد در هر ترالى
۵	نوارچسب / وسائل ثابت نگهداشتن لوله تراشه	دو عدد در هر ترالى
۶	پنبه	۱ ظرف در هر ترالى
۷	الكل	۱ شیشه در هر ترالى
۸	ماسک حنجره ای (اختیاری)	۱ عدد در هر بخش زایمان
<b>وسائل کاتتریزاسیون عروق نافی</b>		
۱	محلول ضد عفونی کننده	۱ عدد در هر ترالى
۲	اسکالاپل یا قیچی	۱ عدد در هر ترالى
۳	نوار نافی یا نخ بخیه ۱ صفر، دو صفر و سه صفر	۱ عدد در هر ترالى
۴	کاتتر نافی شماره های ۳/۵ و ۵	۵ عدد در هر ترالى
۵	سه راهی مخصوص	۵ عدد در هر ترالى

## جدول ۱-۳. وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای عملیات احیا (ادامه)

داروها	و
۱ اپی نفرین ۱:۱۰۰۰۰ آمپول های ۱۰ سی سی	۵ عدد در هر ترالی
۲ سرم کریستالوید ایزوتون (نرمال سالین / رینگر لاتکت)	۲ عدد از هر کدام در هر ترالی ۵۰۰ میلی لیتر
۳ بیکربنات سدیم ۸/۴ درصد / ویال ۵۰ سی سی	۲ عدد از هر کدام در هر ترالی
۴ نالوکسان هیدروکلرید ۰،۴ میلی گرم در میلی لیتر قابل دسترس در بخش	۳ عدد در هر ترالی
۵ سرم قندی ۱۰ درصد ۵۰۰ میلی لیتر	


(۳): بیمارستان های سطح ۳ مطابق با برنامه سطح بندی خدمات پرینتال (دارای بخش مراقبت ویژه نوزادان)

- در هر اتاق زایمان یا اتاق عمل مربوطه یک ترالی مجزا و انحصاری برای احیاء نوزاد وجود داشته باشد.
- وسایل یاد شده اختصاصی بخش زایمان یا اتاق عمل مربوطه بوده و با بخش های تحت نظر نوزادان یا NICU مشترک نمی باشند.
- وسایل مورد نیاز بر اساس پیش بینی تعداد زایمان ها و طبق نسبت تعیین شده، تامین شده و در بخش زایمان یا اتاق عمل مربوطه نگهداری شوند.
- موجودی هر ترالی در انتهای هر شیفت تکمیل شده و در آغاز شیفت بعدی بازبینی و تحويل گرفته شود.
- وسایل بویژه آمبوبگ، لارنگوسکوپ، منع اکسیژن، ساکشن، ماسک، گرم کننده تابشی و انکوباتور، از نظر کارکرد، در هر شیفت ارزیابی شده و وضعیت آنها ثبت شود.
- ذخیره وسایل و داروها از نظر تعداد، دوره نگهداری استریل وسایل و تاریخ مصرف داروها مطابق با دستورالعمل های کمیته کنترل عفونت کشوری به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد.
- نحوه درخواست داروها و وسایل، تعمیرات یا خرید تجهیزات مطابق با دستورالعمل های داخلی بیمارستان هاست.
- وجود مواردی که با عالمت \* مشخص شده اند، در تمام مراکز سطح سوم اجباری و در مراکز سطح دوم و اول اختیاری است.
- در هر اتاق زایمان دیوارکوبی نصب شده باشد که مراحل احیا به صورت الگوریتم در آن تشریح شده باشد. جهت آشنایی با مشخصات دیوارکوب به بخش آموزش مراجعه شود.
- در هر اتاق زایمان لازم است تعداد کافی فرم احیا در دسترس باشد. جهت آشنایی با مشخصات فرم احیا به بخش مستندسازی مراجعه شود.




فصل چهارم

آموزش و پژوهش



## برنامه آموزش کارآموز احیاء نوزاد (پایه و/یا پیشرفته)

برای اجرای صحیح فرایند احیاء در اتاق زایمان ابتدا باید یک برنامه مدون آموزشی مناسب برای ارتقاء دانش و مهارت ارائه دهنده خدمت تدارک شود. مهمترین فرایند برای تبدیل ارایه کنندگان خدمت به ارایه کننده مناسب، آموزش است. در ذیل به آنچه باید در زمینه آموزش پرسنل دخیل در امر احیا مدنظر قرار گیرد، اشاره می شود. الگوریتم زیر فرایند آموزش احیاء در قالب کارگاه احیاء نوزاد را به تصویر کشیده است. برای به مرحله اجرا رسیدن فرایند اصلی که برگزاری کارگاه احیاء نوزاد است (۷)، ریز فرایند های دیگری باید فراهم شوند. فرایند نخست ثبت نام کارآموزان کارگاه است. موارد ۲ الی ۶ مربوط به چگونگی پشتیبانی برگزاری کارگاه است.



### ۱ کارآموز احیاء نوزاد:

- فردی است که به علت اشتغال در بخشی از بیمارستان که احتمال احیای نوزاد وجود دارد، قابلیت انجام احیای نوزاد جزو مهارت های اجباری آن فرد محاسب می شود و به همین دلیل لازم است کلیه افراد مرتبط با نوزاد توسط مسئولین بیمارستان طبق برنامه آموزشی احیا نوزاد، جهت شرکت در کارگاه احیاء نوزادان مجاب شوند. این افراد شامل کلیه ماما های شاغل در اتاق زایمان و پس از زایمان، کلیه متخصصین زنان و زایمان و کلیه پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان، و بخش کودکان دارای تخت نوزادان، متخصصین کودکان، فوق تخصص نوزادان، پزشکان عمومی و متخصصان بیهوشی در ارتباط با زایمان و مراقبت از نوزاد، کلیه پرستاران و ماماهای اتاق عمل سازارین در کلیه بیمارستان های خصوصی یا دولتی دارای بخش زایمان یا مراقبت از نوزادان می باشد.

۲. به صورت داوطلبانه در این دوره ها شرکت خواهند کرد و در یک مرکز خصوصی یا دولتی درمانی آموزشی فعال خواهند بود. همچنین براساس فرایند استاندارد احیا که در بسته خدمتی تعریف شده است جز ارایه کنندگان احتمالی خدمت خواهند بود.

## ۲ محتوای آموزشی احیاء نوزاد:

محتوای آموزشی برنامه احیاء نوزاد شامل درسنامه احیاء نوزاد نسخه ترجمه شده سال ۲۰۰۶ آکادمی کودکان آمریکا یا نسخه های آینده (سال ۲۰۱۱) است. این درسنامه همراه با بسته آموزشی خودآموز چندرسانه ای به صورت دی وی دی ارائه می شود. این بسته آموزشی تمامی فرایند احیاء نوزاد را به صورت سمعی و بصری به نمایش می گذارد. همچنین حاوی آزمون، چک لیست کارآرایی و سناریو برای تمرین و یادگیری بهتر است.

- درسنامه احیاء نوزاد بایستی در اختیار تمامی کارآموزان کارگاه احیاء قرار گیرد. این کتاب متعلق به آنها بوده و از آنها پس گرفته نمی شود. اداره سلامت نوزادان موظف به فراهم کردن تعداد کافی آن برای تمامی بیمارستان های زیرمجموعه وزارت بهداشت می باشد.
- حداقل ۲ نسخه (یک نسخه غیر قابل امانت) از درسنامه احیای نوزادان در بخش های زایمان، اتاق عمل، بخش مراقبت ویژه نوزادان و بخش نوزادان بیمار، اتاق پزشکان متخصصین بیهوشی، اطفال و زنان و مامایی، پرسنل مامایی و پرستاری و ۲ نسخه (یک نسخه غیر قابل امانت) در کتابخانه بیمارستان وجود داشته باشد.
- حداقل یک نسخه از بسته خدمتی احیای نوزادان باید در بخش های زایمان، اتاق عمل، بخش مراقبت ویژه نوزادان و بخش نوزادان بیمار، اتاق پزشکان متخصصین بیهوشی، اطفال و زنان و مامایی، پرسنل مامایی و پرستاری، کتاب خانه و دفتر پرستاری، سوپر وایزر آموزشی و درمانی و دفتر مدیریت بیمارستان وجود داشته باشد.

## ۳ هسته آموزشی احیاء نوزاد در سطح دانشگاه به دو دسته تقسیم خواهد شد:

۱. هسته آموزشی دانشگاهی احیاء نوزاد: عبارت است از فوق تخصص نوزادان، فوق تخصص پری ناتالولژیست، متخصصین کودکان، زنان و زایمان و بیهوشی و مربی های پرستاری و مامایی در یک دانشگاه که دوره پیشرفته احیای نوزاد را گذرانده و در کارگاههای کشوری یا دانشگاهی دوره مربی گری احیاء نوزاد را فراگرفته و دارای مدرک مربی گری دانشگاهی هستند (جدول شماره ۱-۴). این دوره علاوه بر یا دیگری و بازآموزی احیای پیشرفته، پیشرفته های تازه در احیای نوزادان شامل دوره روشهای تدریس را نیز شامل می گردد. این افراد سپس در حوزه دانشگاه مربوط به خود مسؤول برگزاری کارگاههای دوره پیشرفته بوده و همچنین در ابتدای کار برگزاری دوره مقدماتی را بر عهده خواهند گرفت. در ضمن این افراد زیر نظر کمیته دانشگاهی احیای نوزادان دانشگاه مربوطه فعالیت خواهند نمود. آموزش در سطح دانشگاه به صورت گروهی (با تیم حداقل ۳ نفره مربیان) انجام خواهد شد. تک تک مدرسان باید به تنها یکی مهارت و توانایی اجرای هر دوره را داشته باشند.

۲. هسته آموزشی بیمارستانی احیاء نوزاد: فوق تخصص نوزادان، پری ناتالولژیست، متخصصین کودکان، زنان و زایمان و بیهوشی و پرستاران و ماما ها در یک بیمارستان که دوره پیشرفته را در دانشگاه خود گذرانده اند و دارای مدرک مربیگری بیمارستانی هستند. این افراد علاوه بر مدیریت تیم های بیمارستانی احیا ملزم به

برگزاری کارگاههای احیاء نوزاد پایه در سطح بیمارستان هستند. در ضمن این افراد زیر نظر کمیته دانشگاهی احیای نوزادان دانشگاه مربوطه فعالیت خواهند نمود.

جدول ۴-۱: شرایط احراز مدرک مربی گری در سطوح مختلف

مرتبه	سطوح برگزاری کارگاه	مسئول برگزاری کارگاه	مقام مسؤول ارایه کننده گواهی
کشوری	دوره پیشرفته همراه تازه های اجیا + دوره مهارت های روش تدریس و مربی گری احیای نوزادان	وزارت بهداشت	تایید کمیته علمی کشوری احیا
دانشگاهی	پیشرفته + دوره مهارت های روش تدریس و مربی گری احیای نوزادان	دانشگاه	مربی کشوری
بیمارستانی	پیشرفته + دوره مهارت های روش تدریس و مربی گری احیای نوزادان	بیمارستان	مربی دانشگاهی

#### 4 تجهیزات کمک آموزشی و فضای فیزیکی:

##### فضای آموزشی مورد نیاز:

- فضای فیزیکی برای برگزاری کارگاههای احیا فضاهای اختصاص یافته در بیمارستان و یا مرکز مهارت های بالینی دانشگاهها خواهد بود. این محیط های آموزشی در سطح کشور باید حداقل امکانات لازم برای آموزش احیای نوزاد در سطوح آموزش مقدماتی و پیشرفته را داشته باشند.
- تمامی بیمارستان های دارای زایشگاه یا بخش نوزادان باید دارای اتاق یا واحدی برای تمرین مهارت احیاء نوزاد باشد. تمامی وسائل کمک آموزشی مانند مانکن احیاء نوزاد، تخت احیاء، وسایل لوله گذاری و تهویه با فشار مثبت و اکسیژن درمانی باید در اتاق مذکور وجود داشته باشد.

##### تجهیزات کمک آموزشی:

- امکانات و تجهیزات آموزش احیای نوزاد در بیمارستان باید متناسب با سطح بیمارستان مربوطه بر اساس سطح بندي کشوری باشد ولی مرکز مهارت های بالینی یک دانشگاه باید این امکانات به شکل کامل (یعنی وسایل مورد لزوم در بیمارستانهای سطح ۱تا ۳) را دارا باشند (جدول شماره ۴-۲).

#### 5 کوریکولوم آموزشی احیاء نوزاد پایه و / یا پیشرفته

##### برنامه آموزشی و بازآموزی برنامه احیاء نوزاد

- تمامی پرسنل دخیل در فرایند های مراقبت از مادر و نوزاد اعم از ماما، پرستار و پزشک باید کارگاه آموزشی احیای نوزاد را گذرانده و واجد گواهی آن باشند. پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان و پرستارانی که در بخش مراقبت ویژه نوزادان مشغول فعالیت هستند الزاماً باید گواهی احیاء پیشرفته را دریافت کنند. سوپروایزر های بیمارستان اعم از آموزشی، درمانی و کشیک عصر و شب نیز باید گواهی احیا پیشرفته را واجد باشند.
- پرسنلی که واجد گواهی احیاء نوزاد می باشند باید هر دو سال گواهی خود را تجدید کنند. از ابتدای مهر سال ۱۳۹۰ در صورت نداشتن گواهی احیاء و یا تجدید نکردن آن افراد حق حضور در اتاق زایمان یا کار در بخش مراقبت ویژه نوزادان را ندارند.

- تمامی دانشجویان پزشکی عمومی در طی دوره کارآموزی و دانشجویان دوره دستیاری اطفال، زنان و مامایی، بیهوشی، طب اورژانس باید در ابتدای دوره و قبل از شروع به کار در بیمارستان به عنوان پزشک باید کارگاه احیاء را گذرانده و هنگام فارغ التحصیلی واحد گواهی احیاء پیشرفته نوزاد بوده و مدت اعتبار دو ساله گواهی آنها تمام نشده باشد.

جدول شماره ۴-۲: وسائل و تجهیزات مورد نیاز در مکان برگزاری کارگاه احیاء نوزاد

شماره	وسائل و تجهیزات	مرکز مهارت های بالینی	سطح ۳	سطح ۲	سطح ۱
۱	کیسه تهیه (آمبوبگ)	۲	۳	۲	۱
۲	تخت مراقبتی باز نوزاد یا تحت احیاء	۳		۲	۱
۳	ملافه یا حوله در ابعاد نوزاد	۶		۴	۲
۴	دستگاه ساکشن	۱		۰	۰
۵	تی پیس احیاء نوزاد	۱		۰	۰
۶	مخلوط کننده اکسیژن و هوا (Blender)	۱		۰	۰
۷	پالس اکسی متر	۱		۰	۰
۸	کیسه نایلونی ویژه احیاء نوزادان بسیار کم وزن				
۹	مکونیوم آسپیراتور، پوار	۳		۲	۱
۱۰	لوله خروجی هوا یا کپسول هوا	۱		۰	۰
۱۱	لوله خروجی اکسیژن یا کپسول اکسیژن	۱		۱	۱
۱۲	مانکن قابل لوله گذاری	۳		۲	۱
۱۳	وسائل لوله گذاری	۲		۲	۱
۱۴	لوله نای از تمامی اندازه ها	ست ۳	ست ۲	ست ۱	ست ۱
۱۵	کاتر ساکشن از تمامی اندازه ها	ست ۳	ست ۲	ست ۱	ست ۱
۱۶	ماسک حنجره ای (نوزادی)	۱		۰	۰
۱۷	آشکارساز CO <sub>2</sub>	۱		۰	۰
۱۸	ست کاتر گذاری ناف نوزاد	۲		۱	۰
۱۹	کاتر نافی شماره ۴,۵ یا ۵	۲		۲	۰

- در تمامی بیمارستان های کشور که بخش زایمان داشته و یا دارای بخش نوزادان و یا اتاق عمل سازارین هستند باید تیم مریبان برنامه احیاء نوزاد که دوره مریبی گری احیای نوزادان را گذرانده و مدرک مربوطه را دریافت نموده اند وجود داشته باشد. هسته آموزشی شامل مخصوص اطفال، متخصص زنان و مامایی، بیهوشی و سوپر وایزر آموزشی بیمارستان می باشد.
- کمیته بیمارستانی احیای نوزاد در هر مرکز، موظف است تا با اطلاع از زمان های برگزاری کارگاه های دانشگاهی / بیمارستانی و انجام هماهنگی های چند مرکزی، به نحوی برنامه ریزی کند که تمام پرسنل درگیر در فرایند احیای نوزادان، در برنامه های آموزشی - باز آموزی، بصورت عادلانه و متناسب با نیاز پرسنل و مرکز، شرکت کند.
- در حال حاضر کارگاه های احیای نوزادان به عنوان دوره آموزشی استاندارد برای تمامی پرسنل درگیر در فرایند احیا توصیه می شوند.
- کمیته ارتقاء سلامت نوزادان / احیای نوزادان در هر مرکز، موظف است تا از جهت برنامه های آموزشی درون مرکزی، با هدف ارتقا و ارزیابی اطلاعات و مهارت های افراد برنامه ریزی نماید.
- ارایه گواهی شرکت در دوره های آموزشی - باز آموزی به کمیته نوزادان / احیای نوزادان در هر مرکز جهت ارتقاء ضروری است.

## مدیریت برنامه آموزشی

- مدیریت آموزشی در سطح کشوری بر عهده اداره نوزادان و کمیته علمی کشوری احیاء نوزادان خواهد بود.
- برای برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته در دانشگاه ها کمیته های دانشگاهی و بیمارستانی احیاء نوزادان مسؤول برنامه ریزی و مدیریت برنامه خواهد بود این کمیته ها باید در شروع سال جدید پیش بینی لازم را برای برگزاری کارگاه های احتمالی انجام دهد.
- فرایند نیاز سنجی براساس ارزیابی وضع موجود از مرگ و میر نوزادان در بیمارستان و یا زایشگاه در سال گذشته، بررسی مستندات موجود در فرایند های احیاء نوزادان در بیمارستان، ارزیابی مهارت افراد درگیر در تیم احیاء براساس مستندات ارزیابی کارگاههای بیمارستانی و نظر سنجی از افراد خبره در احیاء در بیمارستان و جمع بندی این ارزیابی ها صورت خواهد گرفت. (مستندات نیازسنجی برای برگزاری کارگاهها جزئی از موارد ارزشیابی برگزاری کارگاهها خواهد بود). برنامه اجرایی این کارگاهها حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال باید نوشته شده باشد.

جدول ۴-۳: رویکرد اجرایی دستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه آموزشی احیاء نوزادان

حداقل زمان تخمینی برای آموزش	روش ارزیابی			منابع لازم			فیلد آموزشی	روش یادگیری عملی و نظری			توانمندی ها	
	دستی	فیلم	دستنامه	درست	کتاب	فیلم		دستی	فیلم	دستنامه		
۳۰ دقیقه	-	✓	✓	درستنامه احیاء	-	مربی احیاء	✓	✓	✓	✓	✓	آشنایی با تغییرات فیزیولوژیکی در نوزادان در هنگام تولد
۱۵ دقیقه	-	✓	✓	درستنامه احیاء	فیلم -مولتی مدیا- مولاز	مربی احیاء	✓	✓	✓	✓	-	آشنایی کلی با مراحل احیا
۱۵ دقیقه	✓	✓	✓	درستنامه احیاء	ملزومات احیاء	مربی احیاء	✓				✓	آشنایی با وسائل مورد نیاز احیا
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستنامه احیاء	فیلم -مولتی مدیا- مولاز	مربی احیاء	✓	✓	✓	✓	-	توانایی شناسایی نوزاد نیاز مند احیا
۳۰ دقیقه	✓	--	--	درستنامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	✓	✓	✓	توانایی باز کردن راههای هوایی
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستنامه احیاء	درستنامه احیاء	فیلم -مولتی مدیا-	مربی احیاء	✓	✓	✓	--	آشنایی برخورد با نوزادی که آسپیراوسون مکونیوم داشته
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستنامه احیاء	فیلم -مولتی مدیا	مربی احیاء	✓	✓	✓	✓	--	دادشن داشن لازم برای در چه موقعی از جریان آزاد اکسیژن استفاده نماید
۲۰ دقیقه	✓	--	--	درستنامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	--	✓	--	توانایی استفاده از جریان آزاد اکسیژن در صورت نیاز
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستنامه احیاء	درستنامه احیاء	فیلم -مولتی مدیا	مربی احیاء	✓	✓	✓	--	دادشن داشن لازم برای اینکه در چه زمانی باید از وسائل تهویه با فشار مثبت استفاده نماید
۱۰ دقیقه	✓	✓	--	درستنامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	--	✓	--	آشنایی با انواع بگ و ماسک و ویژگی هر یک
۲۰ دقیقه	✓	--	--	درستنامه احیاء	درستنامه احیاء	فیلم -مولتی مدیا	مربی احیاء	✓	✓	✓	--	توانایی استفاده از بگ و ماسک برای تهییه با فشار مثبت از دستگاه تی پیس به شکل مناسب

## جدول ۴-۳: رویکرد اجرایی دستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه آموزشی احیاء نوزادان (ادامه)

زمان تخصصی برای آموزش	روش ارزیابی			متای لازم			فیلد آموزش	روش یادگیری عملی و نظری			توانمندی ها	
	لرید	نگاه	لایه	لرید	نگاه	لایه		لرید	نگاه	لایه		
۲۰ دقیقه	✓	--	--	درستامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	توانایی هماهنگ کردن فشردن قفسه سینه با تهیه
۲۵ دقیقه	--	✓	✓	درستامه احیاء	مولتی مدیا- فیلم	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	به دست آوردن دانش لازم برای استفاده به موقع از لوله گذاری داخل نای
۳۰ دقیقه	✓	--	--	درستامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	توانایی استفاده از لارنگوسکوب برای گذاشتن لوله احیاء
۱۵ دقیقه	--	✓	✓	درستامه احیاء	مولتی مدیا و فیلم	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	آشنایی با چگونگی استفاده از لوله نای در تهیه مثبت
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستامه احیاء	مولتی مدیا و خودداروها	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	آشنایی با داروهای مورد استفاده در احیاء
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستامه احیاء	مولتی مدیا	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	داشتن دانش لازم برای استفاده در زمان مناسب از داروها
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستامه احیاء	مولتی مدیا	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	آشنایی با راههای مصرف داروها در حین احیاء
۲۰ دقیقه	✓	--	--	درستامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	توانایی استفاده از کاتتر نافی
۳۰ دقیقه	✓	--	--	درستامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	توانایی انجام مراحل احیاء نوزاد نارس
۱۰ دقیقه	--	✓	✓	درستامه احیاء		مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	آشنایی عوارض احیاء نوزاد
۲۰ دقیقه	✓	--	--	درستامه احیاء	مولاز	مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	توانایی کنترل عوارض احیاء
۲۰ دقیقه	--	✓	✓	درستامه احیاء		مربی احیاء	✓	✓	---	✓	---	آشنایی با مسایل اخلاقی احیاء نوزاد

## جدول ۴-۴: جدول زمانی برنامه کارگاه احیاء نوزاد

درس	عنوان	تئوری (دقیقه)	عملی (دقیقه)	پایه	پیشرفت
۱	مرور کلی بر احیاء	۳۰	۰	+	+
۲	گام های نخستین احیاء	۶۰	۶۰	+	+
۳	تهییه با فشار مثبت	۶۰	۶۰	+	+
۴	فشردن قفسه سینه	۳۰	۳۰	+	+
۵	لوله گذاری نای	۶۰	۶۰	-	+
۶	تجویز دارو	۳۰	۳۰	-	-
۷	ملاحدات و بیزه	۳۰	۳۰	-	-
۸	احیاء نوزاد نارس	۳۰	۳۰	-	-
۹	ملاحدات اخلاقی احیاء نوزاد	۳۰	۰	+	+
۱۰ ساعت	جمع تئوری و عملی	۶ ساعت			


## ۶ پشتیبانی مالی برنامه آموزشی احیاء نوزاد

- هزینه های کارگاه های آموزشی احیاء نوزاد در سراسر کشور در بیمارستان های دولتی آموزشی و غیر آموزشی وابسته به وزارت بهداشت به مدت ۲ سال از زمان ابلاغ برنامه، پس از ارسال صورت وضعیت هزینه های آن به اداره سلامت نوزادان، توسط این اداره تامین خواهد شد. بعد از ابلاغ، تجدید دوسالانه گواهی احیاء نوزاد برای تمامی ماماها، پرستاران، پزشک های متخصص اطفال، زنان و مامایی، بیهوشی و اورژانس که ذینفع مراقبت از نوزاد هستند با پرداخت هزینه های آن توسط خود کارآموزان الزامی خواهد شد.
- هزینه برگزاری کارگاه در بیمارستان های غیر مرتبط به وزارت بهداشت و درمان مانند بیمارستان های تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، خصوصی و وابسته به نهادها و ارگانها و بیمارستانهای خیریه به عهده کارآموزان یا سازمان مرتبط آنها بنا بر سیاست ها و برنامه های آموزشی آنها می باشد.

## ۷ فرایند برگزاری کارگاه احیاء نوزاد

- سوپر وایزر آموزشی بیمارستان پرسنل واجد شرایط و یا داوطلب فراغیری احیاء پایه یا پیشرفته را در دو لیست جداگانه فهرست می کند. سپس از فهرست های مورد اشاره کارگاه های ۲۵ نفره احیاء پایه یا پیشرفته نوزاد را برنامه ریزی می کند. البته می توان ابتدا برنامه کارگاه را در وب سایت بیمارستان گذاشته و از پرسنل خواست که خود در کارگاه ثبت نام کنند.
- در مورد کارگاه احیاء پایه، بعد از هماهنگی با تمامی هسته آموزشی بیمارستانی احیاء نوزاد برنامه کارگاه تدوین شده و فرایند دریافت امتیاز بازآموزی و پشتیبانی مالی آن شروع می شود. در کارگاه های پیشرفته فهرستی از واجدین شرایط شرکت در گارگاه تهیه و به معاونت درمان دانشگاه مربوطه ارسال می شود تا بعد از رسیدن تعداد شرکت کنندکان به حد نصاب، هماهنگی با گروه مربی های دانشگاهی انجام و مقدمات برگزاری کارگاه فراهم گردد. مربی بیمارستانی می تواند کارگاه های با تعداد کارآموز کم نیز برگزار نماید ولی باید در انتهای هر ماه لیست شرکت کنندکان را به تیم مربی های دانشگاهی ارائه گردد تا در تاریخ مشخص برای آزمون مگاکد اقدام شود.
- یک ماه قبل از برگزاری کارگاه، درسنامه احیاء نوزاد برای کارآموزان ارسال شده و به صورت کتبی به آنها یادآوری می شود که در ابتدای کارگاه احیاء نوزاد یا روز قبل از آن، آنها از تمامی فصول درسنامه احیاء نوزاد به صورت آزمون چند گزینه ای کتبی ارزیابی شده و برای حضور در کارگاه باید حداقل ۸۵٪ از گزینه ها را درست پاسخ بدهند. (نمونه نامه در ضمیمه ۲)
- در روز کارگاه یا روز قبل از آن آزمون کتبی گرفته می شود. کارآموزانی که بیشتر از ۸۵٪ از کل نمره را دریافت کرده اند برای کارگاه آماده می شوند. کارآموزانی که دارای گواهی پایه بوده و متقاضی گذراندن کارگاه پیشرفته هستند نیز باید آزمون کتبی را بگذارند.
- کارگاه پایه یا پیشرفته با برنامه پیشنهاد شده در جدول ۴-۴ برگزار می شود. کارآموزان باید تمامی چک لیست های کارایی درسهای ۲ تا ۶ را زیر نظر مربی ها تمرین کرده و به درستی پشت سر بگذارند.

۵. در انتهای کارگاه تاریخی بین ۱ الی ۲ ماه بعد برای آزمون مگاکد به اطلاع کارآموزان رسانده می شود (نمونه نامه در ضمیمه ۳). مربی ها موظف هستند کارآموز را با آزمون مگاکد آشنا کنند. به کارآموزها پیشنهاد می شود در مدت باقیمانده تا آزمون مگاکد به صورت تیمی یا انفرادی تمرین کرده و توسط سناریو های موجود در DVD و یا مورد های موجود در کتاب تمرین کنند. توصیه می شود بعد از کارگاه فرم ارزشیابی کارگاه را برای نظر سنجی و دریافت پیشنهادات کارآموزان در اختیار آنها قرار داده و از آنها خواسته شود تا آزادانه و صادقانه نظرات خود را به مربی (ها) قرار دهند (ضمیمه ششم).



۶. در تاریخ مشخص شده مربی های دانشگاهی در صورت قبول شدن کارآموزان در آزمون مگاکد گواهی را برای آنها صادر می کند. مربی موظف است ابتدا سناریو مورد آزمون را یک بار برای کارآموز توضیح داده و به رویت

وی برساند. سپس ستاریو مورد نظر را برای کارآموز نقش بازی کرده و چک لیست مگاکد را بر اساس عملیات احیاء کارآموز بر روی مانکن تکمیل می کند.

۷. در انتها باید اسمی مربی ها و کارآموزان کارگاه آورده و در سامانه وزارت بهداشت به آدرس <http://port.health.gov.ir/family/NeoHealth/nrp/> وارد نمایند. وزارت بهداشت موظف است از تاریخ ارسال الکترونیک اطلاعات به سامانه وزارت بهداشت تا حداقل یک ماه گواهی احیاء نوزاد را به آدرس مندرج در فهرست ارسال نماید.

## 8) کارآموز واجد گواهی احیاء نوزاد:

- گواهی احیا در صورتی برای کارآموز صادر می شود که در آزمون مگاکد حداقل ۸۵٪ نمره کلی را به دست آورد. فرم ارزیابی مگاکد شامل ۵ عنصر حیاتی است که بایستی در یک سکانس صحیح برای گذراندن مگاکد عمل شوند. یادگیرندگان باید یک نمره کامل (۲) در هر کدام از این ۵ مورد را بدست آورده و ۸۵٪ نمره کلی را کسب کنند.
- تصویر زیر نمونه ای از گواهی احیاء نوزاد را نشان می دهد. کارآموز باید همواره در هنگام کار گواهی را به همراه داشته باشد.

### گواهینامه دوره آموزشی احیای نوزاد

جناب آقای / سرکار خانم :

دارای مدرک تحصیلی:  مربی دانشگاهی  مربی بیمارستانی  احیا کننده پایه  احیا کننده پیشرفته  
 دوره نظری و عملی احیاء نوزاد به مجوز شماره **\_\_\_\_\_** تاریخ **\_\_\_\_\_** به مدت **\_\_\_\_\_** ساعت  
 مطابق با برنامه کشوری احیا نوزاد با موفقیت طی نموده است.  
 کد مربی : **\_\_\_\_\_** اعتبار گواهی تا تاریخ : **\_\_\_\_\_**

اين گواهینامه جايگزين مدرک تحصيلی ناميبرده نمي باشد

فرمايegan برای دريافت گواهینامه باید امتياز چهاردرس اول و درس ۹ را به صورت كامل کسب نمایند

مربيان دانشگاهي و بيمارستانی بایستی امتياز كليه دروس را به طور كامل کسب نمایند

**نام و نام خانوادگي مربي**

مدت اعتبار اين گواهینامه از تاریخ اتمام دوره دو سال تمام است

### کارنامه دوره آموزشی احیا نوزاد

ردیف	درس ۱-۴ و ۹	نام	نام
۱	مرور کلی و اصول احیاء		
۲	گامهای نخستین احیاء		
۳	استفاده از وسایل تهییه با فشار مثبت		
۴	فسردن قفسه سینه		
۵	اصول اخلاقی احیا در پایان زندگی نوزاد		
	درس پنجم		
۶	لوله گذاری داخل تراشه		
۷	درس ششم: تجویز دارو		
۸	درس هفتم: ملاحظات ویژه		
۹	درس هشتم احیا نوزاد نارس		
۱۰	همه موارد		

## آموزش مربی احیاء نوزاد

برنامه احیاء نوزاد (NRP) ۲ هدف مهم را دنبال میکند.

۱. حضور شخصی که مسئولیت اولیه او نوزاد بوده و توانایی شروع احیاء را داشته باشد. البته خود این شخص یا شخص دیگری که مهارت‌های لازم برای اجرای یک احیاء کامل را داشته باشد باید در دسترس باشد.
۲. فراهم کردن یک برنامه آموزشی مناسب برای ارتقاء دانش و مهارت ارائه دهنده‌گان احیاء نوزاد به گونه‌ای که برای تمامی زایشگاه‌ها و بخش‌های مراقبت نوزادان قابل دسترس باشد.

برای رسیدن به این اهداف نقش مسئول آموزش برنامه احیاء نوزاد بیمارستان و مربی دانشگاهی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مبحث فرآیند لازم جهت تعلیم مربی احیاء نوزاد را شرح می‌دهد.

مربیان پزشکان، پرستاران و دیگر افراد حرفه‌ای گروه پزشکی هستند که تجربیات گسترده‌ای در مراقبت نوزاد در اتفاق زایمان، بخش نوزادان یا بخش‌های مراقبت ویژه نوزادی دارند. ایده آل این است که مربی برنامه احیاء نوزاد، تجربه روزمره در اتفاق زایمان داشته باشد. مربیان بیمارستانی، برنامه احیاء نوزاد را در بیمارستان راه اندازی کرده به طور مدام آن را اجرا می‌کنند. مربیان دانشگاهی مربیان بیمارستان را آموزش داده و اجرای برنامه‌های ارایه دهنده‌گان خدمت در بیمارستان‌های دانشگاهی را پایش و نظارت می‌کنند. مربی دانشگاهی رابط اصلی برنامه دانشگاهی احیاء نوزاد و کمیته کشوری احیاء نوزاد است.

### کارآموز مربی گری احیاء نوزاد:

- کارآموز مربی گری احیاء شامل پزشکان، پرستاران، ماماهای دستیاران پزشکی و دیگر متخصصین اطفال، زنان و مامایی و بیهوشی هستند که تجربه حمایت از نوزاد در اتفاق زایمان، نرسрی نوزاد یا بخش مراقبت ویژه نوزادان را دارند. اگر مربی برنامه احیاء نوزاد دارای تجربیات حاصل از اتفاق زایمان باشد ایده‌آل خواهد بود. مربیان بر اساس تجربیاتشان در حمایت از نوزاد، توانایی آنها برای یادگیری و آموزش روش‌های احیاء و میزان اشتیاق و توانایی آنها برای برقرار نمودن و نگهداری برنامه احیاء نوزاد انتخاب می‌شوند.
- مربی بیمارستانی:
  - به منظور برقرار کردن، توسعه و حفاظت از بسته خدمتی احیاء نوزاد اطلاعات و مهارتهای لازم را فراهم می‌آورد.
  - بیمارستان‌هایی را که تمایل به اجرای برنامه احیاء نوزاد دارند، مساعدت می‌نماید.
  - ثبت و مستندسازی برنامه احیاء نوزاد را در بیمارستان پیگیری می‌کند.
  - جهت اطمینان از اینکه نیازهای برنامه احیاء نوزاد بیمارستان تأمین شده است، با مربیان دانشگاهی در تعامل است.
  - برای مدت ۲ سالی که گواهینامه‌وی اعتبار دارد حداقل در ۲ مبحث آموزشی برنامه احیاء نوزاد فعالیت می‌کند. (تعلیم / کمک)
- مربی دانشگاهی:
  - جهت شناسایی نیازهای اجرای برنامه احیاء نوزاد در بیمارستان به مربی بیمارستانی مربوطه کمک می‌کند.
  - بر حسب نیاز، به مربیان بیمارستانی ارائه دهنده‌گان احیاء نوزاد را آموزش می‌دهد.
  - بر اجرای برنامه‌های فراهم شده در بیمارستان تحت نظر وی سرپرستی مستمر دارد.
  - به صورت مستمر مربیان بیمارستان را حمایت می‌کند و به صورت دائم یک تعامل پایدار را بین مرбیان بیمارستانی، ارائه دهنده‌گان خدمت و مربیان دانشگاهی دیگر ایجاد می‌کند.

- در نقش یک رابط بین دانشگاه و AAP عمل می‌کند.
- برای مدت ۲ سالی که گواهینامه وی معتیر است حداقل در ۲ مبحث آموزشی برنامه احیاء نوزاد فعالیت می‌کند.

### برنامه آموزشی مربي بيمارستانی

مسئولیت اولیه مربي بيمارستانی اجرا و حفاظت از اجرای بسته خدمتی احیاء نوزاد به صورت مستمر در بيمارستان است. مربي بيمارستانی اطلاعات و مهارت های مورد نیاز را به منظور توسعه و پایداری برنامه احیاء نوزاد در بيمارستان فراهم می‌آورد. بسیاری از اهداف آموزشی برای مورد نظر در كتاب آموزش مربي گري احیاء نوزاد<sup>۱</sup> ارائه شده است.

جدول ۴-۵: اهداف برنامه آموزشی مربي بيمارستانی احیاء نوزاد و منابع مورد نیاز برای تدریس

منابع	اهداف
درستنامه احیاء نوزاد، چاپ پنجم. راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم.	۱- شرح منشأ و اهداف برنامه احیاء نوزاد
www.aap.org	۲- شرح آنکه چگونه شواهد به صورت راهکارهای توسعه یافته و تبدیل به توصیه‌های برنامه احیاء نوزاد می‌شوند.
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم.	۳- شناسایی اجزاء یک برنامه احیاء نوزاد بيمارستانی موفق
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۶-۳ و ۶، گفتار ۱-۳ و ۱، گفتار ۶-۲۱ و ۶	۴- شرح آنکه چه کسی می‌تواند مربي برنامه احیاء نوزاد باشد؟ ضروریات صفات و مسئولیتهاي همراه
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۳-۱ و ۱، گفتار ۷-۷ و ۷، گفتار ۹-۳ و ۳، گفتار ۳-۴ و ۳	۵- شناسایی خصوصیات طراحی برنامه احیاء نوزاد
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۱-۳ و ۱ خود - کارآیی در احیاء اطفال: اشاراتی دارد به تحصیل و اجراء Pediatrics. ۱۹۹۶; ۹۷: ۹۴-۹۹	۶- شناسایی ۴ اصل که شکل دهنده اصولی رشته‌های برنامه احیاء نوزاد هستند.
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۳-۴ و ۳، گفتار ۳-۴ و ۴	۷- شناسایی اجزاء نیازمند به فرآگیری در یک دوره آموزشی برنامه احیاء نوزاد
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۴-۷ و ۳-۷ و ۷، گفتار ۲-۳	۸- شناسایی شباهتها و تفاوت‌های بین واحد ارائه دهنده و واحد Renewal
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۷-۷ و ۷	۹- شناسایی ۳ طرح برای هدایت برنامه‌های آموزشی برنامه احیاء نوزاد شامل مزايا و معایب هر کدام
ضمائم راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم:	۱۰- شناسایی منابع قابل دسترسی برای تدریس و یادگیری محتوا و مهارتهای برنامه احیاء نوزاد
راهنمای مربيان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۷-۱۰ و ۷-۱۱، گفتار ۴-۸ و ۸	۱۱- شناسایی و بحث بر سر نقاط کلیدی هر درس در درستنامه احیاء نوزاد چاپ پنجم.
	۱۲- شرح استراتژیها برای پیشبرد تمرین مهارتهای برنامه احیاء نوزاد

<sup>۱</sup> Neonatal Resuscitation Instructor's manual

<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۱۹ - ۷ و ۷ ، ضمیمه، ضمیمه ۲۹ تا ۲۳ ، گفتار ۳-۴ و ۳ ، گفتار ۷ و ۲۰ و ۷-۲۱ و ۷-۲۰ ، گفتار ۳ و ضمائم ۵ تا ۸ تا ۳-۹ تا ۱۲ تا ۳-۱۲ و ۷-۴ و ۵-۸ تا ۵-۷</p> <p>مراجعه به سایت <a href="http://WWW.aap.org">WWW.aap.org</a> برنامه احیاء نوزاد و کلیک روی ارائه دهنده <b>Resources</b> به منظور یادگیری چگونه سفارش دادن موضوعات دوره آموزشی برنامه احیاء نوزاد به صورت <b>On line</b> و مراجعه به سایت <a href="http://www.aap.org">www.aap.org</a> برنامه احیاء نوزاد و کلیک روی <b>Instructor Tools</b> که مشخص می شود.</p>	<p>۱۳- لیست کردن مسئولیت های مریبی بیمارستانی برای سازماندهی و برقرار نمودن دوره آموزشی احیاء نوزاد</p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۱-۴ و ۱</p>	<p>۱۴- شناسایی استراتژی ها برای مدیریت فراغیرندگان با شبک ها و راههای متفاوت یادگیری</p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۷-۳ و ۶-۳ و ۳</p>	<p>۱۵- نشان دادن استفاده و ارزیابی مناسب از مدارک هم در <b>On line</b> و هم در قالب <b>hard copy</b></p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۳-۳ و ۳ ، گفتار ۲ (رؤس مطالب ۵ درس با چک لیستهای اجرایی)</p>	<p>۱۶- ارائه عملکرد و ارزیابی همه چک لیستهای اجرایی</p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۳-۳ و ۳ و گفتار ۲ (رؤس مطالب ۵ درس با چک لیستهای اجرایی)</p> <p>موارد <b>DVD</b> در احیاء نوزاد: تبدیل کردن دانسته ها و مهارتها به عمل. اجزاء مگاکد ۴-۹ و ۴-۱۷ و ۴-۱۸</p>	<p>۱۷- ارائه عملکرد و ارزیابی از یک مگاکد جامع</p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۳-۵ و ۵</p> <p>رفتن به سایت <a href="http://www.aap.org">www.aap.org</a> برای احیاء نوزاد و کلیک روی <b>Resources "Instructor's manual"</b></p>	<p>۱۸- شرح روش مناسب برای مستندسازی</p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۶-۶ و ۶</p>	<p>۱۹- شرح آنکه چگونه وضعیت مریبی حفظ می شود.</p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۱</p> <p>صفحه برنامه احیاء نوزاد <b>Web</b> مریبی را به اطلاعات مفید و منابع برنامه احیاء نوزاد هدایت می کند. (<a href="http://www.aap.org">www.aap.org</a> برنامه احیاء نوزاد)</p>	<p>۲۰- شناسایی منابع برای مریبی که درباره اجراء اجزاء برنامه احیاء نوزاد سوال دارند.</p>
<p>راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۳-۸ و ۸</p> <p>عملکرد احیای اتاق زایمان با یک تیم احیاء: <a href="http://www.aap.org">www.aap.org</a> برنامه احیاء نوزاد</p> <p><b>Thomas EJ, Sexton JB, Helmreich RL.</b> ترجمه رفته های کار تیمی از هوائزی تا مراقبت سلامتی ارتقاء رفتار بازرسین احیاء نوزاد <b>Qual of Health care.</b> ۱۳:۱ ۵۷-۶۴ ۲۰۰۴</p> <p><b>"Lighthouse Cooper S, Wakelam A.</b> <b>leadership". Resuscitation.</b> ۱۹۹۹; ۴۲: ۲۷-۴۵</p>	<p>۲۱- شرح آنکه چگونه مریبی ممکن است فعالیتهای فراغیری انتخابی را سازماندهی کند.</p>

## برنامه آموزشی مربی دانشگاهی

مربی دانشگاهی بازی کننده نقش محوری در برنامه احیاء نوزاد می‌باشد. او به وسیله آموزش مریبان و نظارت بر اجرای برنامه‌های ارائه دهنده در بیمارستانهای دانشگاهی که وکالت‌ش را به عهده دارد، اینکار را انجام می‌دهد. مربی دانشگاهی باید (سلط- توانایی-کنترل) کاملی برای تمامی وظایف برنامه احیاء نوزاد داشته باشد، زیرا او تدریس کننده است و مربی‌های بیمارستانی از وی اول‌گو می‌گیرند.

مربی دانشگاهی به عنوان یک تسهیل کننده اجرای دانشگاهی برنامه احیاء نوزاد قلمداد شده و آموزش مریبان بیمارستانی را به عهده داشته و نقطه اتصال حیاتی بین برنامه‌های محلی و کمیته هدایت برنامه احیاء نوزاد محسوب می‌شود. مباحث درسی مربی دانشگاهی برنامه احیاء نوزاد می‌تواند تعديل شود تا بتواند نیازهای منطقه جغرافیایی و فراگیران را برآورده سازد. در ادامه طرح زیر ممکن است به عنوان نقطه شروع برای تاسیس دوره آموزشی مربی دانشگاهی احیاء نوزاد استفاده شود.

بسیاری از نکات آموزشی برای مباحث این دوره آموزشی در متاب آموزش مربی گری احیاء نوزاد ارائه شده است. شماره صفحه برای اطلاعات بیشتر در این راهنمای دستی در کنار نکات آموزشی جایی که در دسترس و کاربردی باشد ارائه می‌شود.

**جدول شماره ۶-۶: اهداف آموزشی دوره مربی گری احیاء دانشگاهی و منابع مورد نیز برای آن**

اهداف	منابع
۱- شرح نقش مربی دانشگاهی	راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۶
۲- شناسایی اجزاء آموزشی دوره مربی بیمارستانی	راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم
۳- شناسایی راهکارهایی که مربی ناحیه ای بتواند بر اجرای شدن برنامه احیاء نوزاد نظرات داشته باشد.	راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۶
۴- لیست اجزاء دوره آموزشی مربی گری دانشگاهی	راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۶
۵- شناسایی راهکارهایی برای حمایت مستمر مریبان بیمارستانی	راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۶
۶- شرح نقش رابط بین پرسنل بخش مراقبت ویژه نوزادان و مریبان بیمارستانی	راهنمای مریبان برای احیاء نوزاد چاپ چهارم: گفتار ۶

### فرایند آموزش مربی گری احیاء نوزاد:

چهار اصل آموزش برنامه احیاء نوزاد

#### ۱- توصیه‌های درمانی مبتنی بر شواهد باشد.

لفظ پژوهشی مبتنی بر شواهد برای توضیح فرایندی به کار می‌رود که در آن افراد حرفه‌ای پژوهشی پرسش‌هایی اساسی درباره کارهای بالینی خود کرده، بهترین شواهد در دسترس را برای پاسخ به این پرسش‌ها، جستجو می‌کند و سپس بر اساس ارزیابی دقیقی که از کیفیت و قدرت شواهد به دست می‌آورد نتیجه گیری و طرح درمانی را پی‌ریزی می‌کند. این روش، طرح‌های درمانی را که براساس راهکارهای درمانی روایت شده و مبتنی بر شواهد علمی پژوهشی تایید شده نیست، نظیر «به نظر ایده خوبی می‌رسند» را تایید نمی‌کند. واضح است که شواهد کافی برای پاسخ دقیق به تمام پرسش‌های بالینی مرتبط با احیاء نوزاد وجود ندارد. در این حالت، قضاوت‌های بالینی براساس فهم بهترین شواهد موجود، و سبک سنگین

کردن خطرات و منافع انتخاب های درمانی است که با تجربه حرفه ای برای تصمیم سازی درمانی تلفیق شده است. شواهد جدید همه ساله در دسترس قرار می گیرد. گاهی این شواهد جدید چیزهایی را که بیش از این گمان می رفت صحیح باشد، زیر سوال می برد. گروه پژوهشی فهیم باید دانش خود درباره اصول علمی توصیه های درمانی روزآمد حفظ کند. توصیه های درمانی در چاپ پنجم درسنامه احیای نوزاد با استفاده از فرایند پژوهشی مبتنی بر شواهد شکل گرفته است.

## ۲- آموزش مبتنی بر مشکل (PBL)

آموزش بزرگسالان بر مشکلات متمرکز است. مشکلات باید واقعی باشند. هر مرتبی برنامه احیاء نوزاد باید قوانین و اصول را یاد دهد و سپس آن ها را در شرایط احیا به کار بندد. با وجود این مطالعات نشان داده است که بزرگسالان وقتی با یک مشکل خاص شروع کنند و برای حل آن براساس اصولی منطقی تلاش کنند آسان تر می آموزند. این دیدگاهی است که چاپ پنجم درسنامه احیای نوزاد بر پایه آن شکل گرفته است. مشکلی ارایه می شود و اصول زمینه ای حل مشکل با یک روش منطقی بیان می گردد. برای نمونه، یک نوزاد با آپنه باید تهويه کمکی دریافت کند. پیش از این که تهويه موثر واقع شود، راه هوایی پاک لازم خواهد بود. بنابراین ساکشن پیش از تهويه با فشار مثبت انجام می شود. به عنوان یک مرتبی برنامه احیاء نوزاد شما با استفاده از سناریوهای مصور<sup>۱</sup> با مفهوم آموزش مبتنی بر مشکل آشنا خواهید شد. چاپ پنجم درسنامه احیای نوزاد، از سناریوهایی بهره می برد که در آن، کار آموزان با مهارت های آن در درس مواجه شده، فرصت «مشاهده» یک وضعیت احیا را پیدا کرده، خود را بخشی از گروه احیا محسوب می کنند. سناریوهای ارایه شده در این درسنامه مثالهایی هستند که با هدف به تصویر کشیدن روش های درست احیای نوزاد ارایه شده اند. سناریوهای آموزش مبتنی بر مشکل، در همه مراحل آموزشی این دوره ادغام شده اند. در طی دوره کارآموز می تواند با تعامل با سناریوهایی که در DVD-ROM آمده، مهارت های تصمیم گیری را تمرین کند. برنامه احیاء نوزاد هم چنین از آموزش مبتنی بر سناریو در چک لیست های مهارت بهره می برد تا حصول مهارت های مخصوص روانی - حرکتی<sup>۲</sup> را تسهیل کند. در مگا کد از سناریوهایی استفاده شده تا دانسته های شناختی، مهارت های حرکتی و رفتارهای موثر گروهی را در یک احیا ادغام کند که به آرامی از آغاز تا پایان یکپارچه جریان داشته باشد.

## ۳- ایجاد خود- کارآمدی

خود کارآمدی یک تئوری آموزشی است که در دهه ۱۹۷۰ توسط آلبرت باندورا<sup>۴</sup> ارایه گردید که برای احیای نوزاد تاثیر مهمی داشته است. حتی اگر شخصی دانش و مهارت های احیای نوزاد را باشد عملیات احیاء با موفقیت انجام نخواهد شد مگر این که او قادر باشد دانش خود را به صورت موفقیت آمیزی در احیای واقعی به کار ببرد (یعنی شخصی که قویاً معتقد است که قادر به انجام موفقیت آمیز کاری می باشد و معمولاً آن را با موفقیت به انجام می رساند حتی وقتی شرایط پر استرس و متغیر است).

خود کارآمدی متفاوت از اعتماد به نفس<sup>۵</sup> است. اعتماد به نفس یک زمینه شخصیتی ثابت می باشد. دریافت های خود کارآمدی هر شخصی براساس شرایطی که پیش روی او است متغیر است. برای مثال یک سیاستمدار ممکن است اعتماد به نفس بالایی داشته باشد اما وقتی وظیفه مراقبت از کودکی را در یک مغازه خواربار فروشی عهده دار می شود ممکن است خودکار آمدی اش کاملاً پایین باشد.

<sup>۱</sup> Illustrative  
<sup>۲</sup> Psychomotor  
<sup>۳</sup> Albert Bondura  
<sup>۴</sup> self- confidence

در نگاه به محتویات برنامه احیاء نوزاد ، فردی با خودکارآمدی بالا، به احیای نوزاد به عنوان یک فرصت مثبت برای به کار بردن مهارت های مهم اش می نگردد و اعتقاد واضح دارد که می تواند نوزاد را به طور موفق احیا کند. مریبی برنامه احیاء نوزاد می تواند در تسهیل ایجاد این خودکارآمدی بالا در کارآموزان برنامه احیاء نوزاد نقش کلیدی داشته باشد. راهکارهای ارتقای خودکار آمدی در کارآموزان شامل موارد زیر است:

#### • فرصت هایی برای آموزش از راه مشاهده

مشاهده مهارت های فرد دیگری جز خود کار آموز - چه به صورت زنده یا ضبط شده- تاثیر عمیقی بر خود کارآمدی کارآموز دارد. نمایش هر مهارت در ایستگاه های کسب مهارت (به عنوان مثال نمایش تهویه با فشار مثبت) نمایش مهارت ها طی سناریوهای احیا یا مگا کد، مروز نوارهای ویدیویی کدهای احیای ساختگی (غیر واقعی) نوزاد در بخش خودتان و مشاهده **DVD** موارد احیای نوزادی: ترجمه دانش و مهارت به عملکرد، نمونه هایی از فرصت های آموزشی مشاهده ای برای شرکت کنندگان در برنامه احیاء نوزاد است.

مشاهده ایده ال شامل استفاده از وسایل و تجهیزات احیای نوزاد که به طور معمول از آنها استفاده می شود، افرادی که آموزشگر می تواند آنها را بشناسد، شکستن یک روند پیچیده به اجزای کوچکتر، قابل مشاهده نمودن روند، نشان دادن عملکردهای موثر وغیر موثر، و دستورالعمل هایی برای عملکرد موثر در موارد مواجهه با مشکلات یا موضع می باشد.

#### • استفاده از تاثیر تشویق کلامی طی تمرین های مشارکتی

کارآموزان به شدت از تایید دیگران تاثیر پذیرند. به خصوص اگر در شرایطی قرار گیرند که خود ارزیابی برای شان سخت باشد. این تایید با حس خود کارآمدی کارآموز عجین می شود. مریبی باید به جنبه های موفق کارهای کارآموز، اشاره کند، حتی اگر مهارت وی به طورکلی مطلوب نباشد. مریبی برنامه احیای نوزاد فرصت هایی خواهد یافت تا در شرایط زیر بازخورد مثبت بدهد :

(۱) پیش از انجام تمرین های سخت تر با تمرین های ساده شروع کند (۲) جنبه های مثبت کارهای انجام گرفته را تشویق کرده و در صورت لزوم بازخورد صحیح دهد و (۳) اشاره کند که پیشرفت کارآموز به طرف تسلط در احیای نوزاد می باشد.

#### • مدیریت شرایط فیزیولوژیک و اثر بخش

طی احیای نوزاد، کارآموز می باید بداند چگونه وضعیت نوزاد را ارزیابی کرده، اقدام مناسب را در زمان اندک، به درستی انجام دهد. علاوه بر مهارت های شناختی و روانی حرکتی، کارآموزان باید بیاموزند چگونه شرایطی مانند ترس، وحشت و خجالت را تحت کنترل درآورند. بخشی از خودکارآمدی بالا به ناگزیر صرف مواجهه با این احساس ها شده، سبب تلاش های پایدار یا مضاعف فرد در مواجهه با شرایط سخت حین احیا می شود. مریبی باید بپذیرد که هر کس طی احیا نوزادی اضطراب دارد. با وجود این، کارآموزانی که خودکارآمدی بالایی کسب کرده اند این احساس ها را به کناری می گذراند تا روی وضعیت احیا تمرکز کنند.

### ۴- ایجاد گروه های اثربخش

اگر چه دانش و مهارت های حرکتی کارآموزان در دوره احیا به صورت فردی ارزیابی می شود، احیای واقعی نوزاد شامل تیمی از افراد حرفه ای گروه پزشکی است که با هم کار می کنند. تیم های بسیار کارآمد احیا، مانند یک تیم ورزشی عمل می کنند. اعضای گروه به طور موثری با سایر اعضای همکاری می کنند. هر فرد، وظیفه خاص خود را می داند و آن را به سرعت و با اطمینان انجام می دهد. اعضای گروه همیشه مراقب مشکلات بوده ، با یکدیگر همکاری دارند و در صورتی که مشکلی

پیدا شود به هم کمک می کنند. این کار گروهی و ارتباط موثر خود به خود و یا شناسی به وجود نیامده است. این کار بارها و بارها پیش از مسابقه تمرین شده است به گونه ای که گروه در روز مسابقه آماده است. به طور مشابه ، کارآموزانی که دوره برنامه احیاء نوزاد را می گذراند نیازمند آموختن رفتارهایی هستند که به ساخت تیمی موثر از آن ها بیانجامد. به عنوان یک مربي، شما می توانيد در شکل گیری اين رفتارها طی برگزاری دوره کمک کنيد.

پژوهشگرانی که روی احیاهای شبیه سازی شده کار می کنند، ده رفتار کلیدی یافته اند که توسط گروه های موفق در احیا به کار می رود. این رفتارها بر اطمینان از آمادگی خوب اعضای گروه، دسترسی آسان به اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام مهارت هایشان و همکاری با یکدیگر به صورتی که مهارت های هر فرد، کارکرد گروه را کامل کند، تاکید دارد.

## پژوهش

برای هدایت و حمایت پژوهش های مرتبط با احیای نوزادان دو اصل کلی وجود دارد:

- کلیه پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مربوط به دانشجویان یا پرسنل بیمارستان که در حوزه احیای نوزادان می باشد، باید تحت حمایت علمی - اجرایی و مالی کمیته های بیمارستانی احیای نوزادان قرار گیرند.
- موضوعات طرح ها و پایان نامه ها باید به نحوی هدایت شوند که با سیاست های پژوهشی کمیته کشوری و نیز معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه همسویی داشته باشند.

الگوریتم این بخش، راهنمای مناسبی برای اقدامات لازم در راستای حمایت از پژوهش های مرتبط با احیای نوزادان در سطح بیمارستان هاست.

### الگوریتم هدایت و حمایت پژوهش های مرتبط با احیای نوزادان

- پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی با لیست اولویت های پژوهشی کمیته های کشوری و دانشگاهی همگواني داشته باشند.
- پروپوزال ها و گزارش نهایی طرح ها / پایان نامه ها، در اختیار کمیته های دانشگاهی / قرار گیرد
- پروپوزال ها و گزارش نهایی طرح ها / پایان نامه ها، باید در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده / دانشگاه ها قرار گیرد

#### همسویی با سیاست های پژوهشی

- تمام پایان نامه ها / طرح های تحقیقاتی در کلیه سطوح دانشجویی، تخصصی و فوق تخصصی باید به تأیید کمیته بیمارستانی احیا برسد. در مقابل کمیته بیمارستانی احیا، موظف به اقدامات ذیل است.
  - کمیته احیای بیمارستانی ملزم به مشاوره علمی و اجرایی در طراحی و اجرای مطالعات مذکور می باشد.
  - کمیته احیای بیمارستانی ملزم به فراهم کردن تسهیلات اجرایی برای مطالعات مذکور می باشد


#### حمایت علمی و اجرایی

- پروپوزال ها و گزارش نهایی طرح ها / پایان نامه ها، باید برای استفاده از تسهیلات مالی در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده / دانشگاه ها قرار گیرد
- با مجریان طرح ها / پایان نامه ها، جهت استفاده از تسهیلات مالی معاونت پژوهشی، کمیته های کشوری یا دانشگاهی، و/یا سایر منابع حمایت کننده همکاری شود.
- سالیانه ۱ درصد از "سهم برنامه های احیا از محل تعرفه های عملیات احیا" برای حمایت از طرح ها / پایان نامه های پژوهشی که در بیمارستان اجرامی شود اختصاص یابد.
- مبلغ فوق به صورت جایزه پژوهشی در اختیار ۱ تا ۳ طرح، به انتخاب کمیته احیای بیمارستانی، قرار می گیرد.

#### حمایت های مالی

# فصل پنجم

## ساز و کار اجرایی



## کمیته کشوری احیای نوزادان

برای آنکه فرایندهای فرایندی پشتیبان آن به درستی اجرا شده و مورد پایش و ارزشیابی قرار گیرد، لازم است تا با یک ساز و کار مشخص اجرایی تعریف شود. برای اجرا و پشتیبانی فرایندهای پشتیبان احیای نوزادان ساختارهایی با عنوان کمیته های احیای نوزادان، در سه سطح کشوری، دانشگاهی و بیمارستانی تعریف شده اند. شکل ۱-۵ نحوه ارتباط این کمیته ها و اجزای داخلی هر کدام را معرفی می نماید.



شکل ۱-۵. کمیته های احیای نوزادان؛ ساختار و ارتباطات

در این بخش جایگاه سازمانی کمیته کشوری، اعضای کمیته، ساعات کاری، حقوق دریافتی و شرح وظایف ایشان به تفکیک بیان می شوند. سپس فرایندهای متنهی به عملکرد مورد انتظار از این کمیته در بخش های "منابع انسانی"، "منابع مالی"، تجهیزات، وسایل و داروها"، "آموزش"، "پژوهش"، "مستند سازی" و "پایش و ارزشیابی"، شرح داده میشود.

## ساز و کار اجرایی

کمیته کشوری مجموعه ایست که از افراد حقیقی و حقوقی که به منظور تدوین، اجرا و / یا نظارت بر پایش دستورالعمل ها و پیاده سازی استانداردهای مربوط به احیای نوزادان در سطح ملی تشکیل می شود. و شامل هیئت مرکزی و ستاد اجرایی است.

اعضای هیئت مرکزی کمیته علمی:

- شامل ۲ نفر از اعضای انجمن پزشکان نوزادان کشور، رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت، یک نفر متخصص بیهوشی، دو نفر متخصص زنان و مامایی (ترجیحاً پریناتالولژیست)، یک نفر مربی مامایی، یک نفر مربی پرستاری و یک نفر فوق تخصص نوزادان، جملگی به انتخاب اداره نوزادان معاونت بهداشت، پس از مشورت با انجمن ها و گروههای مربوطه می باشند.
- افراد فوق با حکم معاون بهداشت و درمان به صورت مشترک به سمت خود، منصوب می شوند.
- افراد یاد شده به مدت ۴ سال عهده دار وظایف گروه علمی می باشند.
- یک نفر به انتخاب افراد گروه به عنوان دبیر معین می شود که عهده دار وظایف هماهنگی است.

اعضای ستاد اجرایی برنامه احیاء:

- دبیر ستاد اجرایی، رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت و درمان می باشد
- یک نفر از معاونت توسعه و یک نفر از اداره نظارت و اعتبار بخشی درمان، به ترتیب توسط معاون توسعه وزارت خانه و رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی درمان با اختیارات تام جهت عضویت در گروه اجرایی معرفی می شوند.
- دونفر کارشناس به پیشنهاد رئیس اداره نوزادان، توسط دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، برای عضویت در گروه معرفی می شوند. یکی از کارشناسان باید حتما focal point برنامه اجرایی نوزادان باشد.
- رئیس انجمن علمی پزشکان نوزادان و یک نفر از اعضای انجمن علمی پزشکان نوزادان که در هیئت مرکزی عضو می باشد دیگر اعضای گروه می باشند.
- افراد فوق با حکم معاون بهداشت به سمت خود، منصوب می شوند.
- افراد یاد شده به مدت ۴ سال عهده دار وظایف گروه اجرایی می باشند.

ساعت کاریهیئت مرکزی کمیته کشوری احیاء نوزادان:

- هیئت مرکزی کمیته کشوری احیاء نوزادان حداقل هر ۳ ماه یک جلسه برگزار می کند. بنا به تشخیص دبیر کمیته، تعداد و مدت زمان جلسات قابل تغییر است.
- اعضای کمیته علمی، حداقل یک جلسه هر ۶ ماه برگزار می کند.
- تنظیم روز و زمان جلسات به اختیار اعضا بوده و در صورت نیاز قابل افزایش است.
- در روزها و ساعت های مقرر برای انجام امور کمیته احیاء، دبیر و اعضا منحصراً به کارهای کمیته مشغول خواهند بود
- روزها و ساعت های مذکور جز روزها و ساعت کاری هر فرد محسوب شده و کسر کردن از مرخصی یا زمان های غیر موظف فرد مجاز نمی باشد.
- هر ۴ ساعت کار کمیته، معادل ۲ واحد فعالیت آموزشی محسوب شده و از ساعت موظف فعالیت آموزشی دبیر و اعضا کسر می شود.
- کارشناسان و دبیرهای هر یک از کمیته ها در فاصله جلسات با انجام وظایف ذکر شده و جمع آوری مستندات و تهیه گزارش حداقل هر یک ۱۰ ساعت فعالیت برای کمیته خود خواهند داشت.

## وظایف

### وظایف کمیته کشوری

- تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های فرایند های پشتیبان برای عملکرد کمیته های دانشگاهی و بیمارستانی
  - شناسایی کاستی های موجود در زمینه دستورالعمل ها و آیین نامه ها
  - شناسایی دستورالعمل ها و آیین نامه های نیازمند اصلاح
  - برنامه ریزی برای تدوین و/یا اصلاح دستورالعمل ها و آیین نامه ها
  - ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه ها
  - بازبینی، تکمیل و اصلاح دستورالعمل ها و بسته خدمتی احیاء نوزاد بصورت دوسالانه
  - تدوین و بازبینی برنامه ها و کوریکولوم های آموزشی
- تعیین و بازبینی فرآیندها و ابزارهای نیاز سنجی آموزشی، پرسنلی و تجهیزات احیاء نوزادان در کشور
- ساماندهی مستند سازی
  - تعیین و بازبینی شاخص ها و تهیه فرم های مستند سازی برای فرایند احیا و فرایند های پشتیبان
  - استخراج، تعیین و بازبینی شاخص های مورد نظر برای مستند سازی
  - تنظیم و/یا اصلاح فرم های یکسان مستند سازی و ابلاغ به کمیته های دانشگاهی
  - انجام و/یا نظارت بر اجرای پایش و ارزشیابی فرایند های مستند سازی در کشور
- ساماندهی پژوهش
  - تعیین و بازبینی اولویت های پژوهشی و پژوهش های مورد نیاز
  - سفارش پژوهش های مورد نیاز
  - پایش و نظارت بر پژوهش های در دست اجرا
  - تایید فازها و گزارش نهایی پژوهش های اجرا شده جهت تسويه حساب
  - هماهنگی با بازوی منورتی علمی در زمینه تایید پژوهش ها
- پایش و ارزشیابی عملکرد کمیته های دانشگاهی بر اساس شاخص های مرتبط با اجرای فرایند اصلی و فرایندهای پشتیبان (شاخص های درونداد- فرآیند- برونداد و شاخص های سلامت جامعه)
  - استخراج، تعیین و بازبینی شاخص های ارزشیابی و پایش
  - ابلاغ شاخص ها و دستورالعمل مربوط به استخراج و گزارش شاخص ها به کمیته های دانشگاهی
  - انجام و/یا نظارت بر اجرای پایش و ارزشیابی برنامه ها و فرایندهای پشتیبان و وابسته در سطح کشوری
- تعیین اهداف مقطعي و پلکانی برای اجرای فرایند احیا، برنامه ریزی برای رسیدن به آنها و پایش برنامه ها
- تهیی گزارش های سالانه از روند اجرای برنامه ها و تحقق اهداف مقطعي
- ساماندهی منابع مالی
- تعیین تعریفه های مربوط به احیا
- تعیین کارانه های پرسنل
- پیشنهاد نرخ کارانه پرسنل دخیل در امر احیا بر مبنای تعداد دفعات شرکت در عملیات احیا (صرف نظر از احیای اولیه یا پیشرفت)

- برآورده بودجه مورد نیاز برای تامین نیروی انسانی، تجهیزات، آموزش و پژوهش برای احیاء نوزادان به صورت کلی و به تفکیک کمیته های دانشگاهی. مبنای برآورده بودجه گزارش های کمیته های دانشگاهی و پیشنهادهای اجرایی کمیته علمی و وضعیت موجود در قیاس با اهداف مرحله ای می باشد.
- پیگیری تخصیص و نظارت بر توزیع و مصرف اعتبارات

## وظایف کمیته علمی احیاء نوزاد

- همکاری مستقیم و مستمر علمی در تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه ها
- ارایه پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر جدیدترین یافته ها و نیازهای روز
- تطبيق دوره ای دستورالعمل ها و آیین نامه ها با آخرین منابع روز و تنظیم پیش نویس اصلاحات برای ارایه به کمیته کشوری
- ارزیابی دوره ای برنامه ها و کوریکولوم های آموزشی از نظر تطابق با یافته ها و دستورالعمل های روز
- ارزیابی دوره ای اهداف مقطعي بر اساس استانداردهای روز و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تكميلي به کمیته کشوری
- ارزیابی نتایج پژوهش های انجام شده، تعیین سطح هر کدام از نظر قابلیت استناد و تطابق با اهداف اولیه پروپوزال.
- پیشنهاد پژوهش های مورد نیاز به کمیته کشوری

## منابع پرسنلی

- برای تحقق اهداف عملکردی کمیته کشوری، در زمینه تامین پرسنل مورد نیاز برای عملیات احیاء، لازم است تا نخست از وضعیت موجود نیروی انسانی در واحد های درمانی سراسر کشور برای انجام عملیات احیاء، برآورده دقیقی به عمل آید.
- کمیته های دانشگاهی احیاء به استناد برنامه احیاء نوزاد موظف به ارزیابی نیروی انسانی حوزه تابعه خود هستند:
  - تعیین میزان کمبود نیروی انسانی آموزش دیده که معمولاً با انجام آموزش مرتفع می گردد
  - تعیین میزان کمبود پرسنلی که با به کارگیری و استخدام نیروی جدید بر طرف می شود.

## تامین نیروی انسانی از نظر کمی

- برای تامین پرسنل طرحی بایستی از طریق دفتر طرح و توزیع نیروی انسانی و دریافت مجوز های لازم و ابلاغ آن به دانشگاهها اقدام نمود. با جذب نیروی انسانی مورد نیاز نظارت و کنترل بر توزیع و نحوه به کارگیری آنها ضروری می باشد.
- برای تامین نیروی انسانی استخدامی باید هماهنگی و اعلام نیاز به حوزه معاونت توسعه و منابع انسانی همچنین مرکز مدیریت شبکه در سطح وزارت بهداشت و درمان انجام شود. تعیین ردیف های استخدامی جدید و دریافت مجوز های لازم برای به کارگیری نیروهای جدید و اعلام مراتب به دانشگاهها همچنین نظارت بر استخدام و توزیع نیروهای جدید و نحوه به کارگیری آنها لازم است.

## آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

- تعداد پرسنلی که نیاز به آموزش عملیات احیاء نوزاد هستند بایستی تعیین شود و بر اساس آن منابع مورد نیاز برای فرایند آموزش احیا و تامین محتوی آموزشی (مانکن احیاء نوزاد، درسنامه و...) در نظر گرفته می شود.
- ناظرت بر امر آموزش و پایش و ارزشیابی آن در هردانشگاه به عهده کمیته دانشگاهی احیا خواهد بود.

### منابع مالی و پشتیبانی

- در دو سال نخست اجرای برنامه تمامی منابع مورد نیاز از محل اعتبارات تخصیص یافته وزارت بهداشت و درمان می باشد. بخشی از اعتبار تعیین شده در اختیار سیاستگزاری کلان کشور در کمیته کشوری احیاء نوزاد قرار می گیرد. همچنین بخشی از اعتبار در اختیار کمیته های دانشگاهی احیا نوزاد قرار خواهد گرفت.
- کمیته کشوری احیا نوزادان می تواند از محل اعتبار تخصیص یافته برنامه های مربوط به پایش و ارزشیابی، پژوهش و مستند سازی را پرداخت نماید. از محل اعتبار تخصیص یافته برای کمیته های دانشگاهی احیا نوزاد، برنامه ها و کارگاههای آموزشی، تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز و پایش و ارزشیابی برنامه در سطح دانشگاه، برنامه های پژوهشی، تامین کمبود های اعتبارات بیمارستانی در زمینه اجرا و پشتیبانی عملیات احیا نوزاد استفاده می شود.

### تامین وسایل و تجهیزات مرتبط با عملیات احیا

- کمیته کشوری موظف است، که در جهت تامین وسایل و تجهیزات مرتبط با عملیات احیا اقدام نماید. اقداماتی که باید توسط این کمیته در راستای تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای احیای نوزادان نارس جهت بیمارستان های سطح سوم صورت بگیرد،
- در سال اول اجرای برنامه مبنای تخصیص اعتبار برآورده اولیه زیر گروه اجرای کمیته و در سال بعد مبنای تخصیص اعتبار نیازسنجی و گزارش های کمیته های بیمارستانی و دانشگاهی می باشد.
- برای تامین اعتبارات مورد نیاز به طور صحیح بایستی مراتب به واحدهای زیربط جهت گنجاندن ردیف مربوطه در بودجه هماهنگ شود و درخواست تخصیص تنظیم و دستور هزینه کرد اعتبارات مورد نیاز و پس از تخصیص به منظور تهیه وسایل و تجهیزات اعتبارات در سطح کمیته های دانشگاهی ابلاغ شود.
- در سال نخست اجرای برنامه، توزیع وسایل و تجهیزات / اعتبارات مربوطه منوط به ارایه لیست نیازها از سوی کمیته های دانشگاهی است. از سال های بعدی، مبنای برآورده اولیه ایست که بر اساس گزارش سالیانه کمیته های دانشگاهی صورت می گیرد. با توجه به فشردگی های اجرایی برنامه در سال نخست، لیست مذکور پس از برآورده اولیه بودجه توسط کمیته کشوری، بوسیله کمیته های دانشگاهی تنظیم خواهد شد. لذا ممکن است بودجه پیش بینی شده در سال اول پاسخگوی تمامی نیازها نباشد. این میزان کسری، عملا در سال بعد جبران می شود. به عبارتی هدف از تنظیم لیست مذکور، اجتناب از تخصیص بودجه مازاد بر نیاز واحدهای درمانی است.

### پژوهش در احیاء نوزاد

- از دیگر وظایف کمیته کشوری برآورده بودجه ای است که سالیانه توسط این کمیته صرف فعالیت های پژوهشی می شود. چنان که در قسمت های بعدی اشاره خواهد شد، تلاش می شود که هزینه های فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها عمدتا از طریق اعتبارات موجود در سیستم تامین شود. به علاوه کمیته کشوری احیای نوزادان صرفا

- مجاز است که مطالعات کاربردی را هدایت کرده یا سفارش دهد. مطالعات بالینی و بنیادی در زمینه احیای نوزادان باید در سطح کمیته های دانشگاهی طراحی و اجرا شود. به عبارتی بودجه پژوهشی کمیته کشوری عمدها صرف مطالعاتی می شود که نتایج آنها در تصمیم گیری های مدیریتی برای اجرای برنامه احیای نوزادان کاربرد دارد.
- بخشی از این بودجه هم چنانکه در بخش پژوهش توضیح داده می شود، به مصرف جایزه پژوهشی سال – به عنوان یک مکانیسم تشویقی و حمایتی فرایند پژوهش - خواهد رسید. بنابراین بایستی برای اختصاص اعتبارات مورد نیاز هماهنگی با واحد های مربوطه جهت پیش بینی و تخصیص ردیف در بودجه سالیانه کمیته صورت گیرد و اعتبارات هزینه شود.
  - کمیته کشوری از یک سو هدایت کننده یا مجری مستقیم برخی فعالیت های پژوهشی است. از سوی دیگر موظف است فعالیت های پژوهشی صورت گرفته در سطح کشور را نیز مدیریت و حمایت کند. به علاوه باید فرایند های مشخصی را اجرا کند تا بتوان فعالیت های پژوهشی صورت گرفته را در جهت مورد نیاز هدایت نماید. مدیریت پژوهش ها توسعه کمیته کشوری شامل مراحل زیر می باشد
  - تعیین اولویت های پژوهشی
  - اعلام و ابلاغ اولویت های پژوهشی به کمیته های احیا دانشگاهی یا دبیرخانه تحقیقات کاربردی وزارت بهداشت و درمان، فراغوان عمومی و سفارش مستقیم
  - طراحی و اجرا در حوزه کمیته های دانشگاهی با طراحی و اجرا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش دولتی و غیر دولتی
  - ثبت و پایش در قالب بازخورد به مجری طرح پژوهشی و گزارش دوره ای
  - بهره برداری از نتایج به صورت اصلاح فرایندهای جاری، تعریف فرایندهای جدید و تعریف اولویت های پژوهشی

### فرایند اداری طرحهای پژوهشی سفارشی

- چنانکه قبلاً نیز اشاره شد، کمیته کشوری صرفاً مجاز است به سفارش و اجرای طرح هایی اقدام کند که نتایج آن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مدیریتی عملیات احیا و فرایند های پشتیبان آن بکار آیند. تحقیقات بالینی در زمینه احیای نوزادان در سطح کمیته های دانشگاهی (و به تبع آن بیمارستانی) صورت می گیرد. طرح های پژوهشی سفارش داده شده مراحل اداری را طی می کنند. که شامل:
- توجیه و توافق در مورد اهداف، روش اجرا، و نتایج مورد انتظار و نحوه گزارش دهی و توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت ها
- عقد قرارداد با مجری توسط معاونت پژوهشی دانشگاه مورد پژوهش صورت می گیرد.
- بدیهی است که طرح های مرتبط با احیای نوزادان که در چارچوب طرح های دبیرخانه تحقیقات کاربردی وزارت بهداشت و درمان اجرا شوند، از ساز و کار اجرایی آن دبیرخانه تبعیت می کنند.

### پشتیبانی مالی پژوهش

- اما برای حمایت از طرح های پژوهشی که در حوزه کمیته های بیمارستانی و دانشگاهی انجام می شود، فرایندی با عنوان اعطای جایزه پژوهشی سال تعریف می گردد. با توجه به اینکه مقرر شده است پروپوزال و گزارش نهایی

تمام طرح های پژوهشی مرتبط با احیا نوزادان به کمیته کشوری ارسال شود، این کمیته می تواند جهت انتخاب و اعطای جایزه پژوهشی با طی مراحل زیر اقدام نماید.

- تعیین جایزه پژوهشی سال که با در نظر گرفتن مبلغ جایزه از محل اعتبارات کمیته کشوری احیای نوزاد و تعیین راهکارهای پرداخت جایزه با همکاری واحدهای حقوقی و مالی
- انتخاب پژوهش های برگزیده با معیارها زیر توسط کمیته کشوری است انجام می شود
  - ۱ - انطباق با اولویت های پژوهشی اعلام شده
  - ۲ - گستردگی طراحی و قابلیت بالای تعمیم نتایج
  - ۳ - مدیریت بهینه فرایندها و زمان
  - ۴ - چاپ نتایج در مجلات معتبر (فهرست شده مدلاین)
  - ۵ - به سفارش کمیته کشوری اجرا شده باشد
- اعطای جایزه با ابلاغ به منتخب و یا منتخبین همچنین ابلاغ مراتب به واحدهای حقوقی و مالی

### مستند سازی

- منظور از مستند سازی ثبت کمیت و کیفیت اجزای یک فرایند یا موارد مرتبط با آن است تا بتوان از نتیجه آن برای پایش و ارزشیابی فرایند، انجام مطالعات تحقیقاتی، ایجاد پایگاه های داده و برخی فرایندهای جانبی مانند برقراری نظام دریافت و پرداخت، تخصیص بودجه و امکانات و غیره، استفاده نمود. مستند سازی هم برای فرایند اصلی (عملیات احیا) و هم برای فرایندهای پشتیبان صورت می گیرد. مسؤولیت اصلی مستند سازی عملیات احیا با کمیته های بیمارستانی است. مراحل کلی را که برای برقراری نظام مستند سازی در برنامه احیای نوزادان و فرایندهای مرتبط، توسط کمیته کشوری اجرا می شود.

#### مراحل کلی فرایند مستند سازی شامل موارد زیر است:

- استخراج شاخص های مورد نظر برای مستند سازی در فرایند عملیات احیای نوزاد و فرایندهای پشتیبان
- طراحی قالب یکسان برای مستند سازی فرایند احیا و فرایندهای پشتیبان آن
- ابلاغ قالب ها و دسترالعمل های مربوطه به کمیته های دانشگاهی و متولیان مستندسازی در کمیته کشوری
- الزام واحدهای تابعه به مستند سازی و ارسال گزارش های مربوطه
- استفاده از نتایج در بازبینی شاخص ها و اصلاح فرمها، اصلاح فرایندهای موجود و تعریف فرایندهای جدید

## کمته احیاء نوزاد دانشگاهی

کمیته دانشگاهی مجموعه ایست که از پرسنل هر دانشگاه، به منظور اجرا و / یا نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و پیاده سازی استانداردهای مربوط به احیای نوزادان در حوزه تابعه آن دانشگاه تشکیل می شود.

### جایگاه سازمانی

۱. در دانشگاه های علوم پزشکی زیر نظر رئیس / معاون درمان دانشگاه تشکیل می شود.
۲. این کمیته زیر مجموعه کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد دانشگاه مربوطه است.
- از نظر اجرایی، کمیته دانشگاهی احیای نوزادان از گروه کودکان و نوزادان و نیز گروه اعتباربخشی و نظارت بر درمان مستقل است اما با ایشان همکاری دارد.
- گروه های فوق در فعالیت های اجرایی مربوط به احیای نوزادان، مطابق نظر کمیته عمل می کند.
۳. معاونین درمان و بهداشتی دانشگاه موظف به همکاری با دبیر و اعضاء جهت انجام مسؤولیت های کمیته احیا می باشند

### اعضا

۱. هر کمیته مرکب از دبیر، کارشناسان و نیروی اجرایی(منشی کمیته) است.
۲. دبیر کمیته یک نفر فوق تخصص نوزادان یا در صورت عدم دسترسی به فوق تخصص، یک نفر متخصص کودکان است که به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی/درمانی کودکان / نوزادان دانشگاه، با تایید معاونین بهداشتی و درمان، توسط رئیس دانشگاه منصوب می شود.
۳. اعضای کمیته عبارتند از: یک نفر فوق تخصص نوزادان یا متخصص اطفال (به جز دبیر)، یک نفر متخصص بیهوشی، یک نفر متخصص زنان و مامایی (ترجیحاً پریناتالولژیست)، یک نفر مربی مامایی و یک نفر مربی پرستاری که همگی دارای مدرک "مربي" احیای نوزادان باشند، به علاوه یک نفر از معاونت پشتیبانی دانشگاه.
۴. افراد یاد شده به پیشنهاد روسای گروههای آموزشی/درمانی مربوطه و معاون پشتیبانی دانشگاه، به عنوان نماینده تام الاختیار ایشان، و با تایید معاونان بهداشتی و درمانی، توسط رئیس دانشگاه منصوب می شوند.
۵. در دانشگاههایی که گروه آموزشی مامایی یا پرستاری ندارند، پرستاران یا ماماهای عضو کمیته، به پیشنهاد کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، با تایید معاونین بهداشتی و درمان، توسط رئیس دانشگاه منصوب می شود
۶. هر کمیته حداقل دارای یک نیروی اجرایی(منشی کمیته) است که مسؤول امور دفتری کمیته می باشد.
۷. انتصاب نیروهای اجرایی کمیته ها بر اساس دستورالعمل های اداری هر دانشگاه علوم پزشکی است.
۸. دوره مسؤولیت کمیته ها دو ساله است.

### ساعت کاری

۱. روزها و ساعت های مذکور جز روزها و ساعت کاری هر فرد محسوب شده و کسر کردن از مرخصی یا زمان های غیر موظف فرد مجاز نمی باشد.
۲. هر ۴ ساعت کار کمیته، برای اعضاء هیئت علمی معادل ۲ واحد فعالیت آموزشی و برای اعضاء غیر عضو هیئت علمی معادل ۱۰ ساعت اضافه کاری محسوب می شود.

## وظایف

۱. ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با احیای نوزادان به واحدهای تابعه دانشگاه. منظور از واحدهای تابعه، بیمارستان های دارای بخش زایمان و زایشگاه های تحت پوشش هر دانشگاه است.
۲. نظارت، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با احیای نوزادان در واحدهای تابعه.
۳. تنظیم دستورالعمل های اجرایی اختصاصی برای حوزه تابعه
۴. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی / بازآموزی احیای نوزادان برای احیاکنندگان و مریبان و صدور گواهی مربوطه بر اساس دستورالعمل ها و کوریکولوم آموزشی کشوری
۵. تعیین میزان و نظارت بر نحوه تخصیص، توزیع و صرف اعتبارات مورد نیاز برای احیای نوزادان در واحدهای تابعه
۶. تعیین نیاز پرسنلی و تامین (یا ارجاع به واحدهای ذیربسط برای تامین) و توزیع پرسنل مورد نیاز برای احیای نوزادان در واحدهای تابعه
۷. انجام نیاز سنجی ها، تعریف، اجرا و نظارت بر انجام پژوهش های مرتبط با احیای نوزادان در واحدهای تابعه.
۸. استخراج شاخص ها و آماره ها، جمع بندی، تهیه و ارسال گزارش مربوطه

## منابع پرسنلی

- در کمیته های دانشگاهی نیز لازم است تا نخست از وضعیت موجودنیروی انسانی، برآورده دقیقی به عمل آید. سپس جهت تامین پرسنل مورد نیاز از طریق استخدام نیروی جدید یا آموزش نیروهای موجود، اقدام شود.
- در تامین نیروی جدید هرچا که ممکن باشد با هماهنگی واحدهای ذیربسط در دانشگاه، نیاز واحدها به نیروهای رسمی، پیمانی یا طرحی مرتفع می گردد. در سایر موارد مراتب به کمیته کشوری ارجاع می شود تا ردیف یا مجوز لازم برای استخدام و جذب نیروها تامین شود.

## تامین منابع مالی و تجهیزاتی

- کمیته دانشگاهی موظف است نیازهای مالی و تجهیزاتی حوزه تحت پوشش خود را برآورده کرده، جهت رفع آن اقدام نماید و در موارد لازم مراتب را جهت اطلاع و اقدام کمیته کشوری گزارش نماید. علاوه بر این مواردی مانند پرداخت های صورت گرفته به اعضای کمیته دانشگاهی و مدیریت منابع پژوهشی نیز در این حیطه قرار می گیرند.
- اقدامات که معمولاً بایستی کمیته دانشگاهی در راستای تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها انجام دهد شامل موارد زیر می باشد:

- تعیین نیاز بیمارستان های تابعه به امکانات و تجهیزات با روش مشاهده مستقیم، مقایسه تجهیزات موجود بیمارستانها با شاخص ها و استانداردهای تعیین شده و استفاده از نتایج پایش و ارزشیابی ها
- منبع تامین نیازهای بیمارستان ها از محل اعتبارات تخصیص یافته به کمیته دانشگاهی و یا از طریق خرید مستقیم تجهیزات توسط کمیته کشوری است.
- اعلام مراتب نیازهایی که طبق هماهنگی از طریق کمیته کشوری تامین می شود به کمیته کشوری و سایر موارد با تنظیم درخواست خرید لوازم و تجهیزات توسط دانشگاه
- هماهنگی با واحد های ذیربسط در دانشگاه برای تامین اعتبار خرید و توزیع وسایل و تجهیزات مورد نیاز و تحویل و توزیع لوازم و تجهیزات خریداری شده

○ نظارت بر نحوه به کارگیری و نگهداری تجهیزات در بیمارستانهای تابعه

### مستند سازی

فرایند مستند سازی در سطح کمیته های دانشگاهی، عمدتاً شامل دو بخش است، مستند سازی که از فعالیت های کمیته دانشگاهی صورت می گیرد و مستند سازی فعالیت های حوزه تابعه.

مستندسازی فعالیت کمیته دانشگاهی احیا نوزاد شامل ۱- دریافت شاخص ها و دستورالعمل های کشوری ۲- انجام مستند سازی ۳- تهیه گزارش های لازم و تحلیل آنها ۴- ارسال گزارش نهایی به کمیته کشوری

مستندسازی فعالیت های کمیته دانشگاهی احیا در حوزه های تابعه دانشگاه

- ۱ - دریافت شاخص ها و دستورالعمل مربوطه از کمیته دانشگاهی
- ۲ - ابلاغ دستورالعملها و شاخص های مورد انتظار به کمیته های بیمارستانی
- ۳ - پایش و ارزشیابی فرایندهای مستندسازی
- ۴ - دریافت گزارش ها و تحلیل آن و سپس ارسال آن به کمیته کشوری

## کمیته احیاء نوزاد بیمارستانی

کمیته بیمارستانی مجموعه ایست که از پرسنل هر بیمارستان، به منظور اجرا و / یا نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و پیاده سازی استانداردهای مربوط به احیاء نوزادان در آن بیمارستان تشکیل می شود. در این قسمت به معرفی مبسوط این کمیته ها می پردازیم.

کمیته احیاء نوزاد بیمارستانی

### جایگاه سازمانی

- در هر بیمارستان دارای بخش یا اتاق عمل زنان و زایمان و تمامی زایشگاه ها، تشکیل می شود.
- با گروه کودکان و نوزادان، زنان و مامایی و بیهوشی در بیمارستان مربوطه همکاری دارد.
- از نظر اجرایی، کمیته بیمارستانی احیاء نوزادان از گروه های مذکور مستقل است.
- گروه های یاد شده در فعالیت های اجرایی مربوط به احیاء نوزادان، مطابق نظر این کمیته عمل می کنند.
- کلیه مسئولین و دست اندر کاران امور مختلف در بیمارستان در سطوح مختلف علی الخصوص روسای بیمارستان ها و بخش ها موظف به همکاری با دبیر و اعضا جهت انجام مسؤولیت های کمیته احیاء می باشند

### اعضا

۱. هر کمیته مرکب از دبیر و کارشناسان است.
۲. دبیر هر کمیته، بسته به سطح ارایه خدمات بیمارستانی، یک نفر فوق تخصص نوزادان یا متخصص کودکان می باشد که توسط رئیس گروه مربوطه معرفی می شود.
۳. دبیر، علاوه بر مشارکت در وظایف تعریف شده برای کمیته، مسؤول تقسیم وظایف، هماهنگی و پاسخگویی به کمیته دانشگاهی می باشد.
۴. کارشناسان کمیته عبارتند از یک متخصص بیهوشی، یک نفر پرستار شاغل در بخش / اتاق نوزادان و یک ماما از بخش زایمان که همگی دارای مدرک "ارایه کننده" یا "مربی" احیاء نوزادان هستند و به اضافه یک نفر از پرسنل بخش اداری- مالی بیمارستان. افراد یاد شده به ترتیب با نظر مدیر گروه بیهوشی، متrown و مدیر بیمارستان، و به عنوان نماینده ایشان با اختیارات تام اجرایی به کمیته معرفی می شوند.
۵. بسته به سطح ارایه خدمات در بیمارستان، ممکن است پژوهشک عمومی مسؤول نوزادان عضو کمیته بیمارستانی باشد.
۶. در بیمارستان های با بیش از ۲۰۰۰ زایمان در سال، دو نفر دیگر را شامل متخصص زنان (ترجیحاً پریناتالوژیست) و سوپر وایزر آموزشی بیمارستان، به اعضای کمیته بیمارستانی اضافه می شوند.
۷. در انتخاب کارشناسان، افراد دارای گواهی "مربی" بر افراد دارای گواهی "ارایه کننده" ارجح می باشد.
۸. اعضای کمیته، همگی با حکم رئیس بیمارستان منصوب می شوند و نظر ایشان در مورد مسائل مرتبط با احیاء در حکم دستور رئیس بیمارستان در این زمینه می باشد.
۹. رئیس بیمارستان، یک نفر از اعضای کمیته را، به عنوان نماینده تام الاختیار خود در کمیته منصوب می نماید.
۱۰. دوره مسؤولیت کمیته ها یک ساله است.

### ساعت کاری

۱. دبیر و کارشناسان کمیته، در زمان های مشخصی در هفته و به صورت منظم، انحصرارا موظف به رسیدگی به امور مربوط به کمیته هستند.

۲. در زمان های مقرر برای انجام امور کمیته احیا، دبیر و کارشناسان از انجام وظایف بیمارستان معاف می باشند.
۳. ساعت های مذکور جز ساعات کاری هر فرد محسوب شده و کسر کردن از مرخصی یا زمان های غیر موظف فرد مجاز نمی باشد.
۴. کمیته بیمارستانی در طول ماه موظف به برگزاری حداقل دو جلسه می باشد.


## وظایف

۱. اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با احیای نوزادان در بیمارستان
۲. پایش و ارزشیابی اجرای برنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با احیای نوزادان در بیمارستان
- اساس کار چک لیست های ارایه شده توسط کمیته های منطقه ای و کشوری باشد. در صورت لزوم بر اساس نیازهای بیمارستانی ابزارهای پایشی فراتر از ابزارهای پایش تعیین شده، طراحی و اطلاعات بدست آمده از اجرای آن به سطوح بالاتر ارسال می گردد
۳. تنظیم دستورالعمل های اجرایی اختصاصی برای بیمارستان با در نظر گرفتن برنامه ها و استانداردهای کشوری و منطقه ای واستفاده از نتایج پایش برنامه در بیمارستان
۴. ساماندهی آموزش
- شناسایی و تهیه فهرست روزآمد از پرسنل دارای مدرک "ارایه کننده" یا "مربي" احیای نوزادان در سطوح مختلف تخصصی (پرستاران، ماما ها، پزشکان) و تعیین کمبودهای احتمالی در زمینه پرسنل آموزش دیده برنامه ریزی و حمایت برای شرکت پرسنل در دوره های آموزشی و باز آموزی احیای نوزادان
- شرکت پرسنل در برنامه های آموزشی / بازآموزی با هماهنگی مسؤولین بخش ها، آموزش یا روسای گروهها صورت می گیرد.
- تعیین نیازهای آموزشی بیمارستان از قبیل مدل های آموزشی و منابع اطلاعاتی و برنامه ریزی بر اساس الگوی برنامه های نیازمنجی کشوری و پیگیری برای تامین آنها بر اساس دستورالعمل ها و کوریکولوم آموزشی ارایه دهنده کان و مربيان احیا در کشور
- برگزاری دوره های آموزشی داخل بیمارستانی برای پرسنل دخیل در امر احیا بر اساس دستورالعمل ها و کوریکولوم آموزشی
۵. ساماندهی وسایل، تجهیزات و داروهای
  - تهیه لیست روزآمد از تجهیزات و وسایل موجود در مرکز و شناسایی کمبودهای احتمالی بر اساس سطح ارایه خدمات بیمارستان و جداول استاندارد لوازم و تجهیزات
  - برنامه ریزی جهت تهیه وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز و نظارت بر تهیه و توزیع موارد یادشده
  - تدوین و/یا ابلاغ دستورالعمل های مرتبط با نگهداری وسایل و تجهیزات با لحاظ کردن حداقل های مورد اشاره در بسته خدمتی احیای نوزادان
  - آموزش و توانمندسازی پرسنل در جهت حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات
  - ارزشیابی و پایش بخش های تابعه از نظر اجرای دستورالعمل های مذکور
۶. ساماندهی امور پرسنلی و پرداخت کارانه ها
  - نظارت بر اجرای استانداردهای پرسنلی در زمینه تنظیم برنامه کاری

- نظارت بر اجرای دستورالعمل های کشوری/ دانشگاهی در زمینه پرداخت کارانه
  - تطبیق لیست کارانه ها با عملکرد پرسنل، تایید و ارسال لیست مذکور به امور مالی، جهت پرداخت
  - تعیین کمبودهای پرسنل مورد نیاز برای انجام احیا در مراحل مختلف احیا و مریبان بیمارستانی و ارسال گزارش مربوطه برای کمیته دانشگاهی.
  - تایید صلاحیت و حمایت از ارتقای شغلی پرسنل
۷. دریافت هزینه ها ای احیا از منابع حمایت کننده
- تایید فرم های اجرای عملیات احیای نوزادان، جهت دریافت هزینه ها از بیمه پیگیری و نظارت بر تخصیص سهم برنامه های احیای نوزادان از مبالغ دریافت شده از بیمه (درآمد بیمارستان از عملیات احیا)
۸. انجام نیاز سنجی ها، تعریف، اجرا، حمایت و نظارت بر انجام پژوهش ها ای مرتبط با احیای نوزادان در واحد تابعه.
- استخراج شاخص ها و آماره ها، جمع بندی، تهیه و ارسال گزارش مربوطه به کمیته دانشگاهی احیای نوزادان

فصل ششم


پايش و ارزشياري



## پایش و ارزشیابی برنامه

پایش به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که با هدف صیانت از استانداردهای منابع و روش انجام فعالیتهای برنامه انجام می پذیرد. مهمترین وظیفه مجریان، صیانت از استانداردهای برنامه است. از روشهای مختلف پایش به نظارت سطوح ستادی بر سطوح محیطی (نظرات)<sup>۱</sup>، خودارزیابی<sup>۲</sup> مرور فعالیتها توسط همکاران و پایش مشارکتی<sup>۳</sup> می توان اشاره کرد. در این برنامه پایش در همه روش های آن کاربرد خواهد داشت. عموماً تمرکز پایش در یک برنامه بر فرایندهای پشتیبان و فرایندهای ارایه خدمت خواهد بود. به طور مثال عملکرد صحیح فرایندهای پشتیبان منجر به تحقق منابع و تجهیزات استاندارد در واحدهای ارایه دهنده احیاء نوزاد خواهد شد، که در نهایت این مساله در ارایه خدمت مناسب به نوزاد نیاز احیا بسیار تاثیر گذار خواهد بود. پس می توان فاصله گرفتن فرایندهای ارایه خدمت و همچنین پیامدهای پیش بینی شده را از استاندارهای وضع شده برای آنها، به عملکرد نامناسب زمینه های پشتیبان نسبت داد.

### دیاگرام پایش و ارزشیابی بسته خدمتی احیاء نوزاد



<sup>۱</sup> Supervision <sup>۲</sup> peer review

<sup>۳</sup> Self-assessment <sup>۴</sup> participatated monitoring

یعنی اگر فرایندهای احیا (تشکیل تیم احیاء، حضور افراد تیم احیا به موقع، توانمند نبودن افراد تیم احیاء و...) منطبق بر استانداردها نباشد، احتمالاً فرایندهای پشتیبان (تامین منابع مالی، برنامه ریزی برای آموزش افراد تیم احیاء و...) به خوبی شکل نگرفته اند و یا منطبق بر استانداردهای تعیین شده نبوده اند. پس پایش فرایندهای پشتیبان به شکل غیر مستقیم از طریق پایش فرایندهای خدمت و یا از طریق پایش مستقیم و مستمر خود این فرایندها باید صورت پذیرد.

پس از اجرای هر برنامه بر اساس استانداردهای آن، سوال طراحان و مجریان برنامه آن است که برنامه چه دستاوردهای داشته است و تا چه اندازه اهداف مورد نظر از اجرای آن حاصل شده است، که برای یافتن پاسخ این سوال باید اقدام به ارزشیابی برنامه کرد.

ارزشیابی فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که با هدف تعیین دستاوردهای برنامه انجام شود. پس باید دستاوردهای برنامه احیاء را تعیین نمود و سپس به ارزشیابی دستاوردهای فعالیتهای فرایندهای خدمتی یا فرایнд کلی احیا نوزاد پرداخت.

در قیاس با پایش که اقدامی ناظر به فعالیت‌هاست، ارزشیابی به نتایج چشم می‌دوzd. بدیهی است که بدون روشن کردن تغییرات یا نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه، اندازه گیری آنها امکان پذیر نیست.

پس از تعیین دستاوردهای برنامه سوال مان این خواهد بود که آیا با توجه به منابع موجود و در دسترس بهترین دستاوردهای ممکن فراهم شده است یا خیر؟ این سوال را به این صورت نیز می‌توان بیان کرد که آیا استانداردهای جاری مناسب ترین استانداردهای ممکن هستند و این که از استانداردها را باید و یا می‌توان به منظور ارتقای برنامه تغییر داد. در حقیقت ما به این شیوه برنامه را مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. پس برای اینکه برنامه احیا نوزادان در مسیر بهبود مستمر قرار بگیرد باید اقدامات در حال انجام یا انجام گرفته را مورد تحلیل قرار داد.

### متدلوزی تحلیل برنامه

چنانچه داده‌های موجود بدست آمده از پایش و ارزشیابی برای ارزیابی این فرضیه‌ها کافی باشد، اقدام بعد به کارگیری نتایج بدست آمده برای بازنگری در طراحی برنامه و دست یابی به استانداردهای جدید است. در صورت کافی نبودن این داده‌ها باید با طراحی و اجرای مطالعات جدید داده‌های مورد نیاز را برای ارزیابی فرضیه‌ها جمع آوری کرد.

در کنار هم قرار گرفتن نتایج پایش و ارزشیابی انجام گرفته در مقاطع مختلف زمانی در یک جمعیت یا در یک مقطع زمانی در جمعیت‌های مختلف شیوه اصلی تحلیل است. در نتیجه فرضیه‌هایی در مورد عوامل موثر بر عملکرد برنامه شکل خواهد گرفت.

هدف غایی پایش و ارزشیابی یک برنامه در حقیقت تلاش درجهت بهبود مستمر و به روز کردن آن می‌باشد. ضمن این که ارایه و نمایش مناسب برنامه به ذینفعان<sup>۳</sup> منجر به تامین حمایت مناسب برنامه از سوی آنها و در نتیجه اجرای احیاء نوزاد فرایند احیاء نوزاد خواهد شد.

## اهداف پایش

همان گونه که قبلاً به آن اشاره شد، پایش صیانت از استانداردهاست. اگر برنامه از یک طراحی مناسب برخوردار باشد، رعایت استانداردها منجر به تحقق پیامد مورد نظر از اجرای برنامه خواهد شد. لذا با پایش فعالیت می‌توان دست یابی به اهداف برنامه را تضمین کرد. به علاوه به کمک پایش می‌توان علت دست نیافتن به اهداف برنامه را نیز شناسایی کرد. در حقیقت نمی‌توان بدون آنکه بدانیم که آیا فعالیت‌های هر فرایند احیای نوزاد براساس استاندارد مشخص شده برای آنها اجرا شده‌اند، مشخص کرد که دست نیافتن به اهداف ناشی از ضعف در طراحی است یا ریشه در اجرای نامناسب این برنامه دارد.

پایش به منزله نگاه دقیقی است که بدون وقفه در حال مرور تمامی فعالیت‌ها در سازمان است. در یک برنامه جاری فعالیت‌ها به صورت روزمره و مداوم انجام می‌گیرد و لذا پایش آنها نیز باید روزمره و مداوم باشد. به کمک پایش اولاً باید از انحراف از استانداردها ممانعت به عمل آورد و ثانیاً کوتاه‌ترین زمان ممکن انحرافات به وقوع پیوسته را اصلاح کرد.

## انجام پایش وظیفه چه کسی است؟

انجام پایش اولاً وظیفه کسی است که یک فعالیت را انجام می‌دهد و بعد از او به عهده ناظری است که به دلیل تجربه و مهارت بیشتر وظایف نظارت بر انجام فعالیتها، هدایت و انجام آن را به عهده گرفته است.

انجام پایش توسط یک ناظر خارجی (External evaluation) با توجه به نکات زیر دارای اهمیت است:

- انجام دهنده فعالیت ممکن است از نقاط ضعف خود آگاه نباشد و لذا وجود یک ناظر خارجی برای نقاط ضعف او الزامی است. (مفهوم از ناظر خارجی فردی غیر انجام دهنده فعالیت است و الزاماً به معنای فردی خارج از سازمان نیست)
- آموزش مداوم شرط لازم برای حفظ و اعتلای مهارت کارکنان است. موثرترین آموزش در عمل و حین انجام وظیفه می‌تواند رخ دهد. لذا انجام پایش و آموزش کارکنان اولاً در حین پایش و ثانیاً براساس جمع‌بندی نتایج آن توسط یک ناظر خارجی ضروری است.
- آنچه در واحدهای بیمارستانی (مثل بخش زایمان، نوزادان، NICU) می‌گذرد نتیجه فعالیتهای پشتیبانی واحدهای ستادی و مدیریت کمیته‌های بیمارستانی و کمیته‌های دانشگاهی و حتی ستاد وزارت‌تخانه می‌باشد. لذا واحدهای ستادی به منظور کنترل فعالیتهای خود ناگزیر از پایش محصول آن، یا عملکرد واحدهای محیطی هستند.

## چه استانداردهایی باید پایش شوند؟

اگر فرایندهای پشتیبان (مدیریت منابع مالی و تجهیزات و امکانات، مدیریت پژوهش و منابع مربوط، مدیریت آموزش و برنامه ریزی مناسب برای آن و مدیریت منابع اطلاعاتی) و فرایندهای خدمت (سرویس‌های لازم و استانداردی که به یک نوزاد نیازمند احیا داده می‌شود) منطبق بر استانداردهای مشخص شده برای آنها باشند، برونداد فرایند خدمت به عنوان مقدماتی ترین پیامد احیای نوزاد نیز منطبق بر استانداردهای تعیین شده تحقق خواهد یافت.

با توجه به این که پایش خود نیازمند صرف منابع سازمان، خصوصاً وقت پرسنل است، باید با مشخص کردن استانداردهای کلیدی مانع از صرف منابع برای پایش استانداردهایی شد که از تأثیر قابل توجهی برای تحقق استانداردهای اصلی برونداد برخوردار نیستند. چنان‌چه بتوان استانداردهای

برون داد را مورد پایش مداوم قرار داد، علاوه بر آن که اولین پیامد مورد نظر بررسی می شود، امکان قضاوت در مورد تحقیق سایر استانداردهای دخیل درایجاد برون داد نیز فراهم می گردد.

### فرایندهای پشتیبان

همیشه ارجح است به صورت مستقیم استاندارد برون داد را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفت ولی همیشه امکان کنترل استانداردهای برونداد وجود ندارد، مثلاً ممکن است لازم باشد که برای ارزیابی فرایند زایمان و عملیات احیاء موفق نوزاد فشار اکسیژن و PH خون شریانی را اندازه بگیریم ولی امکان آن در هر زمان محدود نباشد، که یک راه این است که استاندارد جانشین در نظر گرفت مثلاً نمره آپکار دقیقه ۵ به عنوان استانداردهای جایگزین یاد کرد و این ها را اندازه گرفت و یا روش برخورد دیگر با این مساله آن است که با برداشتن یک گام به عقب استانداردهای فرایندهای خدمتی را مورد ارزیابی قرار دهیم که مستقیماً به تحقق این استانداردهای احیای نوزاد (برونداد) خواهد انجامید. استانداردهای برون داد را استانداردهای اصلی و استانداردهای فرایندهای خدمت و پشتیبان و منابع ورودی به سازمان را که به جای استانداردهای برونداد بررسی می شوند را استانداردهای جایگزین می نامیم.

در این جا استانداردهای اصلی عبارتند از آنچه که در پیامد احیای استاندارد نوزاد در شرایط ایده آل اتفاق می افتد و استانداردهای جایگزین عبارتند از بهترین پیامد مقطعی هر یک از فرایندهای اصلی، (به طور مثال فشردن قفسه سینه به شکل مناسب) و یا فرایندهای پشتیبان استاندارد در همه حیطه ها، به شکلی که هر یک از فرایندهای اصلی به شکل مناسب و استاندارد اجرا شوند.

بدین ترتیب با مرور استانداردهای برون داد یا اصلی آن بخش از آنها را که امکان سنجش مداومشان وجود دارد را مشخص می کنیم، سپس در مورد استانداردهایی که نمی توان آنها را مستقیماً مورد سنجش قرار داد، با بازگشت به عقب به بررسی زمینه های خدمت پشتیبان و همچنین منابعی که از خارج از سازمان تأمین می شود، اقدام به انتخاب استانداردهای جایگزین خواهیم کرد.

شرایطی را که استانداردهای جایگزین باید دارا باشند عبارتند از:

- اولاً باید ارتباط موثر با استاندارد اصلی داشته باشند.
- ثانیاً بررسی تحقق یا عدم تحقق آنها امکان پذیر باشد.
- استاندارد اصلی ↔ استاندارد جایگزین

در صورت تحقق استانداردهای جایگزین احتمال تحقق استاندارد اصلی (احیای موفق نوزاد) بالاست (ارزش اخباری مثبت) و در صورت تتحقق نیافتن استانداردهای جایگزین (نداشتن تیم احیاء، نداشتن ترتیب و توالي زمانی مناسب زمینه احیاء نداشتن پشتیبانی سازمانی مناسب) احتمال تتحقق نیافتن استانداردهای اصلی با علامت (ارزش اخباری منفی) مشخص خواهد شد.

معمولًا تحقق استاندارد کلیدی برونداد (احیای موفق نوزاد) مستلزم تحقق مجموعه ای از استانداردها در فرایندهای خدمت و پشتیبان است.

در نتیجه تحقق نیافتن هر یک از این استانداردها استاندارد اصلی در برونداد محقق نخواهد شد. (البته در مواردی که استانداردها به درستی تعریف نشده باشند و یا غیر از مسیرهای در نظر گرفته شده برای رسیدن به پیامد مورد نظر مسیرهای دیگر نیز وجود داشته باشند که در الگوی اولیه پیش بینی نشده باشند، ممکن است پیامد مورد نظر تحقق یابد)

## ارتباط بین استانداردهای اصلی و جایگزین

به بیان دیگر ارزش اخباری منفی هر یک از استانداردهای جایگزین از ارزش اخباری مثبت آنها بیشتر است. به منظور بالا بردن ارزش اخباری مثبت تحقق استانداردهای جایگزینی، باید تحقق مجموعه ای از آنها را به عنوان تست پیش بینی کننده تحقق استاندارد اصلی به کار گرفت. به طور مثال به کارگیری پرسنل آموزش دیده به تنها یی موفق بودن احیا را تضمین نمی کند ولی انجام یافتن احیاء نوزاد توسط پرسنل احیاء که آموزش کافی ندیده اند احتمال عدم موفقیت را افزایش خواهد داد.

### چه استانداردهایی باید توسط انجام دهنده فعالیت(تیم مسئول احیاء) پایش شود؟

الف: استانداردهایی که نیاز به کنترل مداوم و دقیق دارد

ب: آنهایی که نیازمند کنترل مداوم و دقیق نیستند

در مورد اول روش مناسب پایش استفاده از کنترل آماری فرایندها است. در این روش استانداردهای برونداد جه کمی چه کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شیوه جمع آوری مداوم با حجم کم است. پس از اخذ اطلاع ها میانگین عددی آنها به صورت نمودارهای روند ثبت می گردد. پس از ۲۵ تا ۳۰ بار نمونه گیری و ثبت، میانگین میانگین ها محاسبه شده و بر اساس سه خطای معیار بیشتر و کمتر از میانگین خطوط کنترل فوقانی و تحتانی رسم می گردد. تحلیل نتایج براساس مقایسه وضعیت نقطه های ثبت شده با خطوط کنترل و مقایسه محدوده کنترل با محدوده استاندارد انجام می شود. در عین حال محدوده نوسان نتیجه فرایند با توجه به دامنه منحنی توزیع نرمال بدست آمده مورد تحلیل قرار می گیرد. چنان چه نتایج ثبت وضعیت استانداردهای نتیجه یا برونداد مطلوب باشد کیفیت فرایند مورد تایید است. در مورد دوم ابزار پایش بستگی به نوع استاندارد دارد ولی نکته مهم آن است که اولاً باید تناوب انجام پایش مشخص شود و فرم های مناسب برای ثبت نتایج آن طراحی و آماده گردد، ثانیاً دستورالعمل شیوه اقدام در صورت مشاهده انحراف از استاندارد باید تدوین شود.

### چه استانداردهایی باید توسط ناظر خارجی پایش شود؟

ناظر خارجی باید تمام فعالیت هایی را که توسط انجام دهنده فعالیت انجام می گیرد را مورد پایش قرار دهد. این فعالیت ها پایش هایی را هم که باید توسط انجام دهنده فعالیت انجام شود را در بر می گیرد. به منظور انجام منظم و سیستماتیک پایش ناظر خارجی ضرورتاً باید از «چک لیست» استفاده کند.

با توجه به حجم فعالیت ها ممکن است چک لیست ها از حجم بالایی برخوردار باشد ولی این مساله به آن معنا نخواهد بود که در هر پایش باید تمامی فعالیت ها مورد بررسی قرار گیرد، بلکه باید به شکلی باشد که در کار روزمره انجام دهنده فعالیت اختلالی ایجاد نکند. انجام مستمر پایش همراه با برنامه و استفاده از چک لیست تدریجاً تمام فعالیت ها را پوشش خواهد داد. پایش در صورتی اثربخش خواهد بود که مختصراً مداوم انجام شود و در نهایت کلیه فعالیت ها را در برگیرد.

ناظر خارجی باید با طی مراحل زیر به انجام پایش بپردازد:

۱. بررسی گیرنده خدمت: این بررسی معمولاً پس از خروج گیرنده خدمت (نوزاد) از واحد ارایه خدمت (بخش زنان و زایمان، بخش ویژه مراقبت از نوزادان و...) صورت می گیرد. در اینجا چون گیرنده خدمت نوزاد می باشد. بهترین

مدل، بدست آوردن اطلاعات از فرد مسئول احیاء و یا سرپرست بخش مورد نظر می باشد. البته شاید اطلاعات بدست آمده از این طریق دچار سوگراibi شود بهتر است بر روی روش های دیگر تمرکز کرد. البته از طرف دیگر چون نمی توانیم حین عملیات احیا تضمین حضور پرسشگر را در داشته باشیم و از طرف دیگر با توجه به مطالب پیش گفته بهتر این است که تاکید به این کار نداشته باشیم و در حد امکان بهتر است که از روش های دیگر استفاده کنیم.

۲. کنترل اسناد: با توجه به آن که تمام فعالیت های انجام گرفته در واحد ارایه کننده خدمت باید ردپای مکتوبی از خود بر جای گذاشته باشند، ارزیابی اسناد می تواند میزان رعایت استانداردها را نشان دهد. این که اسناد در غیاب ناظر خارجی تولید می شوند، بر اهمیت آنها به عنوان شاهدی بر میزان رعایت استانداردها می افزاید. به علاوه اسناد از آن جهت که پدید آورنده اطلاعات جاری هستند از اهمیت ویژه ای برخوردارند به علاوه اینکه کیفیت آنها باید در جریان پایش مورد ارزیابی قرار گیرد. به کمک مقایسه اسناد با یکدیگر و تطبیق آنها با واقعیت می توان به برداشت روش از دقت، مهارت و تعهد ارایه کننده خدمت در تولید آنها دست یافت. از آنجا که ارایه کننده خدمت باید نتایج پایش هایی را که بر عهده اوست نیز لیست کند، از طریق کنترل اسناد می توان پایش ها را نیز پایش کرد.

۳. مشاهده ارایه کننده خدمت در حین ارایه خدمت: معمولاً حضور ناظر خارجی باعث می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمت در کامل ترین شکل ممکن دیده شود، لذا به کمک مشاهده می توان دریافت که او از چه توانایی هایی برخوردار است، ولی در غیاب ناظر خارجی نمی توان به قضاوت دقیقی در خصوص عملکرد وی دست یافت.

۴. پرسش و پاسخ و ایفای نقش: پایش گر (پرسش گر) چون امکان مشاهده ارایه کننده خدمت (تیم احیاء نوزاد) را در حین ارایه تمامی خدمات را ندارد، دانش و مهارت هر یک از این اعضا از طریق پرسش و پاسخ و یا ایفای نقش (Roll Playing) مورد ارزیابی قرار داد. یعنی فرد پایش کننده به عنوان «آزمون گر» عمل می کند. یعنی با یک چکلیست از میزان آگاهی آنها مطلع می شود. در کنترل منابع در این مرحله باید منابع موجود در هر گروه یا بخش که خدمت مورد نیاز به نوزاد نیازمند به احیا را ارایه می دهند نظر تطبیق استانداردهای تعیین شده برای آنها بررسی شوند. هر یک از مراحل که در بالا آمده است قابلیت ها و محدودیت هایی دارد و فقط از طریق اقدام به همه آنها می توان به برداشت روشی از عملکرد واحد مربوطه در پاییندی به استانداردها دست یافت. مثلاً اگر اسناد مربوط به احیاء نوزاد بررسی شود، این قسمت متاثر از حضور یک ناظر خارجی نخواهد بود. ولی نمی توان به کمک آن مهارت علمی ارایه کنندگان خدمت را دقیقاً مورد ارزیابی قرار داد. این محدودیت ایجاد شده را می توان با مشاهده عملکرد تیم احیاء در حین احیای یک نوزاد، پرسش و پاسخ و ایفای نقش جبران نمود. با توجه به اینکه در هر پایش نمی توان همه چیز را مورد بررسی قرار داد، راهی نخواهیم داشت که پایش را به شکل گزینشی در هر بار انجام دهیم. به منظور حفظ ارتباط اجزای مختلف پایش با یکدیگر، بهتر است در نوبت بررسی ها را بر روی یک برنامه خاصی متمرکز کرد. به این ترتیب یک نوبت پایش بدون صرف وقت زیاد تصویر روشی از وضعیت یک برنامه در چهارچوب احیای نوزاد بدست خواهد داد.

به خاطر داشته باشیم که پایش نباید بدون برنامه و به شکل کنترل تصادفی باشد، چون در این صورت از اثر بخشی پایش در جهت حفظ استانداردها خواهد کاست. اولین دستاوردهای پایش توسط ناظر خارجی شناخت نفاط ضعف عملکرد ارایه کننده خدمت است که باید از طریق آموزش اصلاح شود. همزمان با پایش، که ارایه کننده خدمت نیز به خوبی به نقاط ضعف خود واقف می شود، کاربردی ترین و اثربخش ترین آموزشها را می توان ارایه کرد، منوط بر آنکه آموزش گیرنده آمادگی دریافت پیام های آموزشی را داشته باشد.

مهم ترین عاملی که منجر به نامناسب شدن شرایط پاییں برای آموزش می شود، حاکم شدن جو بازسازی و مچ گیری بر این فرایند است. عملکرد نامناسب افرادی که برای پایش به واحدهای ارایه کننده خدمت مراجعه می کنند، به مرور زمان نقش

این عنصر بسیار مهم برای حفظ و ارتقای مهارت کارکنان را به یک عامل اضطراب آور تبدیل کرده است. صرفاً با بیان اینکه هدف ما از اجرای برنامه پایش مج گیری نیست، باعث کاهش اضطراب نخواهد بود، بلکه مشاهده عملکرد مناسب افراد پایش کننده به شکل مستمر است که به مرور زمان تصویر مناسب تری از این فعالیت در ذهن ارایه کنندگان خدمت ایجاد خواهد کرد.

### چگونگی ارایه گزارش نتایج پایش:

#### ۱- محاسبه درصد موارد رعایت نکردن یک استاندارد

برای مثال اگر در طی یک سال در یک شهرستان دارای بخش زایمان پرسنل مشارکت کننده تیم احیاء مجموعاً در ۲۰ نوبت از نظر مهارت احیا مورد پرسش و پاسخ قرار گیرند و در ۷ نوبت، از نظر پاسخ های ارایه شده ضعیف و یا در رده با مهارت پایین باشند، در این مثال در طی یکسال ۳۵ درصد افراد از نظر آگاهی کامل در مورد روند احیا در رده «ضعیف» بوده و در «فوریت آموزشی» قرار خواهند گرفت. با مقایسه این شاخص در طی سالهای مختلف می توان درباره بهتر شدن یا نشدن آگاهی تیم احیا در این شهرستان قضاوت نمود.

#### ۲- امتیازدهی

با توجه به آن که پایش براساس مجموعه ای از استانداردهای کلیدی انجام می شود می توان با در نظر گرفتن امتیاز برای هر استاندارد متناسب با اهمیت آن، در مجموع برای پایش در هر نوبت یا هر زمینه خاص یک امتیاز کلی محاسبه کرد. برای مثال می توان گفت که بخش NICU بیمارستان A در شهرستان C از برنامه پایش بسته خدمتی احیاء نوزادان در بازدید مورخ ۸۶/۹/۲ ۲۳۷ امتیاز کسب کرده است. شبیوه محاسبه این امتیاز به این شکل بوده است که در چک لیست پایش این برنامه در کنار هر سوال امتیاز آن مشخص و در پایان پایش از جمع امتیازهای سوالاتی که پاسخ مثبت دریافت کرده اند، کل امتیاز محاسبه شده است. میانگین امتیازات واحدهای خدمت دهنده نوزادان در بیمارستانهای یک دانشگاه می تواند شاخصی از استاندارد بودن خدمات به نوزادان در سطوح بیمارستانی آن دانشگاه باشد.

## چک لیست های پایش

مجموعه حاضر یک ابزار مناسب برای بررسی وضعیت موجود برنامه احیا نوزاد در سطح دانشگاههای کشور است مجموعه چک لیست های این مجموعه شامل دو قسمت است :

۱ - چک لیست های ستادی مربوط به حوزه معاونت درمان دانشگاه

۲ - چک لیستهای مربوط به بیمارستان ها (واحد محیطی)

چک لیست ها و پرسشنامه ها به بررسی فرایند های پشتیبان - فرایند خدمت احیا نوزاد - فرایند های حمایتی با استفاده از روشهای خود اریابی - مصاحبه و مشاهده می پردازد

### روش کار و نحوه انجام پایش :

پایش واحد های ستاد معاونت درمان توسط وزارت بهداشت:

مسئولیت انجام پایش در سطح معاونت درمان دانشگاه به عهده تیم پایش اداره سلامت نوزادان دفتر سلامت خانواده و جمعیت می باشد،

- این مهم هر سال یک بار با حضور کارشناس اداره یا تیم مستقل خارجی به انجام می رسد.
- قبل از انجام پایش اطلاعات کارگاه های احیاء ثبت شده در سامانه وزارت بهداشت، پایش بیمارستانی و خود ارزیابی ارسالی دانشگاه مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد.
- زمان پایش وزارت بهداشت با هماهنگی انجام شده و خواستگاهی اصلاحی دارد.
- وزارت بهداشت موظف است بعد از بازدید بازخورد مرتبط را تا حداقل یک ماه به دانشگاه ارسال نماید.

پایش واحد های بیمارستانی توسط معاونت درمان:

مسئولیت پایش برنامه احیا نوزاد در سطح بیمارستانهای تابعه دانشگاه (بیمارستان منتخب احیا ) به عهده کارشناس برنامه احیا نوزادان و به همراه تیم پایش که توسط کمیته دانشگاهی احیا معرفی خواهد شد می باشد.

- زمان انجام پایش هر شش ماه یکبار با استفاده از یک برنامه زمان بندی مشخص می باشد
- در ارزیابی و پایش عملیات احیا در بیمارستان ها ۱۰٪ مستندات نوزاد احیا شده مورد ارزیابی قرار می گیرند.
- این ارزیابی ها در هر ۶ ماه در هر بیمارستان واجد بخش زایمان و بخش مراقبت ویژه نوزادان صورت می گیرد.
- هر ۶ ماه معاونت درمان موظف است نتایج پایش را به وزارت بهداشت ارسال نماید.

بهنام خدا



## فرم جمع‌آوری اطلاعات پایش برنامه احیای نوزادان"

**Monitoring checklist of  
“Neonatal Resuscitation Program (NRP)”**

نام و نام خانوادگی مسؤول پایش: ..... تاریخ تکمیل فرم: ..... / ..... / .....

محل بازدید:

..... استان: ■

..... شهرستان: ■

..... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی: ■

### پرسشنامه ستاد دانشگاه

#### لیست اسامی کارکنان در برنامه سلامت نوزادان معاونت درمان دانشگاه.

نام نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	شماره تلفن همراه

به عنوان کارشناس برنامه به سوالات زیر پاسخ بلی / خیر بدھید و در صورتی که پیشنهاد یا نظری دارید در سلول خالی مقابل سوال توضیح دهید.

ردیف	سوال	پاسخ	اطوپسیحات و نظرات
		بلی	خیر
۱	آیا از برنامه های آموزشی که تاکنون برای احیا نوزادان برگزار شده رضایت داشته اید؟		
۲	آیا آموزشها مربوط به احیا با نیازهای کاری شما تطابق داشته است؟		
۳	آیا نتیجه آموزش ها در تسهیل روند کار شما تاثیر داشته است؟		
۴	آیا در انجام آموزش ها ازمون اولیه برگزار گشته است؟		
۵	آیا پس از انجام آموزش ها برای ارزیابی ماحصل آموزش، یک ارزیابی پیگیری به عمل آمده است؟		
۶	آیا ساعت کار روزانه با حجم وظایف محول شده به شما تناسب دارد؟		
جمع			
درصد			

توضیحات	خیر	بلی	پشتیبانی مالی فرایند احیا(معاونت درمان)
			آیا منابع مالی مورد نیاز برای تهیه تجهیزات و امکانات احیاء در بیمارستان‌های تحت پوشش پیش‌بینی شده است؟
			آیا اعتبارات تخصیص یافته از طرف اداره سلامت اداره نوزادان مطابق با دستور خرج ارسالی و با نظر کارشناس برنامه احیا نوزاد هزینه می‌شود؟ (در صورت پاسخ بلی به سوالات زیر پاسخ داده شود).

ردیف	نام ریز فرایند	فعالیت ها	توضیحات	خیر	بلی
۱	پیش‌بینی اعتبارات	۱- بر اساس فعالیت‌های مداخله‌ای انجام شده است؟			
۲	تنظیم عملکرد هزینه ای	۱- آیا هزینه‌ها به تقسیم (کارگاه، تجهیزات، ....) برآورده شده‌اند؟ ۲- آیا تنظیم عملکرد هزینه‌ای حداقل تا پایان هر فصل انجام شده است؟			
۳	ارسال عملکرد هزینه ای	۱- آیا در فرم مدون ارسال شده است؟ ۲- آیا حداقل تا پایان هر فصل انجام شده است			
۴	تعیین حق الزحمه اعضاي کميته اجرائي	۱- آیا حق الزحمه اعضاي کميته اجرائي مطابق بسته خدمتی محاسبه گردیده است؟ ۳- آیا در فرم مربوطه ثبت و ارسال شده است؟			
۵	تعیین هزینه هاي آموزشی و تجهیزاتی	۱- آیا حق التدریس مدون بر اساس مرتبه علمی و ساعات غیر اداری مدرسان محاسبه گردیده است؟ ۲- آیا در فرم مربوطه ثبت و ارسال گردیده است؟ ۳- آیا تجهیزات و وسائل نیاز احیای نوزاد مطابق با لیست استاندارد برآورده هزینه شده است؟ ۴- آیا لیست تجهیزات و برآورد هزینه مربوطه برای تصویب به کمیته دانشگاهی ارسال شده است؟ ۵- آیا تعیین هزینه‌ها بر اساس هزینه‌های مدون بسته خدمتی صورت گرفته است؟			
۶	توزيع اعتبارات ابلاغی	۱- آیا توزیع اعتبارات تو سط واحد مالی صورت گرفته است؟ ۲- آیا توزیع بر اساس دستور خرج ارسالی از واحد سلامت نوزادان انجام شده است؟			

ردیف	عنوان	خیر بلى
وضعیت برنامه آموزش پرسنل احیاکننده		
.۱	آیا آمار اولیه ای از تعداد ماما، پرستار، متخصص اطفال و متخصص زنان منطقه که لازم است دوره احیا را بگذرانند وجود دارد؟ (به تفکیک هر بیمارستان - کل قابل رویت باشد)	
.۲	آیا تعداد واجدان گواهی کارگاه احیا نوزاد معلوم است؟ (در صورت بلى این تعداد چقدر است؟) (لیست افراد موفق در مگاکد)	
.۳	آیا در سطح دانشگاه پزشکان عمومی، متخصصان زنان و اطفال، پزشکان اورژانس، ماماهای پرستاران دوره احیاگذرانده اند را به صورت نسبت مشخص شده اند؟ (مشاهده مدارک و مستندات ضروری است)	
توضیحات:		

آیا مستندات مربوط به برنامه احیا نوزاد در معاونت درمان وجود دارد؟ ۱-بله ۲-خیر

در صورت پاسخ بلى چک لیست زیر تکمیل شود.

مستندسازی در ستاد معاونت درمان		
.۴	آیا مستندات فرایند احیاء و مستندات گزارش نهایی جمع بندی شده این مستندات وجود دارد؟	
.۵	آیا لیست افراد تیم های احیا و برنامه کاری آن ها وجود دارد؟	
.۶	آیا پیش بینی اعتبارات برنامه آموزشی احیا بیمارستانها وجود دارد؟	
.۷	آیا درخواست اقلام و امکانات مورد نیاز از بخش مرتبط با احیا ثبت و ارسال می شود؟	
.۸	آیا درخواست اقلام و امکانات مورد نیاز از بیمارستان های تحت پوشش به واحد بالاتر دانشگاه ثبت و ارسال می شود؟	
.۹	آیا مستندات جلسات کمیته بیمارستانی احیای نوزادان در بیمارستان های تحت پوشش وجود دارد؟	
.۱۰	آیا مستندات برگزاری کارگاههای دانشگاهی در آموزش احیای نوزادان وجود دارد؟	
.۱۱	آیا مستندات مربوط به انجام بازدید و نظارت بر برنامه اهی احیا در سطح بیمارستانهای تحت پوشش وجود دارد؟ ( برنامه نظارت - چک لیست های تکمیل شده - فیدبکها - گزارشات )	
توضیحات:		

در صورت تشکیل کمیته دانشگاهی احیا به سوالات زیر پاسخ داده شود:

پایش فعالیت‌های کمیته دانشگاهی احیا نوزادان		
		۱. آیا برنامه مشخصی برای برگزاری جلسات کمیته احیای نوزادان دانشگاه وجود دارد؟
		۲. آیا در ۶ ماه گذشته جلسات طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار شده است؟
		۳. آیا نیاز سنجی برای کارگاههای دانشگاهی احیای نوزادان صورت گرفته است؟
		۴. آیا فرایند مشخصی برای احراز امتیاز مدون کارگاههای احیای نوزادان وجود دارد؟
		۵. آیا برنامه ای برای برگزاری کارگاههای دانشگاهی احیا تدوین شده است؟
		۶. آیا منابع مالی برای برگزاری کارگاههای دانشگاهی احیای نوزادان پیش بینی است؟
		۷. آیا دستور العمل تهیه امکانات و تجهیزات استاندارد برای بیمارستان‌ها تهیه شده است؟
		۸. آیا تعریف استاندارد احیای نوزادان تعریف شده است؟
		۹. آیا منابع آموزشی استاندارد و یکسان برای آموزش احیای نوزادان (جهت مدرسین و فرآگیران) تهیه شده است؟
		۱۰. آیا مستندات احیای نوزادان از بیمارستان‌های تحت پوشش جمع آوری شده است؟
		۱۱. آیا مستندات برگزاری جلسات کمیته احیای نوزادان بیمارستان‌های تحت پوشش طبق برنامه در یک سال گذشته وجود دارد؟
		۱۲. آیا گزارش تحلیلی برروی اطلاعات سال قبل موجود است؟
		۱۳. آیا برنامه‌ای مدون جهت بازدید از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه برای بررسی وضعیت احیای نوزادان (پرسنلی، امکانات و تجهیزات) وجود دارد؟
		۱۴. آیا فرایند مشخصی برای ارایه گواهی نامه (certificate) وجود دارد؟
		۱۵. آیا کمیته احیادانشگاه برنامه نیاز سنجی امکانات و تجهیزات ارسال شده توسط کمیته های بیمارستانی احیا را مورد بررسی قرار داده است؟
توضیحات:		

**برای اجرایی شدن برنامه احیا نوزاد مطابق با برنامه عملیاتی تدوین شده اقدام شده است ۱- بله ۲- خیر**

در صورت پاسخ بله چک لیست بررسی فرایندهای حمایتی تکمیل شود.

آیا استناد و مدارک یا فرم های زیر موجودند؟

**در صورت موجود بودن امتیاز او در صورت موجود نبودن امتیاز تعلق می گیرد.**

ردیف	عنوان سند فرم یا لوازم	است	موجود	نیست
۱	یک خط تلفن مستقل			
۲	پست الکترونیک مستقل			
۳	فهرست فرایندهای موجود در برنامه احیا نوزاد			
۴	جدول تفضیلی فعالیت های مداخله ای و جاری			
۵	برنامه زمانبندی دوره های آموزشی احیا			
۶	فرم پایش کارگاه های احیا مطابق بسته خدمتی			
۷	فرم نظر سنجی کارکنان در کارگاههای احیا نوزاد			
۸	نتایج نیازسنجی آموزشی گروههای هدف دوره های آموزشی			
۹	نتایج ارزشیابی و پایش عملکرد کارکنان درگیر احیا نوزاد			
۱۰	جدول ترسیم شده زمان بندی بازدید از کلیه مراکز ارائه خدمت در طول ماه یا فصل			
۱۱	لیست توزیع کتابها و کارت و پوستر احیا در مراکز درمانی ارائه خدمت			
۱۲	دعوت نامه ها و صورت جلسات کمیته دانشگاهی احیا نوزاد			
۱۳	نتایج و پس خوراند نظارت بر عملکرد مراکز درمانی تابعه در برنامه احیا نوزاد			
۱۴	مستندات مربوط به فرم برگزاری کارگاههای آموزشی احیا برای کسب امتیاز			
۱۵	۱- لیست شرکت کنندگان در کارگاههای برگزار شده			
۱۷	نتایج آزمونها ای نظری و عملی گارگاههای احیا نوزاد ( مکاکد و ...)			
۱۸	لیست اولویت بندی مشکلات مشخص شده در طی نظارت ها (اثر بخشی ، قابلیت مداخله و ....)			
۱۹	لیست شاخص های استانی وکشوری در برنامه احیا نوزاد			
۲۰	لیست جمع بندی نظارت بر برنامه احیا در دوره زمانی شش ماهه			
۲۱	برنامه مداخلات بر اساس مشکلات مطروحه در اولویت			
۲۲	لیست پیشنهادات کابردی بر اساس تحلیل نظارتها			
۲۳	الگوریتم اجرای مداخلات و پیشنهادات کاربردی			
۲۴	برنامه عملیاتی احیا			
۲۵	وجود اهداف استراتژیها و جدول زمانبندی فعالیتها در برنامه عملیاتی			

نام بیمارستان منتخب :

تاریخ تکمیل :

### پایش فعالیت کمیته های بیمارستانی احیا(در بیمارستان)

		آیا برنامه مشخصی برای برگزاری جلسات کمیته احیای نوزادان بیمارستان وجود دارد؟	.۱
		آیا جلسات کمیته احیای نوزادان بیمارستان طبق برنامه در یک سال گذشته برگزار شده است؟	.۲
		آیا کمیته احیا نیاز سنجی آموزشی احیا نوزادان را با همکاری سوپروایزر آموزشی برای پرسنل بیمارستان انجام داده است؟	.۳
		آیا کمیته احیا نیاز سنجی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای احیای نوزاد را انجام داده است؟	.۴
			.۵

توضیحات:

### پشتیبانی مالی فرایند احیا(در بیمارستان)

		آیا منابع مالی مورد نیاز برای تهیه تجهیزات و امکانات احیاء در بیمارستان پیش بینی شده است؟	.۳۰
		اسناد مربوط به هزینه تجهیزات و امکانات احیا و کارکاههای آموزشی به موقع تکمیل و پیگیری شده است؟	.۳۱

توضیحات:

### فرایند پشتیبان مستند سازی در بیمارستان

		آیا برنامه ای برای بازبینی مستندات (مدارک و فرم های احیا ی نوزادان احیا شده) وجود دارد؟	.۶
		آیا از فرم های یکسان شده برای ثبت اسناد استفاده می شود؟	.۷
		آیا نیروی پرسنلی مسؤول برای جمع آوری و ثبت مدارک احیا در نظر گرفته شده است؟	.۸
		آیا شاخص های به دست آمده در فرایند احیای بیمارستان در زمان مناسب به ستاد گزارش شده است؟	.۹
		آیا برنامه ای برای بازبینی مستندات (مدارک و فرم ها) برای بیمارستان وجود دارد؟	.۱۰

### پشتیبانی آموزش در بیمارستان

		آیا برنامه تدوین شده ای در کمیته احیای بیمارستان های تحت پوشش برای برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی برای پرسنل احیاء وجود دارد؟	.۱۱
		آیا برنامه برای ارزیابی دستیاران، دانشجویان رشته های پزشکی، مامایی و پرستاری در مورد	.۱۲

		احیای نوزادان وجود دارد؟	
		آیا منابع آموزشی و وسایل کمک آموزشی احیاء در بیمارستانها مهیا است؟	.۱۳
		آیا برنامه ای برای تمدید گواهی آموزشی احیاء برای ارتقای شغلی و ادامه فعالیت حرفه ای وجود دارد؟	.۱۴
		آیا کوریکولوم آموزشی احیاء نوزادان در دسترس بیمارستان (زاشنگاه - اتاق عمل - کتابخانه) قرار دارد؟	.۱۵
		آیا برنامه ای برای ارزیابی و پایش کارگاه‌های آموزشی بیمارستان وجود دارد؟	.۱۶
توضیحات:			

پشتیبانی تجهیزات و داروها(بیمارستان)			
		آیا برنامه مشخصی برای بررسی وضعیت وسایل و تجهیزات احیا نوزاد بیمارستان وجود دارد؟	.۱۷
		آیا وسایل و تجهیزات مورد نظر در زمان مناسب در بخش های زایمان، اتاق عمل، توزیع شده است؟ (فاصله درخواست تا دریافت حداقل ۳ روز)	.۱۸
		آیا ارزشیابی و پایش وسایل و تجهیزات بیمارستان‌های تحت پوشش بر اساس برنامه مدون انجام می‌گیرد؟	.۱۹

توضیحات:

ردیف	عنوان	خیر	بلی
<b>مستندسازی</b> اسناد احیاء در بیمارستان ( مترن / سوپروایزر / مسئول بخش )			
		آیا مستندات فرایند احیاء و مستندات گزارش نهایی جمع بندی شده این مستندات وجود دارد؟	.۲۰
		آیا لیست افراد تیم های احیاء و برنامه کاری آن ها وجود دارد؟	.۲۱
		آیا جدول پیش‌بینی اعتبارات برنامه آموزشی احیا بیمارستانی وجود دارد؟	.۲۲
		آیا درخواست اقدام و امکانات مورد نیاز از بخش مرتبط با احیا ثبت و ارسال می‌شود؟(بایگانی اقلام و امکانات مورد نیاز )	.۲۳
		آیا درخواست اقدام و امکانات مورد نیاز از بیمارستان به واحد بالاتر دانشگاه ثبت و ارسال می‌شود؟	.۲۴
		آیا مستندات جلسات کمیته بیمارستانی احیای نوزادان وجود دارد؟(مطابق بسته خدمتی )	.۲۵
		آیا مستندات برگزاری کارگاه در آموزش احیای نوزادان به تفکیک پایه و پیشرفته وجود دارد؟	.۲۶
		آیا مستندات انجام بازدید روزانه از امکانات و تجهیزات لازم برای احیای نوزادان وجود دارد؟	.۲۷
		آیا چک لیست تجهیزات استاندارد احیا نوزاد تکمیل و کنترل شده است؟	.۲۸

			در صورت کمبود تجهیزات استاندارد لیست نیاز تهیه شده است؟	.۲۹
				.۳۰
توضیحات:				
<b>فرایند پشتیبان مستند سازی</b>				
			آیا برای بازبینی مستندات (مدارک و فرم‌ها) اقدام شده است؟	.۳۱
			آیا از فرم‌های یکسان شده برای ثبت اسناد مربوط به احیاء نوزاد استفاده می‌شود؟	.۳۲
			آیا نیروی پرستنی مسئول برای جمع آوری و ثبت مدارک احیاء در نظر گرفته شده است؟	.۳۳
			آیا شاخص‌های به دست آمده در فرایند احیاء بیمارستان در زمان مناسب به ستاد گزارش شده است؟	.۳۴
				.۳۵
توضیحات:				

<b>پشتیبانی تجهیزات و داروها</b>				
			آیا برای تجهیزات موجود احیاء شناسنامه تهیه شده است؟	.۳۶
			آیا دستورالعمل استاندارد و مدون برای نگهداری از تجهیزات احیاء نوزاد در بیمارستان وجود دارد؟	.۳۷
			آیا وسایل و تجهیزات طبق دستورالعمل استاندارد و مدون نگهداری می‌شوند؟	.۳۸
			آیا برای ارزشیابی و پایش وسایل و تجهیزات احیاء بر اساس برنامه مدون کالیبره و کنترل می‌گیرد؟	.۳۹
توضیحات:				

<b>پشتیبانی آموزش (سوپروایزر آموزشی بیمارستان)</b>				
			آیا برنامه تدوین شده‌ای در کمیته بیمارستانی برای برگزاری کارگاه آموزشی و باز آموزی برای پرسنل احیاء نوزاد وجود دارد؟	.۴۰
			آیا برنامه برای ارزیابی دستیاران، دانشجویان رشته‌های پزشکی، مامایی و پرستاری در مورد احیاء نوزادان وجود دارد؟	.۴۱
			آیا منابع آموزشی و وسایل کمک آموزشی احیاء در بیمارستان مهیا است؟(کتابخانه ، اتاق زایمان ، اتاق عمل ، بخش نوزادان ، بخش مراقبت ویژه نوزادان )	.۴۲

		آیا برنامه ای برای تمدید گواهی آموزشی احیاء برای ارتقای شغلی و ادامه فعالیت حرفه ای احیا گران پایه و پیشرفتنه وجود دارد؟	.٤٣
		آیا کوریکولوم آموزشی احیاء نوزادان در دسترس قرار دارد؟	.٤٤
		آیا برنامه ای برای ارزیابی و پایش کارگاههای آموزشی وجود دارد؟ (مشاهدات مستندات شامل فرم های نظرسنجی ، مکاکد ، فرم ارزشیابی کارکاه ، لیست شرکت کنندگان و.....)	.٤٥
		آیا شاخص های مربوط به آموزش کارکنان در برنامه احیا استخراج و تحلیل شده است	.٤٦
		آیا فرم مربوط به درخواست مجوز اجرای برنامه آموزش (فرم ۲۶) تکمیل و ارسال گردیده است؟	.٤٧
		گواهینامه شرکت در کارگاههای آموزشی احیا به شرکت کنندگان با طی مراحل قانونی صادر شده است؟	.٤٨
			.٤٩
		توضیحات:	

**چک لیست وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای عملیات احیا**

الف	وسایل عمومی	دستگاه	نوع / مارک	وجود دارد	مقدار کسری	اصلاً وجود ندارد
۱	دستکش استریل و لاتکس، ماسک و دیگر وسایل حفاظتی کارکنان در هر اتاق زایمان به تعداد کافی وجود دارد؟					
۲	گرم کننده تابشی و سایر منابع حرارتی <sup>(۱)</sup> نسبت به تخت های زایمان ۱:۳ گرم کننده تابشی ثابت ۶:۱ گرم کننده تابشی سیارحداقل ۱ عدد در هر اتاق زایمان					
۳	پد سفت مخصوص احیا نسبت به گرم کننده های تابشی ۱:۳ ۱ عدد در هر اتاق زایمان حداقل ۱ عدد در هر بخش زایمان					
۴	ساعت (دارای عقربه ثانیه شمار) یا کرنومتر <sup>(۲)</sup>					
۵	ملحفه گرم <sup>(۴)</sup> ۱:۲ نوزاد در هر سرت زایمان، به صورت استریل دو ملحفه جداگانه برای نوزاد					
۶	گوشی پزشکی ۱ عدد در هر تراالی					
۷	نوار چسب ۱,۲ یا ۳,۴ اینچی ۱ حلقه از هر کدام در هر تراالی					
۸	راه هوایی دهانی - حلقی در اندازه های ۰، ۰، ۰۰۰ یا طول های ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ میلی متر ۱ عدد از هر کدام در هر تراالی					
۹	سرنگ های ۱، ۳,۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سی سی ۱:۱۰ نوزاد از هر کدام او ۳ سی سی ۴ عدد - سایر موارد ۳ عدد در هر تراالی					
۱۰	سر سوزن های شماره ۱۸، ۲۱ و ۲۵ یا تجهیزات خونگیری در سیستم های بدون سوزن ۱:۱۰ نوزاد از هر کدام در هر تراالی					
۱۱	مانیتور قلبی و الکترودهای مربوطه ۱ عدد در هر بخش زایمان ×					
۱۲	پالس اکسیمتر و پروب مربوطه حداقل ۱ عدد در هر بخش زایمان ×					
۱۳	مخلوط کننده اکسیژن و هوا ۱ عدد در هر بخش زایمان ×					
۱۴	منبع هوای فشرده ۱ عدد در هر بخش زایمان ×					
۱۵	کیسه پلاستیکی قابل بسته شدن (سایز چهار و نیم لیتر) ۵ عدد در هر تراالی ×					
۱۶	پد های گرم کننده شیمیایی ۱ عدد در هر بخش زایمان ×					
۱۷	انکوباتور قابل حمل ۱ عدد در هر بیمارستان ×					
	درصد					

وسایل ساکشن	ب
پوآر <sup>(۵)</sup> بصورت استریل و به تعداد کافی در محفظه ای در هر اتاق زایمان وجود داشته باشد. نسبت ۱:۱ نوزاد.	۱
کاتر های ساکشن به شماره های ۱:۱۰ از هر کدام ۵ عدد در هر ترالی	۲
لوله تغذیه به شماره و سرنگ ۲۰ میلی لیتر ۱:۱۰ از هر کدام ۵ عدد از هر کدام در هر ترالی	۴
درصد	

وسایل بگ و ماسک	ج
وسیله تهویه با فشار مثبت که قادر به رساندن اکسیژن ۹۰ تا ۱۰۰ درصد باشد. شامل: ۱- بگ خود متسع شونده یا بگ وابسته به جریان: ۱ عدد در هر ترالی ۲- دستگاه تی پیس: ۱ عدد در هر بخش زایمان × ۳- ذخیره احتیاط: یک بگ خود متسع شونده در هر بخش زایمان	۱
ماسک های صورت با اندازه های نوزاد ترم و نارس حداقل ۱ عدد از هر کدام در هر ترالی	۲
منبع اکسیژن با جریان سنج و لوله های مربوطه شامل: ۱- منبع دیواری یا کپسول: ۱ عدد برای هر گرم کننده تابشی ثابت ۲- ذخیره احتیاط به صورت کپسول: ۱ عدد در هر اتاق زایمان	۳
درصد	
وسایل لوله گذاری	د
لارنگوسکوپ با تیغه های ۰ و ۱ همراه با لامپ و باطری اضافی ۱ عدد در هر ترالی	۱
لوله های تراشه با قطر داخلی ۲,۵، ۳,۵ و ۴ میلیمتر ۱:۱۰ نوزاد از هر کدام ۳ عدد از هر کدام در هر ترالی	۲

			استیلت (اختیاری) ۱ عدد در هر ترالی	۳
			قیچی ۱ عدد در هر ترالی	۴
			نوار چسب / وسایل ثابت نگهداشتی لوله تراشه دو عدد در هر ترالی	۵
			پنبه ۱ ظرف در هر ترالی	۶
			الکل ۱ شیشه در هر ترالی	۷
			ماسک حنجره ای (اختیاری) ۱ عدد در هر بخش زایمان	۸
			درصد	

وسایل کاتریزاسیون عروق نافی	۹
محلول ضد عفونی کننده ۱ عدد در هر ترالی	۱
اسکالپل یا قیچی ۱ عدد در هر ترالی	۲
نوار نافی یا نخ بخیه ۰ یا ۱۳,۰ عدد در هر ترالی	۳
کاتر نافی شماره های ۳/۵ و ۵ ۱:۲۰ نوزاد از هر کدام ۳ عدد از هر کدام در هر ترالی	۴
سه راهی مخصوص ۱:۲۰ نوزاد از هر کدام ۳ عدد از هر کدام در هر ترالی	۵
درصد	
داروها	۱۰
اپی نفرین ۱:۱۰۰۰ آمپول های ۱ سی سی ۵ عدد در هر ترالی	۱
سرم کربستالویید ایزووتون (نرمال سالین / رینگر لاكتات) ۲ عدد از هر کدام در هر ترالی	۲
بیکربنات سدیم ۴/۸ درصد ویال ۵۰ سی سی ۲ عدد از هر کدام در هر ترالی	۳
نالوکسان هیدروکلرید ۴,۰ میلی گرم در میلی لیتر قابل دسترس در بخش	۴
سرم قندی ۱۰ درصد ۳ عدد در هر ترالی	۵
درصد	
درصد کل	

## چک لیست عملیات احیا نوزاد


ردیف	موضوع		
خیر	بلی		
۱	آیا از نئوپاپ (تی پیس احیا نوزاد) در نوزادان با سن کمتر از ۳۱ هفته استفاده می شود؟		
۲	آیا از کیسه پلاستیکی پلی اتیلن برای گرم نگه داشتن نوزادان با سن حاملگی کمتر از ۲۸ هفته استفاده می شود؟		
۳	آیا فراخواندن متخصص اطفال به اتاق زایمان در موارد زایمان حاملگی پر خطر امری متدالول است؟		
۴	آیا نفرات تیم احیا بر حسب نیاز به موقع احضار می شوند؟		
۵	آیا اسمای تیم احیا نوزاد در بورد اتاق زایمان نوشته می شود؟		
۶	آیا به طور متدالول برای زایمان های چند قلویی چند تیم احیا (به تعداد قل ها) تدارک دیده و در اتاق زایمان حضور می یابد؟		
۷	آیا قبل از تولد نوزاد نیاز به احیا بررسی و مشخص می شود؟		
۸	عملیات احیا نوزاد مطابق با اخرين الگوريتم احیا انجام می شود؟ ( مطابق با چک لیست مگاکد ) (چک لیست مهارتی ضمیمه تکمیل شود )		
۹	در پایان عملیات احیا در فرمهای مربوطه ثبت انجام می شود		
۱۰	وسایل یاد شده اختصاصی بخش زایمان یا اتاق عمل مربوطه بوده و با بخش های تحت نظر نوزادان یا NICU مشترک نمی باشند؟		
۱۱	وسایل مورد نیاز بر اساس پیش بینی تعداد زایمان ها و طبق نسبت تعیین شده، تامین شده و در بخش زایمان یا اتاق عمل مربوطه نگهداری شوند؟.		
۱۲	موجودی هر ترالی در انتهای هر شیفت تکمیل شده و در آغاز شیفت بعدی بازبینی و تحويل گرفته شود؟.		
۱۳	وسایل بویژه آمبوبگ، لرنگوسکوپ، منبع اکسیژن، ساکشن، ماسک، گرم کننده تابشی و انکوباتور، از نظر کارکرد، بصورت روزانه ارزیابی شده و وضعیت آنها ثبت شود؟.		
۱۴	ذخیره وسایل و داروها از نظر تعداد، دوره نگهداری استریل و سایل و تاریخ مصرف داروها مطابق با دستورالعمل های کمیته کنترل عفونت کشوری به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد؟.		
۱۵	نحوه درخواست داروها و وسایل ، تعمیرات یا خرید تجهیزات مطابق با دستورالعمل های داخلی بیمارستان هاست؟		
۱۶	در هر اتاق زایمان دیوارکوبی که مراحل احیا به صورت الگوريتم در آن تشریح شده باشد. نصب شده است؟(نصب پوستر احیا نوزاد)		
۱۷	در هر اتاق زایمان لازم است تعداد کافی فرم احیا در دسترس می باشد		
۱۸	آیا دماسنجه برای ثبت دمای اتاق بر دیوار نصب شده است؟		
۱۹	آیا پنجره های اتاق همگی بسته اند؟		
۲۰	آیا سطح میز احیا تمیز است؟		
۲۱	آیا رادینت وارمر در اتاق زایمان آماده و قبل از انجام زایمان روشن و گرم شده است(حداقل نیم ساعت قبل )		

۲۲	آیا ۳-۵ حوله تمیز (ترجیحاً استریل) برای تمیز کردن و پیچیدن به دور نوزاد یا پهن کردن روی میز وجود دارد؟
۲۳	آیا لوازم لازم برای پاکسازی راه های هوایی نوزاد (مانند ساکشن) آماده شده است؟
۲۴	آیا کپسول اکسیژن در اتاق احیا و آماده استفاده می باشد؟

## ارزشیابی برنامه احیای نوزادان

همانطور که قبلاً اشاره شدار ارزشیابی برنامه تعیین ارزش یا مقدار موفقیت در نیل به اهداف از پیش تعیین شده است. آنچه این فرایند را از پایش متمایز می‌سازد توجه به دستیابی به اهداف در ارزشیابی است. در حالی که در پایش تنها به بررسی انجام فعالیت‌ها منطبق بر استانداردهای از پیش تعیین شده می‌پردازد، برای ارزیابی برنامه احیای نوزادان، شاخص‌هایی را باید در نظر گرفت.

شاخص‌های در نظر گرفته شده در سه بخش درون داد، عملکردی (فرایندهای اصلی) و پیامد (برون داد) در نظر گرفته شده اند که در سه سطح بیمارستانی، دانشگاهی و ستادی (اداره نوزادان معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان) قابل ارزیابی هستند.



می‌توان گفت که هدف‌های مهم ارزشیابی در برنامه احیای نوزادان: عبارت است از تعیین میزان تغییر در اهداف اولیه، تعیین نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه و برآورد میزان دسترسی به نتایج مورد انتظار است. ارزشیابی برنامه در حکم کمکی برای تحلیل خط مشی و تعیین اثربخشی برنامه احیای نوزادان است. با ارزشیابی ویژگی‌های احتمالی برنامه مانند میزان بهره برداری موثر از منابع، میزان تبدیل دروندادهای برنامه به بروندادهای میزان دستیابی به هدفها و به وجود آوردن تاثیرات مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی ارزشیابی راهنمایی برای تعیین جهت گیری‌های آینده برنامه است.

ابزار اصلی استخراج شاخص‌های ارزشیابی فرم ثبت زایمان (ضمیمه شماره ۴) و احیاء نوزاد در اتاق زایمان یا اتاق عمل است. بیمارستان باید ضمیمه شماره ۵ را هر سه ماه یک بار به معاونت درمان ارسال کرده و معاونت درمان باید آن‌ها را جمع بندی کرده و به اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت ارسال تمايد.

شاخص های ارزشیابی برنامه احیاء نوزاد						
نوع شاخص	شاخص ارزشیابی	صورت کسر	مخرج کسر	واحد محاسبه کننده	توالی زمانی ارزشیابی	
	شیوع نوزادان احیا شده پس از زایمان در بیمارستان	تعداد نوزاد احیا شده پس از زایمان در بیمارستان	تعداد نوزاد شده در بیمارستان	کمیته بیمارستانی احیا	سالانه	
	شیوع نوزادان احیا شده پس از زایمان در بیمارستان های کل کشور	تعداد نوزاد احیا شده پس از زایمان در بیمارستان های کل کشور	تعداد نوزاد شده در بیمارستان	اداره نوزادان وزارت بهداشت	سالانه	
	میزان مرگ و میر نوزادان بلا فاصله پس از احیا (احیای ناموفق) در اتاق زایمان بیمارستان	تعداد نوزادان فوت شده بلا فاصله پس از عملیات احیا	تعداد نوزاد شده در بیمارستان	کمیته بیمارستانی احیا	سالانه	
	میزان مرگ و میر نوزادان بلا فاصله پس از احیا (احیای ناموفق) در بیمارستان های کل کشور	تعداد نوزادان فوت شده بلا فاصله پس از عملیات احیا در بیمارستان های کل کشور	تعداد نوزاد شده در بیمارستان کل کشور	اداره نوزادان وزارت بهداشت	سالانه	
	میزان احیای موفق نوزادان احیا شده در بیمارستان	تعداد نوزادان زنده پس از احیا با شرایط استاندارد	تعداد نوزاد شده در بیمارستان	کمیته بیمارستانی احیا	سالانه	
	میزان احیای موفق نوزادان احیا شده در بیمارستان های کل کشور	تعداد نوزادان زنده پس از احیا با شرایط استاندارد در بیمارستان های کل کشور	تعداد نوزاد شده در بیمارستان های کل کشور	اداره نوزادان وزارت بهداشت	سالانه	

## ارزشیابی فرایند های پشتیبان

فرایندهای پشتیبان، فرایند هایی هستند که به عنوان "اجزای فرایند اصلی" محسوب نمی گردند ولی برای اجرای صحیح فرایند های اصلی مورد نیاز یا کمک کننده می باشد. این فرایندها در جای خود می توانند به صورت یک فرایند مجزا مورد بررسی قرار گرفته، متعلقات و استانداردهای آنها معین شوند.

### جداول مربوط به شاخص های فرآیندهای پشتیبان مربوط به ارایه دهنده خدمات و منابع و فضای فیزیکی و اطلاعات


نام خدمت پشتیبان	شاخص	محاسبه کننده	توالی زمانی محاسبه
آموزش ارایه دهنده خدمات احیا	• نسبت تعداد پرسنل دارای گواهی احیاء به کل پرسنل	کمیته های بیمارستانی و دانشگاهی احیا نوزادان و اداره سلامت نوزادان	هر ۶ ماه
برگزاری کارگاه احیاء نوزاد دانشجویان رشته های مربوط به نوزاد	• نسبت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ارایه دهنده واحد های درسی مربوطه به کل مراکز دانشگاهی علوم پزشکی کشور در هر سال.	اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	هر ۶ ماه
ارایه گواهی احیا در هر یک از اجزای فرآیند اصلی به صاحبان اصلی و جانشینان فرآیندهای احیا	• وجود متد های استاندارد ارزیابی کیفیت آموزش های احیا	اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت	هر ۶ ماه
تامین نیروی کاری و پرسنل مورد نیاز در هر یک از سطوح بیمارستانی سطح بندی شده در رده های صاحبان اصلی و جانشینان فرآیندهای احیا	نسبت تعداد پرسنل ماهر استاندارد در بیمارستان های ارایه دهنده خدمات احیا نوزادان به کل پرسنل شاغل در آن مراکز.	کمیته های بیمارستانی و دانشگاهی احیا نوزادان و اداره سلامت نوزادان	هر ۶ ماه
آموزش و تربیت مریبان آموزش احیا و ارایه گواهی مربوطه در هر یک از رشته های صاحبان اصلی و جانشینان فرآیندهای احیا	• وجود کوریکولوم و محتوای آموزشی مصوب • نسبت تعداد مریبان آموزش دیده و ماهر برای هر یک از گروه های اصلی و جانشین دارای گواهی مهارت در زمینه های آموزشی ذکر شده به کل پرسنل هر یک از گروه های اصلی و جانشین های آنها در هر سال.	کمیته های علمی و اجرایی ستادی و منطقه ای احیای نوزادان در کشور دیپرخانه آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور	هر ۶ ماه
تشکیل کمیته علمی احیا در کشور برای تدوین و به روزرسانی استانداردهای احیا و تربیت مریبان کشوری آموزش احیا در کشور	• وجود آیین نامه مصوب تشکیل و فعالیت کمیته در کشور. • وجود و فعالیت کمیته علمی احیای نوزادان در کشور.	اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	هر ۶ ماه

بر اساس برنامه سطح بندی ارایه خدمات پرینتال در کشور - اداره نوزادان معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نام خدمت پشتیبان	شاخص	محاسبه کننده	توالی زمانی محاسبه
انجام نیازمندی‌های دوره‌ای در سطوح ملی، منطقه‌ای و بیمارستانی برای آموزش احیا جهت صاحبان اصلی و جانشینان فرآیندهای احیا	تعداد نیازمندی‌های انجام شده در مورد احیای نوزادان در کشور.	کمیته‌های بیمارستانی و دانشگاهی احیا نوزادان و اداره سلامت نوزادان	سالانه
تدوین و ابلاغ استانداردهای پرسنلی در بیمارستانهای سطوح مختلف <sup>۹</sup> در خصوص فرآیندهای احیای نوزادان.	وجود استانداردهای ابلاغ شده پرسنلی در بیمارستانهای سطوح مختلف در خصوص فرآیندهای احیای نوزادان	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اداره سلامت نوزادان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.</li> <li>• کمیته علمی احیا نوزادان در کشور</li> <li>• مرکز نظارت و اعتباری‌بخشی درمان، وزارت بهداشت درمان و آمورش پزشکی</li> <li>• دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور</li> </ul>	سه سالانه
تدوین آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با هر موضوع.	وجود آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با هر موضوع.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دفتر سلامت خانواده و جمعیت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.</li> <li>• مرکز نظارت و اعتباری‌بخشی درمان، وزارت بهداشت درمان و آمورش پزشکی.</li> <li>• معاونت توسعه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.</li> <li>• کمیته علمی احیای نوزادان در کشور.</li> </ul>	سه سالانه

<sup>۹</sup> بر اساس برنامه سطح بندی ارایه خدمات پریناتال در کشور- اداره نوزادان معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مناج




۱. Text book of Neonatal Resuscitation. ۵<sup>th</sup> edition. American Academy of Pediatrics, American Heart association; ۲۰۰۶
۲. ۲۰۰۰ American Heart Association (AHA) guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) and emergency cardiovascular care (ECC) of pediatric and neonatal patients: pediatric basic life support. *Pediatrics*. ۲۰۰۶; ۱۱۷(۵):e۹۸۹-۱۰۴
۳. Mitchell A, Niday P, Boulton J, Chance G, Dulberg C, A prospective clinical audit of neonatal resuscitation practices in Canada. *Adv Neonatal Care*. ۲۰۰۲; 2(6):۳۱۶-۲۶.
۴. Wiswell TE, Neonatal Resuscitation. RESPIRATORY CARE • ۲۰۰۳; ۴۸ (۳):۲۸۸-۹۰
۵. RAHMAN RRB, DELIVERY ROOM MANAGEMENT OF NEWBORN - A REVIEW. ۲۰۰۵; ۲۳(۱)
۶. British Columbia Reproductive Care Program. Newborn Guideline ۷.Neonatal Resuscitation: Resources and Education; ۲۰۰۲
۷. RCH II Document ۱, The Principles and Evidence Base for State RCH II Programme Implementation Plans (PIPs)Chapter ۱: Improving Health Outcomes. Reproductive and Child Health II Programme. In india; ۲۰۰۲
۸. Complementary Package of Activities, Guidelines for the Referral Hospital (for ۲۰۰۳ - ۲۰۰۷). Kingdom of Cambodia,Ministry of Health.; ۲۰۰۳
۹. Morley C. New Australian Neonatal Resuscitation guidelines. J Paed and Child Health. ۲۰۰۷; 43: ۶-۸
۱۰. Managing Newborn Problems. A guide for doctors, nurses and midwives. Department of Reproductive Health and Researches. Geneva: WHO; ۲۰۰۳
۱۱. What Works for Children in South Asia. NEWBORN CARE: AN OVERVIEW. United Nations Children's Fund, Regional Office for South Asia; ۲۰۰۴
۱۲. A District Hospital Service Package for South Africa. a set of norms and standards. Department of Health: Pretoria; ۲۰۰۲
۱۳. **Ward M P,Platt, Brown K.** Evaluation of advanced neonatal nurse practitioners: confidential enquiry into the management of sentinel cases. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed ۲۰۰۴;89:F241
۱۴. Osborn D. Department of Neonatal Medicine Protocol Book. Royal Prince Alfred Hospital; ۲۰۰۲
۱۵. A national review of neonatalresuscitation programmes for midwives. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed ۲۰۰۱;80:F140-F148
۱۶. **Chan L C, Hey E,** Can all neonatal resuscitation be managed by nurse practitioners?. Arc Dis Child- Fetal Neonatal Ed ۲۰۰۶;91:F02-F00
۱۷. Ho NK. Decision-making: initiation and withdrawing life support in the asphyxiated infants in developing countries. *Singapore Med J*. ۲۰۰۱ ; ۴۲(۹): ۴۰۲-۰
۱۸. Vakrilova L, Elleau Ch, Sluncheva B. French-Bulgarian program "Resuscitation of the newborn in a delivery room"--results and perspectives Akush Ginekol (Sofia). ۲۰۰۵;44(3):30-4.
۱۹. Deorari AK, Paul VK, Singh M, Vidyasagar D. The National Movement of Neonatal Resuscitation in India. *J Trop Pediatr*. ۲۰۰۰; 46(5):310-7.
۲۰. Narang A, Kiran PS, Kumar P. Cost of neonatal intensive care in a tertiary care center. *Indian Pediatr*. ۲۰۰۵; 42(10): ۹۸۹-۹۱.
۲۱. McNamara PJ, Mak W, Whyte HE. Dedicated neonatal retrieval teams improve delivery room resuscitation of outborn premature infants. *J Perinatol*. ۲۰۰۵; 25(5): ۳۰۹-14
۲۲. Madar J. Clinical risk management in newborn and neonatal resuscitation. *Semin Fetal Neonatal Med*. ۲۰۰۵; 10(1): ۴۰-۶۱. Epub ۲۰۰۴ Dec ۱۰.

۲۳. Singhal N, McMillan DD, Yee WH, Akierman AR, Yee YJ. Evaluation of the effectiveness of the standardized neonatal resuscitation program. *J Perinatol.* ۲۰۰۱;۲۱(۶):۳۸۸-۹۲.
۲۴. Lawn JE, Manandhar A, Haws RA, Darmstadt GL. Reducing one million child deaths from birth asphyxia - a survey of health systems gaps and priorities. *Health Res Policy Syst.* ۱۶;۵(۱):۴
۲۵. Jukkala AM, Henly SJ. Readiness for neonatal resuscitation: Measuring knowledge, experience, and comfort level. *Appl Nurs Res.* ۲۰۰۷ y;۲۰(۲):۷۸-۸۵.
۲۶. Tormo Calandin C, Manrique Martinez I. New recommendations for uniform reporting of advanced life support]. *An Pediatr (Barc).* ۲۰۰۷;۶۶(۱):۵۵-۶۱
۲۷. Pattinson R, Woods D, Greenfield D, Velaphi S. Improving survival rates of newborn infants in South Africa. *Reprod Health.* ۲۰۰۵ ۱۱;۲(۱):۴.
۲۸. Chabernaud JL. Neonatal resuscitation in delivery room: new advances. *Arch Pediatr.* ۲۰۰۵ ;۱۲(۴):۴۷۷-۹۰.
۲۹. Wisborg T, Ronning TH, Beck VB, Brattebo G. Preparing teams for low-frequency emergencies in Norwegian hospitals. *Acta Anaesthesiol Scand.* ۲۰۰۳;۴۷(۱۰):۱۲۴۸-۵۰.
۳۰. Kambarami RA, Chirenje M, Rusakaniko S. Situation analysis of obstetric care services in a rural district in Zimbabwe. *Cent Afr J Med.* ۲۰۰۰;۴۶(۶):۱۵۴-۷.
۳۱. راهنمای کشوری ارایه خدمات مامایی و زایمان، بیمارستانهای دوستدار مادر. ویرایش نخست. تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت خانواده و جمیعت، اداره سلامت مادران؛ ۱۳۸۵
۳۲. پیش نویس طرح سطح بندی منطقه ای خدمات مادر و نوزاد. انجمن پزشکان نوزادان ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت خانواده و جمیعت؛ ۱۳۸۵



118

ضام



## ضمیمه ۱: فهرست اسامی کارآموزان احیاء نوزاد



## بسته خدمتی احیاء نوزاد



## فهرست اسامی کارگاه احیاء نوزاد

اداره سلامت نوزادان  
بازاری ملکیت ملکیت و پرداخت  
و زیرا در پیداگفتاری، طبیعتی و آموزشی

دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی: ..... مرکز برگزار کننده کارگاه: ..... آیا این فهرست ثبت آنلاین شده است: <input type="checkbox"/> غیر <input checked="" type="checkbox"/> بد در صورت مشتبه بودن تاریخ ثبت آنلاین: .....	الف: اطلاعات دوره آموزشی																																																																								
..... تاریخ کارگاه: ..... سطح کارگاه ( فقط یکی را انتخاب کنید): <input type="checkbox"/> اراده محدود <input type="checkbox"/> بازرسی اراده محدود <input type="checkbox"/> مربی پیمارشی <input type="checkbox"/> مربی دانشکده	۱																																																																								
..... مکان برگزاری کارگاه: ..... تلفن مکان برگزاری کارگاه: ..... تعداد کل کارآموزان: .....	۲																																																																								
.....	۳																																																																								
.....	۴																																																																								
.....	۵																																																																								
.....	۶																																																																								
.....	۷																																																																								
.....	۸																																																																								
ب: اطلاعات مربی های احیاء نوزاد:																																																																									
کد شناسایی مربی احیاء نوزاد - دبیر # ..... نام و نام خانوادگی دبیر: ..... سطح مربی احیاء نوزاد - دبیر (یکی را انتخاب نمایید): <input type="checkbox"/> مربی دانشکده <input type="checkbox"/> مربی پیمارشی آدرس مربی احیاء نوزاد - دبیر: ..... تلفن تماس: ..... آدرس ایمیل مربی: ..... کروahi احیاء نوزاد برای چه آدرسی ارسال گردد؟ <input type="checkbox"/> سمل برگزاری کننده <input type="checkbox"/> مربی احیاء <input type="checkbox"/> کурс دیگر: .....																																																																									
ج: اطلاعات مربی های کمکی:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>نام و نام خانوادگی</th> <th>محلکه</th> <th>پارسیان</th> <th>کد شناسایی</th> <th>شماره تلفن</th> <th>محلکه</th> <th>پارسیان</th> <th>نام ایمیل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>۲</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>۳</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>۴</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>۵</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>۶</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>۷</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>۸</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> </tbody> </table>	نام و نام خانوادگی	محلکه	پارسیان	کد شناسایی	شماره تلفن	محلکه	پارسیان	نام ایمیل	۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
نام و نام خانوادگی	محلکه	پارسیان	کد شناسایی	شماره تلفن	محلکه	پارسیان	نام ایمیل																																																																		
۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			

من تایید می کنم که افرادی که اسامی آنها در فهرست صفحه بعد آمده است با موقوفیت کارگاه احیاء نوزاد را گذرانده و امتحان ارزیابی داشت و مهارت مگاکن که مطابق بسته خدمتی احیاء نوزاد برگزار شده است، را با موقوفیت پشت سر گذاشته است.

فضاه دبیر کارگاه



## بسته خدمتی احیاء نوزاد

اداره سلامت نوزادان  
دفتر ملایمیت، مالوکه و پرورش  
و زارت، پرورشگاه های رسان و آموزش بزرگسازی

نام و نام خانوادگی	محل فعالیت	مدرک تحصیلی	تلفن/ایمیل
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....
.....	.....	.....	شماره تلفن: ..... آدرس ایمیل: .....

## ضمیمه ۲: نامه به کارآموز هنگام ارائه درسنامه مشخص کردن زمان کارگاه



## بسته خدمتی احیاء نوزاد



&lt;نام بیمارستان&gt;

خانم/آقای .....

با احترام و سلام

به این وسیله از شما دعوت می شود در کارگاه احیاء نوزاد پایه/پیشرفته/مربيگری که در مورخ .....  
در ..... برگزار می شود شرکت فرمایید.

در پایان کارگاه باید شما بتوانید

۱. تغییرات فیزیولوژیک پیرامون تولد نوزاد را توضیح بدهید

۲. مهمترین مدخلات اثربخش در احیاء نوزاد را نام ببرید

۳. مشخص بکنید که برای موفقیت در یک عملیات احیاء نوزاد چه وسائل، تجهیزات و پرسنلی باید در  
اتاق زیمان آماده باشند.

۴. با قبول شدن در آزمون کتبی برنامه احیاء نوزاد میزان دلش خود را در باره احیاء نوزاد به اثبات  
برسانید.

۵. با قبول شدن در آزمون عملی مگاکد مهارت خود را اجرای عملیات احیاء نوزاد به اثبات برسانید  
درسنامه احیاء نوزاد به همراه DVD چند رسانه ای داخل آن به همراه این نامه در اختیار شما قرار می گیرد.  
این کتاب متعلق به شما بوده و در روز برگزاری کلرگاه از تمام کتاب از شما امتحان گرفته خواهد شد. در  
صورت قبولی به شما اجازه داده خواهد شد که در کلرگاه شرکت کرده و ولجد گواهی احیاء نوزاد شوید. در  
صورت عدم قبولی به شما فرصت داده خواهد شد که در دوره های بعدی در آزمون کتبی شرکت کنید ولی  
 قادر نخواهید بود که در کارگاه شرکت نمایید.

در صورت قبولی و گذراندن کارگاه مربي بیمارستانی/دانشگاهي موظف است شرایط مناسب برای تعریف  
عملی احیاء نوزاد را به صورت فردی یا تیمی برای شما فراهم نماید. فلصله زمئی برگزاری کلرگاه و امتحان  
عملی مگاکد دو هفته تا یک ماه بوده و شما با راهنمایی مربي، تعریف عملی در محیط کار یا مانکن نوزاد و  
مرور سناریوی DVD چند رسانه ای و همچنین مشاهده امتحان مگاکد به اجرا در آمده در فیلمی تحت  
عنوان Case of NRP باید خود را آماده امتحان نهایی که منجر به صدور گواهی می شود، نمایید.

مربي احیاء نوزاد

&lt;نام و نام خانوادگي مربي&gt;

### ضمیمه ۳: نامه به کارآموز هنگام اتمام کارگاه و مشخص کردن زمان امتحان مگاکد



### بسته خدمتی احیاء نوزاد



#### <نام بیمارستان>

#### خانم/آقای .....

با احترام و سلام

به این وسیله به اطلاع شمارسانده می‌شود در مورخ ..... در ..... از شما امتحان مگاکد چرفته خواهد شد. در این مدت شما فرصت دارید، با راهنمایی مربی، تمرین عملی در محیط کار یا مالکن نوزاد و مدور سناریوی DVD چند رسانه ای و همچنین مشاهده امتحان مگاکد به اجرا در آمده در فیلمی تحت عنوان Case NRP پاید خود را آماده امتحان نهایی که منجر به صدور گواهی می‌شود، نمایید. این امتحان به صورت ارائه یک سناریوی از قبیل تدوین شده است که مربی در نقش هدایت کننده، و شما به تنها یی با یک یا دو مستیار نقش یک اعیاگر را بازی می‌کنید. شما باید در طی امتحان علاوه بر آن که عملیات را به درستی و در زمان مناسب انجام می‌نمایید، آن را شرح نمایید. ساختار این امتحان مشابه تمرین عملی مربی با شما توسط چکلیست کاریابی انتهای درس‌ها در طی کارگاه است.

صفحات پایانی درستامه اعیاء نوزاد نمونه ای از برگه ای که برای ارزیابی شماتیک مربی پرخواهد شد ارائه شده است. همان طور که مشاهده می‌کنید ۵ مورد آن با رنگ تیره نشاندار شده اند این ۵ مورد شامل:

۱. بررسی بگ، ماسک، درسترس بودن اکسیژن.
۲. تشخیص نیاز تهویه با فشار مثبت.
۳. انجام تهویه با فشار مثبت را به صورت صحیح.
۴. انجام اقدامات اصلاحی مناسب وقتی تعداد ضربان قلب بالا نرفته و حرکت قفسه سینه وجود ندارد.
۵. نشان دادن روش صحیح فشردن قفسه سینه.

شما باید در تمامی موارد منکور نمره ۲ آورده و نمره کلی شما بیشتر از ۸۵ درصد کل نمره باشند.

### مربی احیاء نوزاد

#### <نام و نام خانوادگی مربی>

## ضمیمه ۴: فرم ثبت زایمان در بیمارستان



لارمه ملادت نوران  
دغه سعادت طهران و شهرت  
علی‌الله علی‌الله

فرم شیوه زمان و مارستان

## ضمیمه ۴: فرم گزارش موارد زایمان در بیمارستان به معاونت درمان



اداره سلامت نوزادان  
وارثات بجهات خود و وعده و وعده  
و اداره سلامت نوزادان و امور انسانی

دانشکده علوم پزشکی

بیمارستان

## فرم گزارش موارد زایمان در بیمارستان به معاونت درمان

گزارش موارد زایمان از مرغ ... تا مرد ... در سال ...

نموداد کل زایمان	نموداد زایمان طبیعی	نموداد سوزارین	نموداد زاده زاینی	نموداد زاده زاینی و مرگ در آغاز زایمان	نموداد زاده زاینی و انتقال به بخش نوزادان یا NICU	نموداد مولذین زاده با وزن کمتر از ۱۰۰۰ گرم	نموداد مولذین زاده با وزن ۱۰۰۰ الی ۹۹۹ گرم	نموداد مولذین زاده با وزن ۹۹۹ الی ۲۶۷ گرم	نموداد مولذین زاده با وزن ۲۶۷ الی ۲۰۰ گرم	نموداد مولذین زاده با سن بیشتر یا مساوی ۲۰۰ هفته	نموداد مولذین زاده با سن بیشتر یا مساوی ۲۸ هفته	نموداد مولذین زاده با سن بیشتر یا مساوی ۳۱ هفته	نموداد مولذین زاده با سن بیشتر یا مساوی ۴۰ هفته	نمودادی که نیاز به عملیات احیاء نداشتند	نمودادی که فقط نیاز به گاهی ایمهان نداشتند	نمودادی که حد PPV انجام شدند	نمودادی که تا حد قدردن قدر نیزه سیله اجایه شدند	نمودادی که تا حد تحریز دارو احیاء شدند	نمودادی که نیاز به لوله گذاری پیدا کردند	جمع
۱																				
۲																				
۳																				
۴																				
۵																				
۶																				
۷																				
۸																				
۹																				
۱۰																				
۱۱																				
۱۲																				
جمع																				

## ضمیمه پنجم: شناسنامه تراالی اورژانس برای احیاء نوزاد

شناسنامه تراالی اورژانس برای احیاء نوزاد		
حداقل موجودی	میزان نیاز کلی	
۶ عدد از هر کدام	در هر اتاق زایمان به تعداد کافی	الف وسائل عمومی
حداقل ۱ عدد در هر اتاق زایمان	نسبت به تخت های زایمان ۱۳	۱ دستکش استریل و لاتکس، ماسک و دیگر وسائل حفاظتی
حداقل ۱ عدد در هر بخش زایمان	نسبت به گرم کننده های تابشی ۱۳	۲ گرم کننده تابشی و سایر منابع حرارتی <sup>(۱)</sup>
	۱ عدد در هر اتاق زایمان	۲ پد سفت مخصوص احیا <sup>(۲)</sup>
	۱ نوزاد	۴ ساعت (دارای عقریه ثانیه شمار) یا کرنومتر <sup>(۳)</sup>
	۱ عدد در هر تراالی	۵ ملحفه گرم <sup>(۴)</sup>
	۱ حلقه از هر کدام در هر تراالی	۶ گوشی پرسکی
	۱ عدد از هر کدام در هر تراالی	۷ نوارچسب ۱,۲ یا ۳,۴ یا ۱۰۰
او ۳ می سی ۴ عدد و سایر موارد ۳	۱۰ نوزاد از هر کدام	۸ راه هوایی دهانی - حلقی در اندازه های ۰، ۰۰، ۰۰۰
عدد در هر تراالی		۹ سرنگ های ۱، ۱۰، ۳۵، ۲۰ و ۵۰ می سی سی
۵ عدد از هر کدام در هر تراالی	۱۰ نوزاد از هر کدام	۱۰ سر سوزن های شماره ۱۸، ۲۱ و ۲۵
-	۱ عدد در هر بخش زایمان*	۱۱ مانیتور قلبی و الکترودهای مربوطه
۱ عدد در هر بخش زایمان*	۲ عدد در هر بخش زایمان*	۱۲ پالس اکسیمتر و پرورب مربوطه
۱ عدد در هر بخش زایمان*	۲ عدد در هر بخش زایمان*	۱۳ مخلوط کننده اکسیژن و هوا
۱ عدد در هر بخش زایمان*	۲ عدد در هر بخش زایمان*	۱۴ منبع هوای فشرده
	۵ عدد در هر تراالی*	۱۵ کیسه پلاستیکی قابل بسته شدن (اندازه چهار و نیم لیتری)
	۱ عدد در هر بخش زایمان*	۱۶ پد های گرم کننده شیمیایی
	۱ عدد	۱۷ دستگاه ساکشن
	۱ عدد	۱۸ دستگاه تی پیس: ۱ عدد در هر بخش زایمان*
وسائل ساکشن		
۱ پوار <sup>(۵)</sup>		ب
۵ عدد از هر کدام در هر تراالی	۱۰ از هر کدام	۱ کاتتر های ساکشن به شماره های
۱ عدد در هر تراالی	۳ عدد	۲ کشنده مکر نیوم و لوله آن
۵ عدد از هر کدام در هر تراالی	۱۰ از هر کدام	۴ لوله تغذیه به شماره و سرنگ ۲۰ میلی لیتر
وسایل بگ و ماسک		
۲ عدد در هر تراالی	۱ بگ وابسته به جریان:	۱ بگ خود منسخ شونده یا بگ وابسته به جریان:
۲ عدد در هر بیمارستان دارای NICU	۳ عدد	۲ دستگاه تی پیس احیاء نوزاد
۱ عدد از هر کدام در هر تراالی	۳ عدد از هر کدام در هر تراالی	۲ ماسک های صورت با اندازه های نوزاد ترم و نارس
وسایل لوله گذاری		
۱ لارنگوستکوب با تیغه های ۰ و ۱		۱ لارنگوستکوب با تیغه های ۰ و ۱
۲ لوله های تراشه با قطر داخلی ۳,۵، ۲,۵ و ۴ میلیمتر		۲ لوله های تراشه با قطر داخلی ۳,۵، ۲,۵ و ۴ میلیمتر
۳ عدد از هر کدام در هر تراالی	۱ عدد در هر تراالی	۳ استیلت (اختیاری)
	۱ عدد در هر تراالی	۴ قیچی
	دو عدد در هر تراالی	۵ نوارچسب/ وسایل ثابت نگهداشت لوله تراشه
	۱ ظرف در هر تراالی	۶ پنبه
	۱ شیشه در هر تراالی	۷ الكل
	۱ عدد در هر بخش زایمان	۸ ماسک حنجره ای (اختیاری)

بسته خدمتی احیاء نوزاد

طبقه بندی

## شناسنامه ترالی اورژانس برای احیاء نوزاد - ادامه

حدائق موجودی	میزان نیاز کلی		
		وسایل کاتربیزاسیون عروق نافی	۵
	۱ عدد در هر ترالی	محلول ضد عفونی کننده	۱
	۱ عدد در هر ترالی	اسکالپل یا قیچی	۲
	۱ عدد در هر ترالی	نوار نافی یا نخ بخیه ۰ یا ۳۰	۳
۳ عدد از هر کدام در هر ترالی	۱:۲۰ نوزاد از هر کدام	کاتتر نافی شماره های ۳/۵ و ۵	۴
۳ عدد از هر کدام در هر ترالی	۱:۲۰ نوزاد از هر کدام	سه راهی مخصوص	۵
۳ عدد		شان پارچه ای سیز	۶
<b>داروها</b>		<b>۵</b>	
	۵ عدد در هر ترالی	آپی نفرین ۱:۱۰۰۰ آمپول های ۱ سی سی	۱
	۲ عدد از هر کدام در هر ترالی	سرم کریستالویید ایزوتوون (نرمال سالین / رینگر لاكتات)	۲
	۲ عدد از هر کدام در هر ترالی	بیکربنات سدیم ۸/۴ درصد ویال ۵۰ سی سی	۳
	قابل دسترس در بخش	تالوکسان هیدروکلرید ۰،۴ میلی گرم در میلی لیتر	۴
	۳ عدد در هر ترالی	سرم قندی ۱۰ درصد	۵

زنگنه

## ضمیمه ششم: فرم ارزیابی کارگاه احیاء نوزاد (ویژه ارائه دهنده خدمت)



### فرم ارزیابی کارگاه احیاء نوزاد

(ویژه ارائه دهنده خدمت)



بیمارستان . . . . .

تاریخ: .....

#### اهداف کارگاه

شما در پیشانی کارگاه باید بتوانید:

۱. تغییرات فیزیولوژیکی که در هنگام تولد نوزاد رخ می دهد را توضیح بدهید.
۲. مهمترین و موثر ترین اقدامات عملیات احیاء نوزاد را بیان کنید.
۳. در هر تولد، پرسنل و تجهیزات مورد نیاز برای اطمینان از آمادگی یک عملیات احیاء کامل را مشخص کنید.
۴. با قبول شدن در آزمون نوشتاری برنامه احیاء نوزاد دانش خود را در احیاء نوزاد به نمایش بگذارید.
۵. مداخلات مناسب احیاء را در توالی زمانی مناسب برای یک نوزاد در معرض خطر به نمایش بگذارید.

۱- به نظر شما کارگاهی که شما با موفقیت پشت سر گذرانده اید توانسته است شما را به اهداف فوق برساند؟

خیر       بله

لطفاً به موارد زیر از یک تا پنج نمره بدهید (۱ = کمترین / ۵ = بیشترین)

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
- ۲- محترمای آموزشی نظام مند و روشن بود.
  - ۳- مربی (ها) در رابطه با موضوعات کارگاه از لحاظ علمی اشراف داشتند.
  - ۴- برای دستیابی به اهداف کارگاه تمامی مواد مورد نیاز فراهم شده بود.
  - ۵- درستname، ستاریو های احیاء و کارهای عملی قابل استفاده و سودمند بود.
  - ۶- دانش و مهارت ارائه شده با محیط کاری شما مناسب و مفید بود.
  - ۷- شما به اهداف شخصی خود رسیدید.
  - ۸- محیط کارگاه برای آموزش شما مساعد بود.

**کم لطفاً نقطه نظرات خود را در مورد کارگاه و پیشنهادات شما برای بهتر شدن آن را بنویسید:**

---



---



---



---



---

## ضمیمه هفتم: فرم ارزیابی کارگاه احیاء نوزاد (ویژه ارائه دهنده خدمت)



## فرم ارزیابی کارگاه احیاء نوزاد

(ویژه مریبی بیمارستانی)



بیمارستان/سازمان .....

تاریخ: .....

امکانات و تسهیلات کارگاه چگونه بود؟  بسیار خوب  خوب  مناسب  ضعیف

لطفاً با پاسخ دادن به سوالات زیر به ما در بهبود و تکامل کارگاه هایی که در آینده برگذار می شوند کمک کنید:

لطفاً به موارد زیر از یک تا پنج نمره بدھید (۱ - کمترین / ۵ - بیشترین)

- ۱ - این کارگاه تمام نیاز های من را در احیاء نوزاد مرتقب کرد  
به من در مورد موضوعات زیر کمک کرد:
- ۲ - تشریح مشا و اهداف برنامه احیاء نوزاد (NRP)
  - ۳ - تشریح چگونگی تدوین این برنامه از راهنمایی بالینی مبتنی بر شواهد
  - ۴ - فراگرفتن جهار اصل بنیادین کارگاه احیاء نوزاد را
  - ۵ - آشنا شدن با سه روش تدریس احیاء نوزاد
  - ۶ - آشنا شدن با پیش نیاز های تبدیل شدن به یک مریبی بیمارستانی موفق
  - ۷ - آشنا شدن با مسئولیت ها و شایستگی های یک مریبی بیمارستانی احیاء نوزاد
  - ۸ - آشنا شدن با مطالبی که در کارگاه احیاء نوزاد باید آموخت بدhem
  - ۹ - آشنا شدن با تفاوت کارگاه ارائه دهنده خدمت و بازآموزی احیاء نوزاد
  - ۱۰ - آشنا شدن با منابع علمی مورد نیاز برای مریبگری احیاء نوزاد
  - ۱۱ - آشنا شدن با چگونگی استفاده از چکلیست کارآیی و ارزیابی مگاکد
  - ۱۲ - آشنا شدن با نکات کلیدی هر درس
  - ۱۳ - آشنا شدن با چونگی ثبت اطلاعات مربوط به کارگاه
  - ۱۴ - جامانع علمی تحت وب برای مریبی گری احیاء نوزاد آشنا شدم
  - ۱۵ - آشنا شدن با نقش مریبی احیاء نوزاد در نگهداری از برنامه احیاء نوزاد در بیمارستان
  - ۱۶ - آشنا شدن با چگونگی برنامه ریزی برنامه های آموزشی اختیاری مرتبط
- کله لطفاً نقطه نظرات خود را در مورد کارگاه و پیشنهادات شما برای بهتر شدن آن را بنویسید:

کله مفید ترین موضوع ارائه شده در طی کارگاه چه بود؟