



نکات کلیدی آموزش همگانی

- استرس و بیماریهای قلبی عروقی
- سکته قلبی
- دیابت
- راه های جلوگیری از سرطان
- فشار خون
- ورزش بعنوان جزیی از برنامه روزانه
- آسم

واحد آموزش سلامت بیمارستان بنی‌الهادی

۱۳۹۶ پاییز

استرس و بیماریهای قلبی عروقی

علاوه بر عوامل خطر اصلی ابتلا به بیماری قلبی (کلسترول بالا، فشارخون بالا، عدم فعالیت جسمانی، استعمال سیگار و دیابت) استرس (تنش عصبی) نیز ممکن است یک عامل تاثیرگذار باشد. بررسی اثر استرس روی سلامت قلب و ارزیابی کمیت استرس دشوار است چرا که افراد مختلف سطوح متفاوت استرس را دارند و همچنین پاسخ‌های مختلفی به استرس می‌دهند.

حقوقان ثابت کرده اند که استرس به روش‌های مختلفی می‌تواند بر روی سلامت قلبی شما تأثیر بگذارد :

- ❖ در شرایط استرس، بدن هورمون‌هایی را ترشح می‌کند (اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین) که موجب افزایش فشارخون می‌شود و در طول زمان به پوشش داخلی سرخرگ‌ها آسیب می‌زند. با ترمیم سرخرگ‌ها آنها ضخیم‌تر شده و میزان رسوب پلاک افزایش می‌یابد.
- ❖ شرایط استرس زا ممکن است ضربان قلب و فشارخون را افزایش دهند و در نتیجه قلب نیاز به اکسیژن بیشتری در این شرایط داشته باشد. در برخی از افراد مبتلا به بیماری قلبی، این افزایش نیاز به اکسیژن می‌تواند منجر به درد قفسه سینه (آئریز) شود.
- ❖ استرس سبب افزایش عوامل لخته کننده در خون می‌شود که خود موجب افزایش احتمال تشکیل لخته و انسداد سرخرگ‌ها بويژه در مواردی می‌گردد که تا حدودی بوسیله پلاک دچار گرفتگی شده‌اند.

افراد مختلف جهت مواجهه با استرس از روش‌های مختلف و متعددی استفاده می‌کنند (مانند پرخوری، استعمال سیگار و مصرف بیش از حد الکل) و بدینوسیله منجر به آسیب‌زدن به دستگاه قلبی‌ریوی خود می‌شوند و شهادت‌های کنترل استرس و تنش‌های عصبی.

نکته مهم این است که هر انسانی به شکل متناوب و یا در بیشتر اوقات دچار استرس می‌شود. شما ممکن است علایم استرس را به شکل در مقابله با عفونت‌های خفیی مانند سرماخوردگی، بی‌خوابی یا احساس اضطراب یا تحریک‌پذیری حس کنید. ممکن است برخی مکانیسم‌های ناسالم مقابله با استرس را نیز در بدن خود شناسایی کنید (برای مثال افزایش وزن ناشی از غذا خوردن بیش از حد یا شروع به استعمال دخانیات در هنگام استرس).

فراغیری مدیریت استرس، برای سلامتی مفید است. البته پیش از آنکه محققین روش‌های کنترل استرس را در درمان بیماری‌های قلبی‌عروقی توصیه کنند، باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. در اغلب موارد اگر شما و پزشکتان بر این عقیده‌اید که استرس برای سلامتی شما مضر است، می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را جهت مدیریت استرس بکار ببرید که عبارتند از :

- با خانواده و دوستان خود در مورد مشکلاتی که شما را ناراحت می‌کنند، صحبت کنید. عشق و حمایت آنها در کاهش شرایط استرس زا به شما کمک می‌کند.

اگر در زندگی حس عجله بدليل ضرورت انجام کارهای مختلف بصورت هم زمان دارید، روش های "مدیریت زمان" جهت اولویت بندی و تنظیم انتظارات واقع گرایانه به شما کمک می کنند. محیط کار، کتابخانه یا اینترنت ممکن است روش های خاصی را پیشنهاد دهنند. همچنین در پذیرش پروژه ها و پیشنهادات جدید کاری با احتیاط عمل نمایید.

از تکنیک های آرامبخشی مانند یوگا، مدیتیشن یا بیوفیدیک استفاده کنید و زمانی را به تمرین منظم این موارد اختصاص دهید. گرچه هیچ تضمین قطعی پزشکی وجود ندارد که این روش ها بتوانند فشارخون شما را کاهش دهند، ولی تحقیقات امیدوار کننده ای در این زمینه وجود دارد.

اگر می دانید که مشکل خاصی سبب بروز اضطراب در شما می شود با پزشک یا مشاور بهداشتی خود در مورد مراکزی صحبت کنید که جهت رفع این مشکل می توانند به شما کمک نمایند. این کمکها در مراکز اجتماعی، بیمارستان ها و اماكن مذهبی موجود هستند.

مشاوره تخصصی یا روان درمانی در طول برخی از موارد دشوار، ممکن است به شما کمک کنند. پزشک می تواند شما را به یک فرد متخصص ارجاع دهد. اگر مصرف داروهایی مانند ضدافسردگی ها برای شما مفید باشد، پزشک یا روان پزشک این داروها را برای شما تجویز می کنند و مشاوره های لازم را به شما می دهند.

از درمان ترکیبی استفاده کنید: رژیم سالم غذایی، ورزش منظم (صفحه ۱۲۵)، عدم مصرف الکل و محدودیت مصرف کافئین و عدم استعمال دخانیات.

اوین گام، مدیریت استرس و پیشگیری از بروز آن است که بویژه در افراد با سابقه حمله قلبی یا سکته مغزی بسیار مهم می باشد. پیشگیری از بروز یک حمله قلبی یا سکته مغزی دیگر (که پزشکان آن را پیشگیری ثانویه می نامند) هدف اصلی تیم پزشکی می باشد. همان گونه که بارها در این کتاب ذکر شده است، تغییرات سالم در شیوه زندگی اساس پیشگیری (پیشگیری ثانویه) می باشد.

مدیریت استرس باید یکی از کانون های توجه و پر اهمیت تغییرات سالم در شیوه زندگی مثل کنترل سطح کلسیترول خون، کنترل فشارخون، کاهش وزن در صورت نیاز، ورزش منظم و قطع استعمال دخانیات باشد. افسردگی ممکن است با استرس مرتبط باشد و اختلالی است که نیاز به درمان دارد.

البته توجه داشته باشید که احساس درجات اندکی از افسردگی و ناراحتی پس از حمله قلبی یا سکته مغزی طبیعی است.

اگر شما دچار افسردگی پایدار گردید، باید به این نکته مهم توجه نمایید که وضعیت مزبور درمان پذیر است و مجبور به زندگی دائمی با آن نیستند (صفحه ۳۵۳). عالیم افسردگی عبارتند از: دوره های طولانی مدت احساس ناراحتی یا ناتوانی در برخورد با مشکلات، حس شدید گناه، احساس بیش از حد نا امیدی و یأس و عدم وجود اشتیاق برای لذت بردن طبیعی از زندگی (مثل رابطه جنسی)، تغییرات غیرطبیعی وزن (کاهش یا افزایش غیرعمدی وزن) و مشکل در ارتباط برقرار کردن با افراد مورد علاقه و همکاران. اگر شما یا فرد مورد علاقه تان دچار افسردگی شده اید، برای درمان به پزشک مراجعه نمایید. وی به شما درمانهای دارویی یا مشاوره را پیشنهاد خواهد کرد یا شما را به روان پزشک یا سایر متخصصین سلامت روانی ارجاع خواهد داد.




در مورد سکته قلبی بیشتر بدانیم

عضله قلب داراًی عروق خونی مهمی است بنام شریان و ورید. شریان های اصلی که اکسیژن و مواد غذایی را به قلب عرضه می کنند شریان های کرونر نامیده می شوند. این شریان ها از شریان آئورت در قسمت بالای قلب منشعب می شوند و به قسمت های انتهایی قلب نفوذ می کنند. حمله قلبی در اثر مسدود شدن این شریان ها توسط کلسترول رخ می دهد. کلسترول نوعی چربی است که در غذاهای حجمی و سرخ کرده فوری وجود دارد. اصطلاح پزشکی حمله قلبی، انفارکتوس قلبی است و به معنی مرگ عضله قلب است.

عوامل خطر: جنس مذکور ، استعمال دخانیات ، چاقی ، فشار خون بالا ، کلسترول بالا ، قند خون بالا ، استرس و سابقه خانوادگی بالا قلب شما مانند یک کیف عضلانی است که خون را به همه قسمت های بدن می فرستد. حال اگر کلسترول شریان های تغذیه کننده خود قلب را مسدود کند اکسیژن به عضله قلب نرسیده و درد قفسه سینه رخ می دهد و چنانچه تحت درمان قرار نگیرد مرگ عضله قلب رخ می دهد. از این رو هر دقیقه تاخیر بسیار مهم است. لذا در صورت بروز علائم صبر نکنید و فوراً در خواست کمک نمائید.

علائم:



در صورت ابتلا به دیابت ممکن است درد حس نشود، چرا که قند بالا در دراز مدت اعصاب را از بین می برد. این افراد بیشتر ضعف و بی حالی دارند . نخستین اقدام درمانی عبارت است از مراجعة اورژانس به بیمارستان بعد از اقدامات در اورژانس بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل و در استراحت مطلق قرار می گیرد . برای بیمار اکسیژن، مسکن و سایر درمان های دارویی تجویز می شود . ممکن است از ترکیباتی استفاده شود که لخته خون در عروق کرونر را حل کند .

در مرحله دوم یا در مراکز مجهز به آزمایشگاه کاتتریسم ، بیمار تحت عمل آنژیوگرافی(عکسبرداری از شریان کرونر) قرار گرفته و در صورت گرفتگی رگ آنژیو پلاستی و استنت گذاری می شود. گاهها ممکن است جراحی پیوند عروق کرونر برای بیمار مناسب باشد .

برای پیشگیری داشتن الگوی زندگی سالم مثل: رژیم کم چربی، ورزش، ترک سیگار، کنترل فشار خون و قند خون و کم کردن استرس لازم است .

دیابت

- دیابت نوعی بیماری است که بدن در آن انسولین نمی سازد، یا نمی تواند به انسولین ساخته شده پاسخ دهد.
- انسولین هورمونی است که توسط پانکراس ترشح شده و مسئول انتقال گلوکز به سلول های بدن است.
- در **دیابت نوع I** (دیابت وابسته به انسولین)؛ پانکراس توانایی تولید انسولین خود را از دست می دهد و قند خون پس از مصرف غذا کاهش می یابد.
- **دیابت نوع II** (دیابت غیروابسته به انسولین)؛ ابتدا سلول های بدن به انسولین مقاوم شده اند که بعدها می تواند به کاهش تولید انسولین نیز منجر گردد.^[۲]

* دیابت نوع II ۹۰٪ دیابتی ها را شامل می شود.

علائم دیابت نوع یک: پرنوشی، پرادراری، پرخوری.

علائم دیابت نوع دو: مهمترین علامت دیابت نوع دو بی علامتی است. به دلیل افزایش تدریجی قند در این گروه اغلب علامتی وجود ندارد و یا غیر اختصاصی هستند. برخی از علائم عبارتند از: خستگی و بی حوصلگی، کم شدن وزن بدن و لاغری، تاری دید، تاخیر در بهبودی زخم ها.

- بعضی از داروهای گیاهی که می توانند در تنظیم سطح گلوکز خون یا سایر علائم دیابتی کمک کننده باشند شامل: شنبلیله، توت، سیر، پیاز، فلفل قرمز.

درمان های کاهنده استرس نیز می توانند در درمان دیابت موثر باشند و نیاز به انسولین را کاهش دهند.

- دیابت نوع دو بیشتر در افرادی بروز می کند که دارای اضافه وزن بوده و ورزش نمی کنند.
- در دیابت نوع دو سن (بالاتر از ۴۰ سال)، چاقی، تاریخچه خانوادگی در ابیلا به دیابت نقش اصلی را بر عهده دارند.
- در بسیاری از افراد مبتلا به دیابت، رژیم غذایی مناسب در کنار ورزش منظم روزانه می تواند به بیمار در کاهش وزن کمک کرده و سلامتی او را ارتقاء بخشد.
- دیابت نوع ۲ با کاهش وزن می تواند تا حد زیادی تحت کنترل قرار گیرد.
- کربوهیدرات ها ترکیباتی هستند که در دستگاه گوارش تجزیه شده و به قند تبدیل می شود.

کربوهیدراتات تصفیه شده: نان سفید، انواع شکر، کیک و شیرینی، دسرها و بستنی، ماست میوه ای و شیر شیرین شده، آب نبات ها، ژله، برنج سفید، شیرینی ها.

کربوهیدراتات کامل و پرفیبر: نان های کامل سبوس دار، برنج قهوه ای (سبوس دار)، غلات تهیه شده از سبوس، آرد های سبوس دار، سبزی ها، میوه ها، حبوبات. فیبرها در بدن هضم و جذب نمی شوند و اثرات بسیار محدودی بر سلامتی دارند؛ مانند: کاهش جذب چربی و کلسترول، دفع ترکیبات پرکالری رژیم، کمک به کاهش خون. اغلب کربوهیدراتات از منابع گیاهی، سبزیجات و غلات به بدن می رسانند.

منابع فیبر: سبوس، غلات و حبوبات کامل (سبوس دار)، سبزی ها و میوه ها. فیبرها به جذب آب کمک کرده و حرکت غذا در طول دستگاه گوارش را کند می کنند. بدین وسیله فرد احساس سیری بیشتری می نماید.

توصیه ۱: در میان وعده ها از گروه گوشت ها ، سبزیجات و کم لبندی استفاده کنید؛ و نوشیدن آب کافی را فراموش نکنید.

توصیه ۲: تقسیم کردن وعده های اصلی به چند وعده و کاهش حجم هر وعده.

توصیه ۳: در غذاهای اصلی از غذای پر فیبر و پر پروتئین استفاده کنید؛ یک میان وعده دلخواه که فرد مجاز باشد به شرط مصرف مقدار مساوی پروتئین، سبزیجات کم کربوهیدرات، غذاهای پر کربوهیدرات در روز مصرف کند در نظر بگیرید.

توصیه ۴: تمرینات ورزشی و کاهش در غذاهای پر کربوهیدرات و جلوگیری از آزاد شدن انسولین اضافی.

توصیه ۵: افراد مبتلا به دیابت، هرگز نباید یکی از وعده های اصلی غذاهای خود را حذف کنید.

توصیه ۶: از میوه های غیر شیرین و سبزی ها در وعده های غذایی به مقدار زیاد استفاده کنید.

توصیه ۷: مصرف میوه های شیرین مانند انگور، خربزه، توت و خشکبار شیرین را در برنامه غذایی محدود کنید.

توصیه ۸: از مواد نشاسته ای به میزانی که موجب افزایش وزن نشود، مصرف نمایید.

توصیه ۹: مواد غذایی ساده مانند شکر، آبنبات و غیره را مصرف نکنید.

توصیه ۱۰: غذاها را به شکل آپز و کبابی مصرف کنند.

توصیه ۱۱: وعده های غذایی باید به طور منظم و در ساعت مقرر مصرف شوند؛ تغییر ساعت سبب نوسان قند خون می گردد.

توصیه ۱۲: از مصرف غذاهای پرچرب و سرخ شده باید پرهیز شود.

توصیه ۱۳: نان های مصرفی بهتر است از آرد سبوس دار باشد مانند سنگ و جو.

توصیه ۱۴: سالادهای مصرفی را بدون سس و با چاشنی هایی نظیر آب لیمو ترش یا نارنج.

توصیه ۱۵: مصرف نمک را تا حد امکان کم نمایید.

توصیه ۱۶: از غذاهای آماده و کنسروی استفاده نکنید.

راه های جلوگیری از سرطان

سرطان یک فرآیند پویا است که توسط متغیرهای ناشناخته و مستقل متعددی موجب تغییرات مولکولی سلول شده و منجر به تداخل در سیستم تکثیر سلول می شود.

اولين تغيير سلولي آشكار در پيدايش سرطان، تغيير شكل سلول است.

عواملی که به ايجاد سلولهای سرطانی کمک می کنند عبارتند از:

استعداد ميزبان : عوامل ژنتيکي از جمله نقايصي در کروموزوم ها و يا انتقال ژن معيب به جين عوامل ايمنوژويك (ایمنی)؛ مانند نارسايی مکانيسم ايمني طبیعی بدن

داروهای سرکوبگر ايمني : موجب سرکوب مکانيسم ايمني طبیعی شده و زمينه ابتلاء به سرطان را فراهم می کنند.

عوامل محيطي : تماس با مواد سرطان زا مانند پرتونگارها و راديوم ، پرتوهای یونيزه شامل امواج الکترومغناطيسي

وپرسهای القا کننده سرطان : وپرسهایی هستند که می توانند مولکول DNA سلولی را آلوده کرده و تغيير دهند و در نتيجه منجر به تکثیر خارج از کنترل سلولهای مورد نظر شوند. اين تکثیر فراينده موجب ايجاد تومور ياسرطان می شود.

عوامل هورمونی : ترشح هورمونی اغلب موجب تسریع روند بدخیمی بیماری می شود.

یکسری از عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان قابل تغییرند مثل:

- توتون و تنباکو (90% از سرطان های ریه ناشی از مصرف توتون می باشند ، در ضمن در سرطانهای حنجره، حلق، مری، مثانه، پانکراس، کلیه و دهانه رحم نیز تأثیر دارد)
- رژیم غذایی (%) ۳۰ از سرطان ها به رژیم غذایی مربوط هستند، غذای پرچرب باعث افزایش ابتلا به سرطان روده بزرگ و پستان؛ غذاهای دودی و نمک سود ، ترشیجات و غذاهای کنسروی که حاوی مواد نگهدارنده نیتراتی هستند باعث افزایش سرطان مری، معده و حلق می شوند.
- عادت جنسی ...
- الكل (باعث افزایش سرطان دهان، حلق و مری و کبد می شود).
- عومنت هپاتیت B (باعث افزایش سرطان کبد می شود).
- مواجهه شغلی با عوامل سرطانزا (نیز باعث افزایش بعضی از سرطان ها می شود.)
- بعضی از انواع سرطان های پستان و سرطانهای روده بزرگ ارثی می باشند.

روش های کاهش خطر ابتلا به سرطان:

- ❖ اجتناب از سیگار کشیدن
- ❖ اجتناب از چاقی
- ❖ فعالیت بدنی روزانه در هوای خنک
- ❖ مصرف زیاد میوه و سبزیجات
- ❖ اجتناب از مواجهه زیاد با نور خورشید
- ❖ عدم مصرف الكل
- ❖ واکسیناسیون علیه هپاتیت B

چرا خطر سرطان در افراد مسن افزایش پیدا می کند؟

سلول های بنیادی در افراد پیر قادر تولید سلول های ایمنی کمتری دارند . مغز استخوان در بدن افراد مسن سلول های ایمنی کمتری تولید می کند، بنابراین احتمال به سرطان خون در افراد مسن بالاتر است.

محققان بر روی موش های آزمایشگاهی جوان سلول های بنیادی پیر پیوند زدند . آنها انتظار داشتند که سلول های بنیادی پیر بعد از پیوند همان توانایی سلول های جوان را داشته باشند و سلول های ایمنی تولید کنند ولی سلولها درست مثل سلولهای پیر رفتار کردند . یکی از پژوهشگران در مقابل این عکس العمل سلول ها گفت اگر تفاوت سلول های بنیادی پیر و جوان را بدانیم در آن صورت می توان سلول های پیر را وادر به جوان شدن کرد . با این دانش کارآیی ایمنی دفاعی بدن افراد پیر را می توان بهبود بخشید و از سرطان خون جلوگیری کرد .

نکات بهداشتی در پیشگیری از سرطان:

- (۱) به خاطر داشته باشید، دادن اطلاعات دقیق و صحیح در مراجعه پزشکی، باعث تشخیص و درمان موثرتر می شود
- (۲) دود سیگار حاوی ۴۳ ماده سرطانزا است . اگر تا به حال سیگار نکشیده اید، هرگز آن را شروع نکنید و اگر سیگار می کشید، سعی در کاهش تعداد و نهایتاً ترک آن کنید.
- (۳) ظروف پلاستیکی را برای گرم کردن غذا در ماکروف نگذارید. گرم کردن غذا در این نوع ظرفها، باعث آزاد شدن دایوکسین می شود
- (۴) با استفاده از کرم های ضد آفتاب از خودتان در مقابل تابش مستقیم و شدید نور خورشید محافظت کنید.
- (۵) در بطری های پلاستیکی آب را منجمد نکنید چون دایوکسین آزاد می شود.
- (۶) از پوشش های نازک پلاستیکی در ماکروف استفاده نکنید چون دایوکسین آزاد می شود.

- ۷) شکر کمتر مصرف نمائید زیرا شکر یک ماده غذایی برای سلول های سرطانی است.
- ۸) از گوشت سفید مثل مرغ و ماهی به جای گوشت قرمز استفاده کنید.
- ۹) در رژیم غذایی خود از مواد غذایی متنوع و بخصوص موادی که حاوی الیاف گیاهی (فیبر) زیاد می باشند مانند سبزیجات و میوه های تازه استفاده نمائید و چربی حیوانی را کمتر مصرف کنید.
- ۱۰) از مصرف قهوه، چای، شکلات و هر ماده غذایی با کافئین بالا پرهیز و بجای آنها از چای سبز استفاده کنید.
- ۱۱) از مصرف مشروبات الکلی پرهیز نمائید.
- ۱۲) شاداب باشید و مثبت بیاندیشید و از عصبانیت و پریشانی دوری کنید.
- ۱۳) اکسیژن دریافتی خود را بیشتر کنید. اکسیژن مانع رشد سلول های سرطانی می شود.
- ۱۴) هوشیار باشید و به علائم بیماریها بخوبی توجه کرده و به موقع به پزشک مراجعه نمائید.
- ۱۵) اگر با بروز اولین علائم پزشکی برای معالجات مراجعه کنید، روند درمان سرعت یافته و تسهیل می شود.
- ۱۶) بررسی علائم پاراکلینیکی سرطان ها در زمانها و سن مناسب تحت نظر پزشک.
- ۱۷) معاینه سینه ها در بانوان به صورت ماهیانه انجام گیرد. معمولاً توده های پستانی در خانمهای توسط خودشان تشخیص داده می شود.

فشار خون

تعریف فشار خون Pressure Blood : فشارخون عبارت از نیروی است که در اثر برخورد خون با دیواره سرخرگها بوجود می آید و سبب جریان خون از قلب به قسمتهای دیگر بدن می شود .

علت فشار خون بالا : بیماری فشارخون بالا میتواند به دلیل بیماریهای کلیه ، غدد ، نا هنجاریهای عروقی باشد. اما در ۹۰ % بیماران علت مشخصی برای با لا بودن فشار خون وجود ندارد .

علائم فشار خون بالا : این بیمار می تواند سالها بدون علامت باشد و یا ممکن است با علائمی مانند درد ناحیه پس سر ، بخصوص صبح ها هنگام بیدار شدن از خواب ، سرگیجه، خستگی ، تپش قلب همراه باشد . علائمی مانند تنگی نفس شبانه ، خواب آلودگی و اغما در موارد حاد بیماری دیده می شود .

فشار خون طبیعی در چه اندازه است؟ فشار خون طبیعی می شود گفت حدوداً باید کمتر از ۱۳۰/۸۵ روی ۸۵ باشد که به صورت ۱۳۰/۸۵ نمایش داده می شود. و وقتی که فشار به ۱۴۰/۹۰ و یا بیشتر بر سر بیمار افزایش فشار خون دارد.

اگر بیماری فشار خونش بین ۱۲۰/۸۰ تا ۱۴۰/۹۰ نوسان داشته باشد باید بداند که درآینده در خطر افزایش فشار خون خواهد بود و به عبارت دیگر می شود گفت که پیش در آمد بیماری را دارد که در اصطلاح پزشکی به نام Almost Hypertension و یا Prehypertension نامیده می شود. ناگفته نماند شماره ذکر شده برای افرادی است که هیچگونه بیماری دیگری نداشته باشند . اگر چنانچه بیمار به طور مثال گرفتار بیماری دیابت هم باشد در این صورت فشار طبیعی برای او بهتر است که ۱۱۰/۷۰ باشد. و یا اگر بیمار گرفتار بیماریهای کلیوی و یا هر گونه بیماری دیگری باشد درجه اش متفاوت خواهد بود. با درنظر گرفتن وضع بیمار گرفتاری افزایش فشار خون او به توسط پزشک محک زده می شود. دوباره یاد آور می شوم در این مقاله سخن بر سر بیمارانی است که فقط بیماری افزایش فشار خون دارند، نه آنان که درگیر بیماریهای سیستمیک دیگری هستند.

چه زمان باید فشار خون را اندازه گرفت؟ اندازه گیری فشار خون برای همه و حتی کودکان نیز باید انجام شود. و در زمان معاینه سالیانه پزشکی شما فشار خون شما بررسی خواهد شد. حال اگر کسی گرفتار به بیماری افزایش فشار خون باشد مسلماً به دفعات بیشتر باید فشار خون اش بررسی شود.

عوارض افزایش فشار خون چیست؟ افزایش فشار خون به رگهای شما آسیب می رساند و در اثر آسیب رگهای بدن خطر نارسائی کلیوی، نارسائی قلبی، سکته قلبی و سکته مغزی بالا می رود.

بیماری فشار خون چگونه درمان می شود؟ اگر شما افزایش فشار خون دارید در این مورد به پزشک خود باید مراجعه کنید و او شما را راهنمائی و درمان خواهد کرد. درمان اولیه و قدم اول تغییر روش زندگی است. این دگرگونی ممکن است به تنها ی باعث پایین آوردن فشار خون و کاهش عوارض جانبی آن بشود. اگر این دگرگونی که با راهنمائی پزشک معالج انجام می دهیم به سامان نرسد بیمار ممکن است احتیاج به دارو درمانی پیدا کند.



اگر افزایش فشار خون دارید نکات زیر را در زندگی روزانه بررسی و رعایت نمایید.

- ۱- از کشیدن سیگار و یا هر گونه توتون و تنباکو پرهیز کنید و اگر چنانچه سیگار می کشید کوشش فراوان کنید که در اولین فرصت هر چه زودتر کنارش بگذارد.
- ۲- اگر افزایش وزن دارید با رژیم آن را کاهش دهید.
- ۳- از خوراکی های سالم مانند سبزیها، میوه ها و خوراکیهای کم چرب نوش جان کنید.
- ۴- کوشش کنید که از میزان نگرانی های روزانه هر چه ممکن است بکاهید.
- ۵- مقدار مصرف نمک، الکل و کافئین را به حداقل ممکن برسانید.

چگونه سیگار سبب افزایش فشار خون می شود؟ نیکوتین موجود در سیگار و تنباکو سبب تنگ شدن عروق و افزایش ضربان قلب می شود که خود هر دو سبب افزایش فشار خون می شود. با قطع سیگار بیماری فشار خون شما بهترمی شود. فشار خون شما کاهش می یابد و بعلاوه خطر بیماری قلب و سکته قلبی نیز کمتر خواهد شد.

پائین آوردن وزن بدن و ورزش چه اثری در بهبودی بیماری فشار خون دارد؟ در اکثر افرادی که افزایش وزن و چاقی مفرط دارند کاهش وزن سبب کاهش فشار خون می شود. ورزش و فعالیت فیزیکی هم چون به کاهش وزن کمک می کند سبب پایین آوردن فشار خون می شود. هم چنین به نظر می رسد که ورزش خود به تنها نیز سبب پایین آوردن فشار خون می شود.

چگونه نمک را کنترل کنیم؟ استفاده از نمک در بسیاری از بیماران سبب افزایش فشار خون می شود. بنابراین آنان که گرفتار افزایش فشار خون هستند نباید بیشتر از ۲۴۰۰ میلی گرم نمک در روز توسط مواد غذایی مصرفی روزانه دریافت کنند. این مقدار تقریباً برابر است با $1\frac{1}{4}$ یک قاشق چایخوری می شود. ولیکن در برخی از بیماران باید حتی از این مقدار هم کمتر بخورند که این مقدار را پزشک معالج برای اینگونه بیماران مشخص خواهد کرد.

هرگز به غذای خود سر میز نمک نپاشید. هرنوشابه و یا غذای آمده که از فروشگاه می خرید حتماً به میزان نمک موجود در آن که اکثراً به نام Sodium می نویسند توجه کنید. وقتی که همین نوشابه های مشابه کوکاکولا و یا پیپسی و یا هر نوع دیگر و یا چیپس را توجه کنید، متوجه می شوید

که تا چه مقدار زیادی حاوی نمک سدیم هستند. و یا شاید حیرت زده شوید که تا چه مقدار زیادی نمک در نان روزانه مصرفی دریافت می کنید. در مورد ایرانیها، به ویژه پنیری که هر روز استفاده می کنیم به میزان بسیار زیادی نمک وارد بدن ما می سازد.

نوشابه های الکلی چه اثری در بدن دارند؟ مصرف الکل در برخی از افراد فشار خون را بالا می برد. اگر الکل می نوشید بیش از یک بار در شبانه روز مصرف نکنید. شما می توانید یک قوطی آبجو یا یک گیلاس شراب و یا اندرکی الکل قوی تر مثل ویسکی و یا کنیاک در شبانه روز بنوشید. اگر پس از نوشیدن الکل متوجه شدید که فشار خون شما بالا می رود در این صورت باید از نوشیدن حداقل الکل هم صرف نظر بفرمایید.

استرس چه اثری در افزایش فشار خون دارد؟ استرس هم ممکن است سبب افزایش فشار خون شما بشود و باید کوشش بران باشد که آنچه را که سبب استرس در شما می شود تا آنجاکه ممکن است برطرف کنید. و اگر خود نتوانستید از پزشک خود کمک بگیرید. در اصطلاح پزشکی دو روش وجود دارد به نام های Relaxation و Biofeedback Techniques. که در بر طرف کردن استرس موثر و آرامش را به شما بر می گرداند. در اینجا یاد آورده می شویم که بر طرف کردن استرس و داشتن آرامش خاطر نه تنها در درمان بیماری فشار خون بلکه در درمان هر بیماری دیگری مؤثر است.

دارو درمانی چگونه کار می کند؟ داروهای گوناگون برای درمان بیماری فشار خون در بازار موجود می باشد و نهایت کوشش پزشک این است که با داروئی که خوردنش آسان، و عوارض آن کمتر باشد و حتی در برخی موارد حتی در برخی بودجه بیمار هم برای خرید آن دارو در نظر گرفته بشود. فشار خون بیمار را به حد طبیعی برساند و برخی از بیماران باید دارو را برای تمام عمر مصرف کنند. و گاهی هم در تعدادی از بیماران به ناچار باید چند نوع مختلف دارو درمانی استفاده کرده تا افزایش فشار خون آنان را تا حد طبیعی پایین آورد. داروهای فشار خون در بازار به نام Antihypertensive Medicine نامیده می شوند و بر حسب نوع اثری که در کاهش فشار خون دارند در دسته بندی گوناگون قرار می گیرند.

عوارض این داروها چیست؟ هر داروئی به هر حال عوارض جانبی نیز دارد که در مورد افراد متفاوت است. باید در نظر داشت که بدن هر فردی ممکن است واکنش متفاوتی با بدن شخص دیگر نسبت به این دارو ها داشته باشد.

عوارض ناشی از داروهای فشار خون می تواند به صورت سرگیجه در حالت ایستادن، اختلالات خواب، سرفه، خشکی دهان، سردرد، افسردگی، یبوست و کاهش و یا افزایش پتانسیم بدن و در مردان گاه به صورت اختلال در Erection (نمود) بروز نماید. هر بیمار داروی ضد فشار خون می گیرد، اگر دچار عارضه ای در اثر دریافت دارو بشود باید به دکتر خود مراجعه کند. و یا اگر داروئی می گیرد و روی فشار خون شما اثر نمی کند و یا دچار عوارض ناشی از دارو می شوید با پزشک معالج بهتر است مشاوره کنید. و داروی دیگری را امتحان نمایید. بگذارید که پزشک معالج برایتان بهترین دارو را با توجه به وضع مزاجی شما انتخاب کند.

فشار خون را به عنوان قاتل خاموش می شناسند، چون هیچ علامت یا زنگ خطری ندارد. وجه مشخصه فشار خون بالا مقادیر بالاتر از ۱۴۰/۹۰ است. هرچه فشار خون بیشتر باشد، خطر ایجاد بیماری های قلبی، کلیوی و حملات قلبی نیز بیشتر می شود.

مواردی که باعث افزایش فشار خون می شوند:

- ◆ استرس
- ◆ کم تحرکی
- ◆ انواع مواد مخدّر
- ◆ سیگار
- ◆ اضافه وزن و چاقی
- ◆ مصرف رژیم پر نمک، پر چرب
- ◆ مصرف کم میوه و سبزی و غلات
- ◆ تغذیه نامناسب و آب ناکافی
- ◆ تغذیه چگونه بر فشار خون تاثیر می گذارد؟

- مصرف غذاهای حاوی نمک یا سدیم زیاد می توانند فشارخون را بالا ببرند.

-افزایش وزن بدن باعث بالارفتن فشار خون می شود.

-کاهش وزن بدن می تواند باعث کاهش فشارخون شود.

-کاهش میزان مصرف چربی می تواند از افزایش فشارخون بالا پیشگیری می کند.

توصیه های غذایی در افرادی که فشارخون بالا دارند:

مصرف مواد غذایی حاوی پتاسیم، منیزیم و کلسیم در بهبودی فشار خون بسیار موثر است و مصرف کم غذاهای حاوی سدیم و چربی های اشباع موجب کاهش فشار خون خواهد شد.

❖ مواد دارای مقدار زیاد سدیم که فشار خون را بالا می برد و مفید نیست:

سوسیس، کالباس، ماهی دودی یا کنسرو شده، کنسرو ماهی تن، برگرهای سُس ها، سوپ ها، کنسرو لوبیا، غذاهای آماده، سبزی های کنسرو شده در آب نمک، زیتون شور، چیپس، تنقلات شور، نان های شور و پنیر شور

❖ مواد دارای مقدار بالای پتاسیم :

موز، زرداًو، پرتقال، انجیر، گریپ فروت، هل، انگور و آلو، سیب زمینی، سیر، کلم بروکلی، کدو سبز، قارچ و گوجه فرنگی

❖ منابع غذایی غنی از منیزیم :

غلات سبوس دار، برنج قهوه ای، آجیل، اسفناج، شیر، جوانه گندم برشته، بادام زمینی، سیب زمینی، اسفناج، شیر و نان سبوس دار
منابع غذایی کلسیم شامل لبیات و ماهی است .

❖ منابع کم سدیم و تامین کننده کلسیم : دانه کنجد و سبزی های برگ سبز

❖ مقدار نمک توصیه شده روزانه ۶-۵ گرم می باشد.

کاهش مصرف نمک و وزن بدن می تواند تعییرات بالقوه ای بر فشار خون ایجاد کند .

❖ چگونه می توان مقدار نمک دریافتی را کاهش داد؟

• درهنگام غذا خوردن از نمکدان استفاده نکنید.

• برچسب های تغذیه ای را مطالعه کرده و غذاهایی را انتخاب کنید که مقدار سدیم کمتری دارند.

• موازن نمک پنهان که در همه مواد غذایی وجود دارد باشید.

• ادویه هایی را استفاده کنید که در تهییه آن از نمک استفاده نشده است.

❖ انار مؤثرترین کاهنده فشار خون است. (این میوه دارای حداکثر توان پایین آورندگی فشار خون در بدن و ضد اسپاسم است.)

❖ هندوانه و پرتقال و گریپ فروت فشار خون را پایین می آورد.

❖ ماهی های آب های سرد مانند سالمون، تون، آزاد و قزل آلا باعث کاهش فشار خون می شوند.

❖ توجه داشته باشید ماهی دودی یا کنسرو شده و تن ماهی سرشار از سدیم هستند و موجب افزایش فشارخون میشوند

❖ مصرف گوشت قرمز را کاهش دهید؛ و به جای ان از گوشت سفید (مرغ آپیز یا بخار پز یا کبابی) و به خصوص ماهی دو بار در هفتة استفاده

کنید.(بهترین نوع ماهی ها، ماهی های چرب، مثل: سالمون و قزل آلا هستند)

❖ از گردو استفاده کنید اما در صورت عدم دسترسی به آن از : بذر کتان، سویا و روغن کانولا (کلزا) استفاده کنید.

- ❖ استفاده از ادویه ها نه تنها مزه غذاهای کم نمک را بهتر می کند، بلکه برخی از آن ها مانند: زعفران، فلفل سیاه، پونه، ریحان و ترخان باعث کاهش فشار خون می شوند .
- ❖ مطالعات ۵۰ سال اخیر نشان داده اند که سیر می تواند به اندازه داروهای کاهنده فشار خون در کاهش فشار خون موثر باشد.
- ❖ **مواد حاوی کافئین از قبیل:** قهوه ، چای ، نوشابه های گازدار و شکلات باعث افزایش فشار خون می شوند .
- ❖ مصرف نان ها و مواد کربوهیدراتی تهیه شده از آرد های سفید و بدون سبوس را به حداقل برسانید. و از نان های سبوس دار مانند: نان جو و سنگک استفاده کنید.
- ❖ از مصرف مایعات همراه با غذا جدا خودداری کنید ، اما روزانه حتماً ۶-۸ لیوان آب مصرف کنید.
- ❖ استرس و فشار های روحی _ روانی خود را کاهش دهید.
- ❖ **بهترین روغن ها برای بیماری های قلبی و فشار خون:** روغن زیتون ، روغن کانولا و روغن پنبه دانه می باشند.
- ❖ اجتناب از مصرف غذاهای سرخ شده یا غذاهایی که در درجه حرارت های بسیار بالا و یا در مدت زمان طولانی تهیه می شوند.
- ❖ از مصرف مغزیجات آجیلی و شور شده اجتناب کنید.
- ❖ از گلپر، آویشن، نعناع خشک و کنجد به جای نمک استفاده کنید.
- ❖ مصرف چربی های اشباع را و که به مقدار زیادی در گوشت قرمز، لبیات پرچرب، احشای حیوانات اهلی و زرده تخم مرغ وجود دارند، کاهش دهید.

ورزش بعنوان جزیی از برنامه روزانه

برنامه ورزشی، زمانی از احتمال موقیت بیشتری برخوردار خواهد بود که ورزش به عنوان یک تفریح و نه یک اجبار باشد. مسأله مهم انتخاب فعالیت هایی است که از آنها لذت ببرید و راههایی پیدا کنید که بتوانید فعالیت های مزبور را بیشتر و راحت تر انجام دهید.

در این قسمت نکاتی در این زمینه ذکر می شوند:

- فعالیت های جسمانی متنوعی انجام دهید تا احساس خستگی نکنید. علاوه بر پیاده روی معمول روزانه، جهت حفظ انگیزه برخی از فعالیت های هدفمند نظری باگبانی، یا فعالیت های با شدت بیشتر نظیر دوچرخه سواری نیز انجام دهید.
- از یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود دعوت نمایید تا با هم دیگر ورزش کنید. هر دوی شما از لذت فعالیت گروهی و فواید جسمانی ورزش بهره مند خواهید شد. هنگام ورزش در بیرون از منزل، لباس مناسب و راحت بپوشید، برای مثال از کفش هایی استفاده کنید که مناسب شما و نوع فعالیتتان باشد.
- جهت سرگرم کردن خود در حین فعالیت، می توانید موسیقی گوش کنید یا تلویزیون تماشا کنید.
- از ورزش بیش از حد پرهیز کنید. برای بهره مندی از فواید ورزش لازم نیست یک ورزشکار حرفه ای باشید و یا خود را خیلی خسته کنید. با ورزش های آرام تا متوسط شروع کنید و سپس بتدریج شدت و میزان فعالیت خود را افزایش دهید تا به بیش از نیم ساعت تا یک ساعت در بیشتر روزهای هفته بررسد.

• راههایی را پیدا کنید تا فعالیت‌های روزمره شما ورزشی‌تر باشند. بجای آوردن کارگر، کارهای منزل و باعچه خود را خودتان انجام دهید. بجای رانندگی تا مغازه پیاده‌روی کنید. بجای مسیر میان‌بر از یک مسیر طولانی و سربالایی استفاده کنید.

شما می‌توانید از راههای مختلفی میزان فعالیت خود را افزایش دهید. بطوریکه تعداد ضربان قلب شما افزایش نیابد ولی روزانه انرژی بیشتری سوزانید. بجای فکر کردن به اینکه چگونه می‌توانید کمتر کار کنید، راههایی را پیدا کنید که در منزل، محل کار و در تعطیلات فعالیت بیشتری انجام دهید.

برای شروع در این قسمت مواردی ذکر می‌شوند، اما نمونه‌های دیگری از این موارد را خود شما می‌توانید ذکر کنید:

• از کنترل تلویزیون استفاده نکنید و یا هنگامی که می‌خواهید در حین تماشای تلویزیون، نوشیدنی بخورید از شخص دیگری نخواهید که آن را برای شما بیاورد. خودتان بلند شوید و به آشپزخانه بروید.

• هنگامی که با تلفن صحبت می‌کنید سر پا بایستید و قدم بزنید. هنگامی که در ایستگاه قطار یا فرودگاه منتظر هستید، بجای نشستن در اطراف قدمی بزنید.

• در محوطه پارکینگ بجای پارک کردن در نزدیک‌ترین محل، نقطه‌ای دور را انتخاب کنید. یا ماشین خود را چند کوچه مانده به مقصد پارک کنید و بقیه مسیر را پیاده بروید.

• از هر فرصتی برای بالا رفتن از پله‌ها در منزل یا مکان‌های عمومی استفاده کنید. بجای پله برقی یا آسانسور، از پله معمولی استفاده کنید.

• در مناسبت‌هایی شرکت کنید که نیاز به قدم زدن یا ورزش کردن داشته باشند.

• در مسافرت، از استخر و اتاق ورزش هتل استفاده کنید. همچنین برنامه‌ای برای پیاده‌روی در سطح شهر بجای رانندگی ترتیب دهید.

• به فکر خرید وسایل ورزشی نظری دوچرخه ثابت و ترمیل باشید تا در هنگام گوش دادن به موسیقی یا مطالعه کتاب یا تماشای تلویزیون از آن‌ها استفاده کنید.


• حتماً در اوقات فراغت ورزش کنید. در گلف مسیر بازی را با پای پیاده طی کنید، بجای قایق موتوری از قایق پارویی در تفریحات استفاده کنید و بجای تنسیس دو نفره، تنسیس یک نفره بازی کنید.

• با هدف دستیابی به ۱۰ هزار قدم پیاده‌روی روزانه، پیاده‌روی را شروع نمایید. هر ۲۰۰۰ قدم معادل ۶/۱ کیلومتر است.

آسم چیست؟

آسم بیماری شایعی است که از هر ۱۰ کودک یک نفر و از هر ۱۰ بزرگسال یک نفر را مبتلا می‌کند. بسیاری چنین می‌اندیشنند که آسم بیماری است که از دوران طفولیت شروع می‌شود، اما ممکن است آسم در هر سنی بروز کند. همچنین ممکن است در سال‌های نوجوانی بهتر شود و یا کاملاً از بین برود، اما نزدیک به ۱۰٪ کودکان مبتلا به آسم هنوز در بزرگسالی نیز مشکلاتی خواهند داشت. ممکن است آسم در افراد یک خانواده دیده شود. اما بستگان اغلب بیماران، مبتلا به آسم نیستند. آسم علاج قطعی ندارد اما قابل کنترل است. به طوری که می‌توان از بروز حمله‌های آسمی پیشگیری کرد. اکثر افراد مبتلا به آسم با درمان مناسب و منظم بدون غیبت از مدرسه یا کار می‌توانند به زندگی طبیعی خود ادامه دهند و حتی از ورزش و شرکت در دیگر تفریحات لذت ببرند.

کار ریه‌ها چیست؟




برای دانستن این که آسم چیست باید بدانیم که کار ریه‌ها چیست؟ در حین انجام عمل دم، ریه‌ها اکسیژن موجود در هوا را می‌گیرند و وارد خون می‌کنند. سپس خون با جریان خود اکسیژن را به بخش‌های مختلف بد می‌رساند. در عین حال خون دی اکسیدکرین را جمع می‌کند و به ریه‌ها بر می‌گرداند و این دی اکسید کربن همراه هوای بازدمی از ریه‌ها خارج می‌شود. هوا از طریق یک سری لوله‌ها شاخه‌ای به ریه وارد و از آن خارج می‌شود که به این لوله‌ها ((لوله‌های برونژی)) گفته می‌شود.

در آسم چه اتفاقی می‌افتد؟

لوله‌های برونژی بیماران مبتلا به آسم منقبض می‌شود. از آنجایی که انجام عمل دم و بازدم از میان این لوله‌های باریک مشکل می‌باشد، بیماران مبتلا به آسم دچار علائم تنگی نفس، خس خس سینه و احساس فشار در قفسه سینه می‌شوند. به علاوه در این افراد خلط چسبناک هم تولید می‌گردد که با سرفه بالا می‌آید و یا در فرد احساس گرفتگی سینه ایجاد می‌کند.

علت آسم چیست؟



با وجود انجام تحقیقات وسیع علت آسم هنوز ناشناخته می باشد.

چه عواملی آسم را تشدید می کند؟



در اکثر مواقع شدت بیماری آسم دلیل واضحی ندارد اما اغلب برخی چیزها باعث و خامت آسم می شوند:
سرما خوردگی معمولی یا آنفلونزا آسم را بدتر می کند که ممکن است ۶ هفته به طول بیانجامد مگر آن
که درمان مناسب انجام گیرد.

حملات آسمی اغلب در اثر آلرژی ایجاد می شود. چیزهایی که معمولاً افراد مبتلا به آسم به آنها
حساسیت دارند غبارتند از: گرده گیاهان، گرد و غبار خانه و پشم حیوانات. از هر ۱۰ فرد آسمی یک
نفر به آسپرین حساسیت دارد.

ورزش خصوصاً در هوای سرد ممکن است موجب بروز حملات آسمی شود اما با درمان صحیح به
خوبی می توان آسم ناشی از ورزش را کنترل کرد. در مجموع از آنجائی که ورزش و نرمش برای
افراد مبتلا به آسم مفید است این افراد نباید از انجام آنها بپرهیزنند.

محرك هایی از قبیل دود دخانیات، دود غلیظ و هوای پر غبار اغلب منجر به حملات آسمی می شود. در برخی از افراد مبتلا به آسم تحریکات
روانی (خشم ، اضطراب و حتی خوشحالی زیاد) می تواند موجب بروز حمله شود. این که بعضی مردم می گویند (اعصاب خراب) باعث آسم
می شود، صحت ندارد. مصرف اغلب قرص ها و داروها برای افراد مبتلا به آسم بی خطر است . با این وجود ، در صورت ابتلای بیمار به فشار
خون بالا و یا بیماری قلبی ممکن است برخی داروها ایجاد عوارض کنند که در این صورت از داروهای جایگزین استفاده می شود. در صورت
تردید ، بیمار باید با پزشک خود مشورت کند و همچنین نباید بدون نظر گرفتن توصیه های پزشک خود مشورت کند و همچنین نباید بدون
در نظر گرفتن توصیه های پزشکی و به طور ناگهانی مصرف داروهای خود را قطع کند.

چه درمانهایی برای آسم وجود دارد؟



آسم علاج واقعی ندارد اما بیشتر افراد مبتلا به آسم با درمان صحیح، کاملاً به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند. درمان‌های بسیاری برای آسم در دسترس است که معمولاً به صورت اسپری و گاه به صورت قرص مصرف می‌شود. برخی از درمان‌ها به منظور بهبود سریع در موارد حاد آسم بکار می‌رود ولی دیگر درمان‌ها را باید برای تاثیر بهتر آنها به صورت منظم استفاده کرد (این درمان‌ها را پیشگیرنده‌ها می‌نامند). بیمار باید در مورد درمان با پزشک خود مشورت کند و برای این که داروها حداکثر تاثیر را داشته باشند مطمئن شود که چگونگی مصرف داروها را می‌داند، اگر چه نفس تنگی و خس خس وجود نداشته باشد.

چه مواقعي درمان های شدید تر لزوم پيدا مي کند



دانستن موقعي که علائم آسم در تشخيص تشديد یافته و یا احتياج به درمان شدیدتر دارد مهم است. آسم اغلب در شب بدتر می‌شود و یکی از علائمی که نشان دهنده نیاز بیمار به درمان بیشتر می‌باشد بیدار شدن از خواب در شب یا صبح زود در اثر خس خس سینه یا تنگی نفس است.

معمولًا کودکان مبتلا به آسم، شب‌ها به علت سرفه از خواب بیدار می‌شوند و این را می‌توان نشانه‌ای برای نیاز به درمان بیشتر تلقی کرد.

در صورتی که بیمار در طول روز خس خس بیشتری داشته باشد به طوری که مجبور شود از اسپری‌های خود به دفعات بیشتر از معمول استفاده کند، باید به پزشک خود مراجعه کند.