

طبقه بندی درمانی : ضد انعقاد تزریقی

بارداری: گروه C

شیردهی: وارد شیر نشده، لذا مصرف آن در شیردهی

بدون خطر است.

کودکان : مجاز (ابتدا ۵۰u/kg/1r /۱۰۰u/kg/۴h/jr)

یا ۲۵-۱۰ u در ساعت به صورت انفوزیون

فرآورده های دارویی:

Inj solution ۵۰۰۰iv/ml (۱ml/۵ml)

Inj solution ۱۰۰۰۰iv/ml

Inj solution ۵۰۰۰iv/۰,۵ ml

هپارین در صورت تزریق زیرجلدی به آهستگی

جذب و از طریق کلیه دفع می شود.

از راه زیرجلدی، وریدی، انفوزیون وریدی، تزریق

می شود.

داروهای هپارین در دمای ۱۵ تا ۳۰ نگهداری می شود و باید از یخ زدگی آن جلوگیری کرد. وقتی هپارین را در سرنگ انسولین می کشیم باید در ظرف یخ و داخل یخچال بگذاریم.

موارد منع مصرف :

حساسیت مفرد به دارو، خونریزی فعال، تمایلات خونریزی مثل هموفیلی و کاهش تعداد پلاکت زخم های غیرقابل دسترسی (بویژه زخم گوارشی زخم های باز و دیگر بیماری های افزایش دهنده نفوذپذیری مویرگی، در حین یا بعد از جراحی مغز یا چشم

یا نخاع، در حین بی حسی

یا تب نخاعی شوک، بیماری

پیشرفته کلیه، تهدید به سقط

اگرچه مصرف هپارین

در شرایط فوق خطرناک است

اما باید فواید آن را نسبت به مضراتش

سنجید.



موارد احتیاط :

طی قاعدگی، پس از زایمان، بیماری کبد یا کلیوی خفیف، کلسیم، سابقه آسم، آلرژی، زخم گوارشی، مشاغلی که خطر سوانح در آنها بالا است.

عوارض جانبی :

شایع خوریزی کاهش تعداد پلاکت حساسیت مفرط

خطرناک :

خونریزی گوارشی/خونریزی لته/کاهش تعداد پلاکت تا ۳۰٪ موارد کم خونی نکروز پوستی در اثر تحریک موضعی پوکی استخوان کاهش تعداد پلاکت ناشی از هپارین، هپاتیت





# هپارین



واحد سلامت همگانی  
بیمارستان بنت الهدی

افزایش خونریزی زیر جلدی هپارین مشکل پوستی مشاهده شود باید فوراً دارو را قطع کرد. هپارین نباید بصورت ناگهانی قطع شود زیرا ممکن است باعث افزایش قابل توجه انعقاد پذیری خون شود.

برخی از فرآورده های هپارین حاوی بنزیل الکل هستند مصرف بنزیل الکل در نوزادان با مسمومیت کشنده ای همراه بوده است توصیه می شود که در نوزادان از هپارین بدون ماده نگهدارنده استفاده شود.

اگر کاهش تعداد پلاکت یا مشکل پوستی بوجود آمد باید مانیتورینگ از نظر آنتی بادی های ضد هپارین مدنظر باشد.

شماره تلفن بیمارستان : ۴ - ۵۸۳۲۲۳۶۵۵۱  
سایت بیمارستان :

[www.bentolhoda.nkums.ac.ir](http://www.bentolhoda.nkums.ac.ir)

کانال آموزش بیمار بیمارستان بنت الهدی :

[@bimarestan-bentolhoda](https://www.instagram.com/bimarestan-bentolhoda)

## تداخلات دارویی:

داروهایی که تاثیر سمیت هپارین را افزایش می دهند مهارکننده های پلاکتی، وارفارین و دیگر ضد انعقادهای خوراکی دی پیریدامول دکستران

کینیدین سفالوسپورین آسپرین

۱- داروهایی که تاثیر هپارین را کاهش می

دهند تتراسایکلین نیکوتین آنتی هیستامین

گلیکوزیدهای قلبی دیژینال ها

هپارین در سه ماهه سوم و دوران بعد از زایمان بعلت خونریزی در مادر با احتیاط مصرف، درمان با هپارین در دوران بارداری که ۱ ماه بیشتر باشد در مادر پوکی استخوان ایجاد می کند.

اطلاعات کلی برای بیمار پرستار و پزشک :

قبل از جراحی دندانپزشک یا پزشک را از مصرف این دارو مطلع سازید.

جهت تراشیدن ریش از دیش تراش و جهت مسواک زدن از مسواک های نرم استفاده کنید تا خطر خونریزی کم شود.