

درمان:

- ۱- در مرحله حاد نیاز به درمان ندارد. فقط استراحت و محدود کردن فعالیت تازمانی که علایم حاد بیماری برطرف شود.
- ۲- در مرحله مزمن، مصرف دارو طبق نظر پزشک

بیشگیری:

- ۱- تزریق واکسن (کلیه نوزادان در بدو تولد، افراد در معرض خطر مثل کادر درمانی، افراد تحت دیالیز، مصرف کنندگان مکرر خون، افراد خانواده فرد آلوده در یک منزل)؛ این واکسن در سه مرحله تزریق می شود: نوبت اول، نوبت دوم که یک ماه بعد از تزریق اول است و نوبت سوم که ۶ ماه بعد از تزریق اول است. در دوران بارداری و شیر دهن نیز می توان تزریق نمود و ۵ تا ۱۰ سال اینمی ایجاد می کند.
- ۲- کنترل خون و فرآورده های خونی

- ۳- استفاده از وسایل یک بار مصرف و یا ضد عفونی کردن آنها
- ۴- استفاده از کاندوم و پرهیز از روابط جنسی متعدد
- ۵- استفاده از دستکش و پیشند و عینک محافظت و سایر وسایل محافظت فردی هنگام مواجه با خون و ترشحات فرد آلوده
- ۶- افرادی که مواجه شده ولی واکسن دریافت نکرده اند یا تیتر (اندازه مناسب دفاع بدن در برابر ویروس هپاتیت ب) آنها به حداقل نرسیده، حداقل ۷۲ ساعت فرصت برای تزریق ایمونوگلوبولین دارند
- ۷- نوزادان متولد شده از مادران آلوده باید در طی ۱۲ ساعت بعد از تولد ایمونوگلوبولین دریافت نمایند.
- ۸- به علت مقاومت بالای این ویروس که مدت ۷ تا ۱۰ روز بر روی سطوح باقی می ماند و باعث انتقال آلودگی می شود، لذا وسایل مشترک مثل قیچی می تواند عامل انتقال باشد.
- ۹- لباسها و وسایل آلوده به خون آلوده به ویروس را می توان بعد از تمیز کردن خون از آنها، با جوشاندن در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه یا به مدت نیم ساعت در واکتس قرار داد تا عامل بیماری از بین برود.

۳- افراد هموفیلی و تالاسمی که فراورده های خونی دریافت می کنند.

۴- افراد بی بند و بار و هم جنس گرا یا دیگر جنس گرا

۵- معتادان تزریقی

۶- گودکان مقیم شیر خوارگاه و مهد کودک ها در مناطق خیلی آلوده

علایم و نشانه ها:

دوره کمون (دوره ای که ویروس در بدن هست ولی علامتی هنوز ایجاد نکرده) در هپاتیت ب ۳۰ تا ۱۸۰ روز است.

علایم هپاتیت:

- + توخو و استفراغ و اسهال
- + بی اشتهاي
- + درد شکم
- + زردی
- + ضعف و خستگی طولانی
- + تیره شدن رنگ ادرار و کم شدن رنگ مدفوع
- + فارسایی کبد
- + درگیری کلیه و مفاصل
- + سیروز (تبلي کبد)




هپاتیت ب (B)

هپاتیت ب به معنای التهاب کبد است.

کبد بزرگترین غده و پالایشگاه بدن است، که در بسیاری از فعالیتهای حیاتی بدن مانند: هضم غذا، مقابله با عفونتها، متوقف کردن خونریزی، پاک کردن خون از سوم و داروها و ذخیره سازی انرژی در بدن نقش دارد.

هپاتیت ب: عفونت بافت کبد با ویروس نوع ب هپاتیت است و یک بیماری واگیر دار است.



راه انتقال بیماری:

- > تماس جنسی با فرد آلوده
- > تزریق خون و فرآورده های خونی آلوده
- > از مادر به نوزاد در حین زایمان و یا مدقی بعد از آن
- > استفاده مشترک از ابزار تیز آلوده (لوازم بزشکی، خالکوبی، تنو، حمامت، طب سوزنی، سوراخ کردن گوش، سرنگ آلوده، لوازم اصلاح، تینغ و مسوک)

از چه راههایی منتقل نمی شود:

۱- تماسهای عادی روز مرہ (دست دادن، عطسه، سرفه، بوسیدن، بغل کردن)

۲- همکاری و همکلاسی بودن

۳- شیر دادن در صورتی که سینه مادر زخم و خراش نداشته باشد.

افراد در معرض خطر:

۱- کلیه پرسنل شاغل در مراکز درمانی بستری و سربائی که با خون و ترشحات آشته به خون در تماس هستند (بزشکان، پرستاران، ماماهای کارکنان آزمایشگاه، پرسنل خدماتی مراکز درمانی)


۲- افراد تحت دیالیز



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی خراسان شمالی
بیمارستان پورسینا

راهنمای خود مراقبتی در هپاتیت B

آشنایی با هپاتیت B



واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی
با آرزوی سلامتی

آدرس وب سایت بیمارستان :
nkums.ac.ir/category/15413

۹- پوستتان را مرطوب نگه دارید و لباس تنگ نپوشید.

مراقبتها :

۱- ناقلين سالم هر ۶ ماه جهت معاینه و آزمایش به پزشك مراجعه کنند.

۲- زنان باردار آلوده به ویروس جهت کاهش احتمال انتقال ویروس به نوزادشان با مراجعه به پزشك و دریافت ایمونوگلوبین نسبت به این سازی نوزاد خود اقدام نمایند.



۳- افراد آلوده نباید خون، عضو و بافت اهدا کنند.

۴- این افراد با مشاوره درمانی به افزایش کیفیت زندگی و کنار آمدن با مشکلات طبی، اجتماعی، روانی، افسردگی درد و مشکلات تغذیه ای خود اقدام نمایند.

۵- شستشوی تمام قالب ها و پرتوزها و وسایل ارتووذنسی با مواد ضد عفونی کننده به مدت ۲۰ دقیقه با هیپو کلرید سدیم ۵ درصد ضد عفونی کردن گیره ها و فیلمهای رادیولوژی اجتناب از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات در محلی که احتمال تماس با خون و بزاق، بافت و سایر مواد بالقوه آلوده کننده وجود دارد.

۶- از دستگاه فشار خون و تورنیکت مشترک استفاده نشود.

۷- این افراد نباید در مراکز تبيه و توزيع غذا مشغول به کار شوند.

نکته : خون بالاترین میزان ویروس بیمار زا را دارد. نقاط آلوده به خون حتی در صورت خشک شدن به مدت یک هفته یا بیشتر احتمال انتقال را دارد.

روزیم غذایی :

*به دلیل بی اشتیایی، تهوع و استفراغ تعداد وعده های زیاد و در حجم کم مصرف شود.

*روزیم غذایی پر کربوهیدرات (مواد قندی) باشد.

*روزیم غذایی کم بروتین و با چربی متعادل میباشد.

*به دلیل اینکه دفع برخی از داروها از طریق کبد است ، قبل از مصرف هر دارو حتی گیاهی با پزشك مشورت شود.

توصیه ها :

۱- بهداشت فردی را رعایت کرده و از وسائل شخصی مجزا (مسوک و تیغ اصلاح) استفاده کنید.

۲- از ریختن و پاشیدن خون ، بزاق و دیگر مایعات بدن در محیط جلوگیری کرده و در صورت وقوع آن محل را با محلول هیپو کلرید ۱۰ درصدی یا آب ژاول ضد عفونی کنید.

۳- از تماس مستقیم خون ، بزاق و دیگر مایعات آلوده بدن با فردی که زخم باز در پوست دارد و یا مخاط افراد (چشم یا تماس جنسی) جلوگیری نمایید.

۴- کلیه افراد خانواده را با مراجعت به مراکز بهداشت واکسینه کنید

۵- از تماس جنسی حفاظت نشده با همسر خود تا زمان کامل شدن سه نوبت واکسن در آنها و افزایش تیتر آنتی بادی جلوگیری کرده با از کاندوم استفاده کنید.

۶- در صورت مراجعت به دندانپزشکی و آزمایشگاه و یا هر عمل جراحی حتما بیماری خود را اطلاع دهید.

۷- در صورت خارش بدن خود حتما با پزشك خود مشورت کنید تا داروی مناسب به شما بدهد.

۸- در صورت خارش با استفاده از گیف آب سرد، مالیدن آب لیمو روی محل خارش ، میزان آن را کاهش دهید، پوست خود را نخارانید تا زخم نشود.